




Early European Books, Copyright © 2012 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
3990/A






Early European Books, Copyright © 2012 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
3990/A



Early European Books, Copyright © 2012 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
3990/A



Early European Books, Copyright © 2012 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
3990/A

A, 10
12

m/2
x

Index
Medicinal
Morgan

3990/A

A xxxiv. Mai

K 19 B

APHORISMI,

RABI MOY,

SIS MEDICI ANTI-
 QVISSIMI AC CELEBERRI-
 MI, EX GALENO MEDICORVM
 principe collecti: nunc uerò ad usum
 studiosorum Medicinæ ab interit-
 u uindicati, & iam primùm
 in lucem editi.

I T E M,

LŒCORVM QVORVNDAM A
 pud Galenum sibiipsis contradicen-
 tium castigatio & notatio.

N


DENIQVE,

IOANNIS DAMASCENI A
 phorismi utilissimi ad Filium.

Cum INDICE omnium rerum notatu di-
 gnarum locupletissimo: x-l-x

Cum Gratia & Privileg. Caf. Naest.

BASILEAE, EX OFFICI-
 ANA HENRIC PETRINAM



Lectori S.



Oc opusculum
(Lector) cum
quidē per se iā
utile, tum uerò
tibi multò utili
us utriusq; au

thoris sui nomen meritò iam o
lim reddidit. Quòd Galeni prī
cipis inuentum Rabi Moyſis di
ſpoſitio tota ſit: quorū ille quī
dem Græcus Pergamenus, hic
Arabs Cordubensis, uterque
πολλῶν ἀντάξι & ἄλλων, ὅς μάλιστα πολλὰ
πλάγχθη, ὅς πολλῶν ἀνθρώπων ἰδεῖν σῶμα
ματὰ τὸ νόσον ἔγω. Habet enim sum
mi illius uiri definitas ſententi
as, quas Ἀφορισμοὺς appellamus,
quaſi deciſiones quaſdam, & a
reſta totius Medicinæ, ex quina

a a que

P R A E F A T I O.

que ingentibus eius uoluminibus ab hoc Moyse, homine paulò inferioris ætatis, sed non minoris fortasse doctrinæ, & quod maius est christianæ, aut certè legis diuinæ perito (quod ex 25. Sectione prospicies, ubi aduersus Galenum pro Moyse Legis diuinæ latore disputat) in fasciculū congestas, ac uiginti quinque summis capitibus, seu locis communibus digestas: quas cū multos iam annos intermissas ob rudioris ac minus politæ dictionis fastidium, boni hi uiri uiderent, utilitati medicorum cōsulentes, poliendū ita & stylo, & typis curarūt, ut uides, quod utinā ex eorum uoto & animi tui sententia succedat. Vale.

V O.

VOCES BARBARAE IN
hoc libro propriè redditæ.

Aqua, morbus oculi, Hypo-
chyma.

Aqua hordei, Ptissana,

Aqua cum Melle, Melicratum uel
Mulsa.

Argihuen, marina purpura.

Barrachalis, Nitrosus.

Bunduchæ, Ponticæ.

Baruli, tumoris genus.

Bolismus, uoluulosus morbus.

Brodium, iusculum.

Clausura meatuum, styptatio.

Cauda soricina, *μύρρος*, pulsus immi-
nutus.

Consolidatio auri, Chrysocola.

Chordæ, Tendones.

Crocum Aphricanum, Cnicum.

Cortices mali granati, malicorium.

Cortex æris, Squama æris.

Dumbeletus, abscessus.

Darlini, Calamyntha. al. Cynamo-
mum, al. Garyophyllas.

Ederula, Rubus.

a 3

Elle

Elleborum, ueratrum.

Far hordei, alica, al. ptissana.
Ficia, Cucurbita.

Formicæ, herpetes.

Fluctuatio, afflictio.

Gurgulatio, fluctuatio.

Gargarismus, Apophlegmatismus.

Galea, morbus capitis, Caros.

Ganeanangane, Gangrena.

Galea & Cheude, } Cephalea.

} Cephalalgia.

Vuæ, cum fluit
sanguis.

Hemorrhoides, } Morales, sangui-
ne & cholera ru-
bicunda.

} Verrucales, cum
fluit Melancho-
lia.

Hydropisis utria, ἀσκηζης.

Herma tobalia, Epiplocele.

Iectigatio, Palpitatio cordis.

Interpolata febris, Intermittens.

Lutum lentici, Propolis.

Lacertus, Musculus.

Mundificare, detergere.

Malum

Malum granatum, punicum.
 Mentastrum, oryganum.
 Meri, œsophagus.
 Mesera, ulceris genus.
 Mel aërium, manna.
 Medicina consolitativa, Glutinato-
 rium medicamen.
 Medicina, porosa, Rarefaciens, Vol-
 uulas Mercurialis herba.
 Mirachia, Melancholia, Hypochon-
 driaca.
 Malus spiritus, *συννοία*, difficilis re-
 spiratio.
 Nucha, Spinalis medulla.
 Nigellum, Melanthium.
 Nascentia, Sinus.
 Narcotica, Stupefacientia.
 Olibanum, Thus.
 Orobi farina, Erni far.
 Oleum Cydoniorum, Melinum.
 Porisaccoeides, Callus.
 Pori pectoris, obstructio.
 Petia lenis, linteum rarum.
 Permixtio mentis, delirium.
 Rubea, Erysipelas.
 Rosea, Chymolus.

Reticula, Retiformis plexus.
 Reaptatum, Corroboratum.
 Siphac, Peritoneum, al. Tunica,
 membrana.
 Scrofa, Struma χοῖρα, Paristhmia.
 Saltus, ulcerosus sensus, concussio.
 Subasseila, Ala.
 Scissura, Coxendix, Ischias.
 Secanabis, Oxymeli.
 Saphena, Vena malleoli.
 Secacules, Spacelos, ut sideratio.
 Syphac corneum, Tunica oculi cor-
 nea.
 Syphac intest. Tunicae χιζωνος.
 Sisimbrium, Serpillum uel Spondy-
 lium.
 Sagine, Collium al. Panicum.
 Selicha, Melicratum.
 Schia, Coxendix, Ischias.
 Serapinum, inagapenum.
 Terra Francigena, Misij.
 Thuris farina, Thuris manna.
 Tornacinus, Reciprocus.
 Tinea, Achores.
 Tyria, Ophrasis.
 Theenia, Arabia.

Vitreo.

Vitreolum, Chalcitis.
Viuum racham, fuluum uel fla-
uum.

Vena pulsabilis, Arteria.

Vena non pulsabilis, Vena.
Zarbus, Omentum.

LIBRORVM CITATIO

nes Barbae.

- 2 Anatonis uiuorum. 7. de Placi-
ris Philos.
12 Pulsuum. 4. de Causis pulsuum.
Lib. Ingenij. Methodi.
Lib. Scientiarum. De locis af-
fect.
Lib. Miermix. De Comp. se-
cundum loca.
Mitro pulsuum. Introduct. ad
pulsuum cogn.
16 Depulsibus. 4. De Præcog-
nit. ex pulsibus.
6 Morb. & accid. 3. De Causis
symptomatum.

a s

s Ch

5 Ciborum. 1. De alimentis.
2 Megapuls. 2. De differentijs
puls.
Consilium sanitatis. De Sa-
nitate Tuenda.

F I N I S.

INDEX COPIO

SISSIMVS AC DILIGEN

tissimus, omnium rerum ac Vocabulo-
rum, morborum, curationum, herbarū,
aliarumq; rerum notatu dignissima-
rum in librum Aphorismo-
rum, Rabi Moylis.

A

A Bolita appetē-
tia quid 467

Abortus unde 353

Abortus causæ 354

Abortus duo putrefa-
cti 480

Abscessus 448.449

abscessus quomodo fi-
ant 59

abscessuum pro contē-
torum qualitate cura-
tio 329

abscessib. internis quæ
conueniant 229

abscessibus qualia ali-
quando insint corpo-
ra 63

in Abscessibus corpo-
ra animalibus similia
reperiri 477

abstergentia sine acri-
monia 422

abstinentia ad quid u-
tilis 155.359.385

abstinentiam aliquan-
do prodesse, aliquan-
do nocere 167

Absynthium tertianis
dandum 266

absynthij coma ad qd
profit 370. usus
414.415

accesionis pulsus indi-
cium 85

accesionum anticipa-
tio

INDEX.

actio quid indicet	261	adolescencia quæ di-	
accipitrum stercoris u-		catur	42. omniū
sus	434	etatum optima ibid.	
acerbi saporēs	420	ægris & sanis signa cō-	
acetum quibus parti-		munia	126
bus inimicum	409.	ægrotare quid	459
potestate frigidū	410	ægrium esse sustentandū	
aceti qualitatis & u-		etiam nō prouiso sta-	
sus	408. 436	tu	164
achores quid	453	ægylops quid	463
achoris origo	454	ægyptij cur Diabeta la-	
acidi saporēs	420	borent frequentius	
acres saporēs	418	189. cur frequenti-	
actionis læsæ causa quæ		us elephantiasi labo-	
renda	196	rent	240
actionis tunicæ uehe-		æris & uentorum dif-	
mentis signum	15	ferentia	189. 190
actiones liberae uolun-		æruginosa bilis	33
tatis quæ 21. cor-		æstate plus bibitur quā	
poris	124	hyeme	47
actionum uoluntaria-		etas inclinans & etas	
rum per somnum ra-		quid differant	42
tiones 13. quarum		etatum partitio & cō-	
præcipuè homines		stitutio	ibid.
meminerint	15	affectio hepatica quæ	
adeps quid	472	dicatur	467
		affectus	

INDEX.

affectus unde primum
 periculū, primus cu-
 randus 338. gra-
 uiores primum curā-
 do inspiciendos 172
 affectuum propria si-
 gna quæ 112
 affici quid 459
 albuginei humoris u-
 sus 19
 albumen oui ad quid
 proffit 435
 alexandrini Aegyptij
 cur elephantiasia-
 ximè corripiantur
 240
 alexipharmaca mode-
 rantius exhibenda
 416
 alexipharmacarum na-
 tura duplex ibid.
 alimenta tenui uictus
 rationi aduersa fo-
 lio 411.
 medicamentosa cui rei
 conueniant 403.

graffi glutinosiq; sue
 ci 401
 alimenti & medicamē-
 ti differentia 385
 alimētorum species ex
 qualitate 388. cog-
 nitio ceteris prestan-
 tior 384. ratio ib.
 alimentis frigidis quo-
 modo utendum 402
 alimentū ualentius ue-
 speris comedēdū 387
 alliij usus 414
 alliorum usus 397
 allium agrestium the-
 riaca 427
 aloës usus 414
 alopecia quid & unde
 453
 alopeciæ curatio 429
 alopecijs quid proffit
 433
 alteratio quid 31
 alui solutio quibus pe-
 riculosa 181
 amari saporis 419
 ambre

INDEX.

ambrosia quid	229	animal non semper præ	
ambulatio quomodo fit		uari, motu cerebro	
at	22	exciso 20. uiuere	
ambustus quid profit		cerebri uētriculo ali	
436		eno tātum læso 474	
amentia quid	455	animalia ociosa excre-	
amygdalæ inflammati-		mentosa	401
onis curatio	248	animalis & plantæ dif-	
amylum quid	389	ferentia	160
αἰσώματος quid	8	animalium partes per	
angina quid et eius spe-		se operantes	429.
cies 465. pernitio		motus 21. alimen-	
sißima	207	ta 401. pedestriū	
angine curatio	207.	carnes quæ optimæ	
432		sint	389
angustia spiritus quid		anserini stercoris usus	
466		434	
ani & uesticæ musculi		annus quot diebus con-	
quare continuo mo-		stet	459
tu non moueātur	11	anni tempora quando	
ani & uesticæ musculo-		incipiant 47. &	
rum officium	11	diei partes respondē-	
animus imbecillus in		tes	189
corpore ualido	490	aphonia quid	439
animi morbi quomodo		aphorismi ioan. Dama-	
curandi	170	sceni ad filium	528
		aphtus	

INDEX.

aphtus quid 464

apij seminis usus 423

apnoea quid 439

apophlegmatismus qd

& unde oriatur 75

apoplexia quid 442.

457. quid apud

ueteres 456. ex

decubitu supino 196

apoplexiæ qualitatis si

gna unde sumantur

97. tempora quæ

sint 278. causa 140

in Apoplexia & simili

bus uena celeriter se

canda 296

apoplexiam subito in-

terficere quare 125

apostasis emplastro cu

rata 481

apostematum optima et

peßima quid 116.

curatio 228

appetentia canina quæ

dicatur 466. abo-

lita quid 466

appetentiæ curatio 213

gradus quinq; 55.

deiectæ cum febre cu

ratio 215. deiectæ

ex diarrhoëa curatio

218

appetitionis deiectæ si

gnificatio 122. uis

unde amittatur 116

appetitoriã uim inesse

in hepate exemplum

490

aqua leuissima 393.

394. glaciei peßi

ma 392. fontana

& recens qualis 393

uino mista cur sitim

sedat 394. frigida

ante cibum quid ad-

ferat 392. optima

qualis 393

aquæ usus consuetis o-

ptimus, non consue-

tis contra 168. ul-

cia unde & quæ 393

quantum sine pericu-

lo biæ

INDEX.

- lo bibere liceat 169.
 uitia & incommoda
 404. 405. tepide
 usus 423
 aquarū differētiæ 393.
 aquilarum stercoris u-
 sus 434
 arachnoidis oculi tui-
 ca 20
 arborum plantarumq;
 liquores quotu li-
 ces 438
 arius peripateticus po-
 tu aque interijt 167
 aromata cur purganti-
 bus misceantur 307
 aromatica attenuare
 422
 aromatum semina mi-
 xta quid iuuent 308
 arrhia stomacho cōuul-
 sa absynchide curata
 481
 arsenicum quid 471
 arteria inter indicem
 & pollicem septum
 transuersum curatur
 475
 arteria nulla sine uena,
 sed cōtra f. 3. Sect. 1.
 arteriæ contractio quo-
 modo percipiēda 90
 arteriæ asperæ quæ di-
 cātur 444. ampu-
 tate quare non rege-
 nerentur 47. ue-
 næ & linguae usus 9
 arteriæ & uenæ testicu-
 lorum, & mammariū
 à longinquo ijs acce-
 dunt fol. 2. Sect. 1.
 arteriæ & uenæ intesti-
 norum quomodo nu-
 triātur 53. ad quid
 secari proffit 304.
 305. Reteformis
 plexus cum neruo pa-
 tiuntur f. 3. Sect. 1.
 arteriarū sanguis quas-
 lus 8. uenarum po-
 sitio in collo fol. 2.
 Sect. 1. duritiæ cau-
 se

INDEX.

- se 144
 arteriaca quæ dicantur 444
 arthritidis quid 439
 arthrisconum Theriacorum præparatio 417
 arthriditarum curatio 434
 articularis morbi curatio 246
 articulorum laxatorum curatio 217
 in Ascite nec tympanite cauterio utendum 326
 asinini lactis usus 406
 aspidum uaria genera 482
 assafridaque siccius quam elixa ad alimentum 390
 assimilatio quid 31
 asthma morbus quando sanetur 67
 asthmatici qui dicantur 465
 astringentia etiam soluentia esse 191.
 miscenda hepaticis f. 187 quibus non miscenda 188
 astringentium sapor 421. usus 217.
 facultas 76
 autumnus initium 47
 athanasia quid 229
 atrophie curatio 367
 atra bilis non fit ex pituita 40
 atra bilis et excrementa nigra quid differant 37
 atræ bilis generatio et signum 102
 atræ bilis in excrementis significatio 101.
 bilis excretionem noxiæ mirari esse impetrati medici 102
 atram bilam ualidioribus quam flauam purgandam 309
 atram

INDEX

attenuatis uictus ratio diuturnis affectibus confert 166. 167	tus causa & curatio 205
attenuantia que sint 230. quibus non adhibenda sint 228. optima 407. me- dicamenta 529	B Balnea cur iuuentis 380
attenuationis causa f. 137	Balneum heclicis qua- le conueniat ibid. febrientibus ex frigo- re 381. circa in fe- bri qua attendenda 382. quibus semis- nibus conueniat 368
attractionis & expul- sionis eadem uia, in uenis à uentre ad ie- cur perductis 21. 22	balnei partes quatuor 380. usus in febri- bus 378. tempus ac- ptissimū in intermit- tentibus 382
attrahentis facultatis affecte signum 106	balneo quibus abstin- dum 379. quando utendum in putridis febribus 382
aurium inflammatarū & obstructarum cu- ratio 202. 436.	balneorum uarius usus 378
ulceratarum curatio 203. doloris à fri- gore curatio 203.	bdellij usus 415
430. inflammatio- nes, alio quàm cete- rarum partium mo- do curari 69. soni	bestiarum morsus cura- tio 433
	bilis

INDEX.

- bilis** quid appelletur 439. quæ secundum naturā & quæ contra 34. Porracea ubi gignatur 33. arsenica qualis 33. flaua nulla in uentriculo, quare 41. flauæ pallidæq; discriminē 425. flauæ species 33. flauæ uires 38. atræ generatio & signum 102. differentia in animalibus 425. Matriusq; natura 35. purgatio quomodo sit molienda 322. reliqua genera inter flauam & aliam ad media 35.
- biliosi** cibi qui 41. biliosis alimenta conuenientia 401. Boëthi uxori suffocatione curata 356. Boletorum esus noxius
- bouis** talus ad quid utilis 430. brassica an sit calida 497. bronchos, quid 444. bronchus quid 464. bruchus quid ibid. bubones unde 130. bubuli stercoreis usus f. 433. butyri usus 407.
- C**
Cacoëthe & Dysenteria pulonica distinguenda 450. Calce lota et emplastro quando utendū 335. calculus quando sanetur 66. cardialgia quid 467. calida primo gradu f. 423. calidis & siccis temperamentis quæ uictus ratio 369. siccisq; affectibus balnei uti b 2 lit. 26

INDEX.

- litas 383
 calor quottuplex sit 59
 naturalis in primis cu-
 randus 360
 caloris an sit eadem &
 qualitas in pueris &
 florentibus 494.
 multi & humidi si-
 gna 353
 callo uulneris genera-
 do quæ conueniant
 249
 caluities quid & unde
 453
 cameli cerebrū ad quid
 utile 429
 camelinum lac an sit o-
 ptimum 495
 cancer morbus quid
 452. unde 37. 235
 canceri exulceratio ge-
 neratio 451. cura-
 tio 241. 327. post
 excisionem curatio
 328
 cancerorū curatio 246
 canini morsus curatio
 244. 245
 carnis stercus ad quid
 proffit 432
 canina appetentia quæ
 dicatur 466
 capitis doloris curatio
 327. dolorum dif-
 ferentia 200. do-
 loris à frigore cura-
 tio 202. doloris bi-
 liosi indicia 123. do-
 lorum ex ardore cu-
 ratio 201. uehe-
 mentissimi dolores f.
 200. dolori pro-
 desse uomitum 212.
 dolorem ad oculorū
 radices extendi 69.
 purgationis med. f.
 536
 capite laborantib. quæ
 profint 383
 capparis corticis usus
 399. 414
 caprilli stercoris usus
 433. Car=

INDEX.

- Carbunculus** quid & unde 447. 448
carbūculi curatio per chirurgiam 324
cardialgie cause 161
carnes quæ ualentius nutriant 391. suillæ humanis similes 488
carnes pedestrium animalium quæ optimæ 389
carni generandæ apta medicamenta 342
carnium præparatio f. 367. costarum differentiæ 390
caricæ aduersæ ueneris 412
cariei cause 140
caros quid 457
casei differentiæ 306
castorei usus 408
castrata animalia uberius alimentum præbent 484
cataplexis quid 458
cataplexis curatio 194
cataplasma imponendi & ligandi modus 339. ex caricis 427
cataplasmatibus quomodo utendum 206.
 apponendi tēpus 182
cataplasmata & emplastra simul apposita nō conferūt 232.
 quibus applicanda f. 228
cataplasmatum differentiæ 188. 189
catarrhi curatio 432
cavitatis uitiat cause 158
cauo hepatis afflicto nō conueniunt astringentia sola 226
cauorum & sinuum incute ulcerum curatio 325
causa quid 459. nulla efficacior quàm febris pestilentie causa
 b 3 se

INDEX.

sa	65	143. fluxionis cu-
cauterio ubi sit opus		ratio 306. & uen-
324. 325. curan-		triculi confusi signū
di qui non sint	325.	105. purgationis
an utendum in artu-		medicam. 536. &
bus solum	499	cordis intēperiei sym-
cauterium non quibus		ptomata 51. oris et
uis adhibendum	325	uentriculi consensus
ceparum usus	397	160. posterioris
cephalea quid	457	partis affectæ signa
cephalæe intensiones		105
uariæ 69. sympto-		cerebro compresso ac-
mata & causæ	114.	tionibus uoluntarijs
curatio	434	priuatur animal 489
ceratum humidum ad		cerebro exciso non sem-
depascentia	416	per motu, nec sensu
cerebrum nutriri puro		priuari animal 20
sanguine & spiritu		ceruini cornu usus 429
uenarum, atq; arte-		chirurgia quomodo
riarum suarum	58	morbi curentur 324
qualem motum ha-		choirades quæ sint f.
beat 16. & spina-		454
lis medulla quod if-		cholerae causæ 155
ferant	17	chordapso quid 468
cerebri ut instrumenti		chylus quid 438
vel similis affectio		chymus quid ibid.
		chyl

INDEX.

chymosis quid 463

cibandi hora in febris
bus 276

cibaria quæ siccior dēt
alimentum 390. ni
tiosi succi quottupli-
cia 40

cibus post exercitium
quomodo capiendus
361. post purga-
tionē minuendus 313

cibi sumendi scopus du-
plex 360. celeriter
tardēue transun-
tis causæ 385. et e-
gestionis mediocrita-
tem seruandam esse
66. mensura 210.
modus in acutis mor-
bis 183. 184

cibi quales prius su-
mendi 385. humi-
diores quales 386.
singulis temporibus
quales ibid. par-
cius nutriendes qua-

les ibid.

ciborū species ex qua-
litate 388. suau-
tas ad unctionem uti-
lissima 385. ratio
in exhaustis & gra-
uibus 386. 387

cibus mali succi abstinē-
dum 363

cibos & exercitia in
tempore usurpanda
364

cicatricum curationis
p chirurgiā triplex
ratio 330

cicuta necat 491. a
uetula Athenis uesci-
tur ibid.

circuituū ordinem quæ
peruertant 26. in
alijs affectibus quàm
febris causæ 270
citta morbus cōcipien-
tium mulierum 353.

& 354

ciuitates orientales &

b 4 occi-

INDEX.

- occidentales quæ di-
cantur 447
ciuitatum salubris &
insalubris situs 50
cleopatra quo assiduū
genere se interfecerit
481.482
clyster quādo & quo
modo utendum 224.
314. ex aqua salis
314.315
cruditas mali succi cau-
sa 39
coctionis & decreto-
riorum signorum dif-
ferentia 103
coeliacorum affectuum
curatio 434
cogitatio leta tristitia
leuat 171
colatorij ossis usus &
situs 16.17
colici & puncturæ cau-
sæ 156. doloris cu-
ratio 427
colicis quæ prosint f.
430. astringentia
non miscenda 188
collectiua in æqualitas
quando obuitia facul-
tatis fit 81
colli matricis constitu-
tio & usus 27
colliquationis causæ f.
129
color melongianus un-
de 477
colores curationibus si-
milium humorum cō-
ferre 220
columbini stercoris cu-
ratio 434
columella quando ab-
scindatur 177
columellarum laxata-
rum remedia 331
coitus appetitus in mu-
liere unde 351. uo-
luptas 485
comitialis morbus un-
de & quid 143.455
comitialis morbi cura-
tio

INDEX.

- | | | | | |
|-----------|------------------------|---------|--------------------------|------|
| tingentia | tio | 429.431 | pellationes | 442. |
| da 188 | compositionis medica- | | utriusq; causa | 147. |
| quidam | mentorū scopus tri- | | nomina pro partiā | |
| qua facul | plex | 175 | affectione 458. si- | |
| 81 | concocta medicari nō | | gnificatio | 117 |
| concoctio | cruda | 309 | convulsiones quæ cū- | |
| 17 | concoctio quid | 439. | rentur, et quæ nō | 68 |
| an(e) | cōcoctioni perficiendæ | | convulsionum curatio | |
| iusu | puell9 admotus uētri | | 431 | |
| 477 | mirificè prodest | 491 | cōuulsis neruis quæ me- | |
| libus | optima quæ | 281 | dicamenta conferant | |
| um cō | cōcoctionis signa quæ | | 332 | |
| 220 | 279. bonæ indici- | | constitutio corporis op- | |
| 6 cu. | um | 281 | tima | 363 |
| 454 | concoctioni quæ imimi- | | constrictionis & laxa- | |
| 16. | ca sint | 385 | tionis cause | 156 |
| 177 | concoctionem quæ ad- | | consuetudo in uictus ra- | |
| 181 | iuuent | 435 | tione quantum pro- | |
| 181 | concussio unde | 137 | sit 364. altera na- | |
| 181 | conualescentionum ui- | | tura | 491 |
| 181 | ctus ratio | 168 | continue febris signa | |
| 181 | convulsio quid | 442. | 264 | |
| 181 | etiam infantibus acci- | | contractio arteriæ quo- | |
| 181 | dit 250. qui plez- | | modo percipiēda | 90 |
| 181 | runq; obnoxij | 44 | contusio unde | 130 |
| 181 | cōuulsionis uariæ ap- | | coquorum condimen- | |
| | | | b 5 | 14 |

INDEX.

sa inimica concoctio ni 368	tur non contra 57
for ex affectione par- tiū uicina offendi 73	corneae tunica oculi u- sus 20
et hepar nunquā o- mnino destituūtur a- limentis 51. princi- piū animantis 441	corpus recreandu 531.
cordis citra thoracis cō- uulnerationem dete- ctio 474. signa in- temperiei 111. pul- sus maior quam arte- riarum 83. dexter uentriculus quib. ad- sit 22. et cerebri intemperiei sympto- mata 51. uentricu- lorum sanguis et spi- ritus 8.9. frigidi pulsus 87. palpi- tationis curatio 241	ante sumptionem me- dicamenti putari de- bet 311. uiri et fo- minae quale 42.43
corde etiam compresso non impediri actio- nes 489. affectio ceterae partes afficiū- tur non contra 57	corporis humani usus, situs et forma f.1, Sect. 1. actiones 124. extenuatio un- de 7. partes leuissi- mae et tenuissime quae sint 9. faculta- tes quot 124. affe- ctio fit pro uirtutis ratione 64. consti- tutio optima qualis 363
	corpora imbecillia cur- nunquā grauitur a- groient 44. vario- ra minus morbis sunt subiecta 43. sicca quae citius moriātur 46 cor-

INDEX.

- corporum graciliū im
 becilliumq; curatio
 161
 corruptele & interi-
 tus duplices esse in
 nobis necessitates 65
 corruptum quid 472
 coryze seu grauedini
 quæ noxia, quæq; cō
 moda 195
 coryze curatio 432
 coxēdicis curatio 434
 crescētes citō, citō mo-
 riuntur 107
 crisis quid 459. post
 quadragesimum diē
 quomodo queritur
 289. optima quæ
 281. perfecta qui-
 bus morbis fieri non
 possit 288. febriū
 unde petenda 268.
 quo modo in febribus
 utriusque querenda
 289. in quib. die-
 bus non fiat 285.
 presentis cognitio f.
 282. per abusum
 284. perfecta 282
 imperfecta, incerta,
 obscura, mala, quæ f.
 287. ex calfacta do-
 mo successit 473.
 exitus quibus cogno-
 scatur 74
 crisis bonæ indicium
 281. perfecta co-
 gnitio 289. 290.
 modus p quid inuesti-
 getur 95
 crisi duos dies attingen-
 te quomodo utriusq;
 distinguendum 286
 crises morborum quæ
 280
 crisis ubi nō sit opus
 280
 croci usus 415
 crocodyli morsus ex ip-
 sius carne curatur f.
 418
 cruditas quid 466
 cruda.

INDEX.

cruditas quomodo uacuanda 298
cruditatis signa & cause 152. *cause* 170
signa in febribus calidis 268
cruditate iam inflammata non est sanguis mittendus 306. *quæ ætas maximè abundet* 38
in Cruditate sanguis nunquam 293
crudos uacuare succos periculosum 182
cruroris eiectioni aut uomitum signa 120
cubiti uena quando secunda 302
cucumeris usus 397
cucurbitula occipiti admota oculis prodest 75
cucurbitulis quando utendum *ibid.*
cucurbita quando ap-

ponenda 306. *quibus morbis prodest* f. 182

curatio pro uirium ratione instituenda 164
quomodo sit instituenda 162

curationis precipuus scopus 163

curatio morbo quæ primò consideranda 162

cutis per se nullis nervis est prædita 60.

sensu prædita ut uiscera *ibid.* *dense*

remedia 241. *qualis* 448. *secundum*

naturam qualis 58

D

Daemonia quid 456

Dactylorum usus 399

Deambulantes dormire quid faciat 479

declinatio in febre quid 272

decretoriorum & cetero

INDEX

Ationis signorum dif-	fol.	524
ferētia 104. decubi-	depravationis causa f.	
tus supini signa ib.	157. 159	
deficientes pulsus qui	derivatio	181
445	dextrae partes cur fini-	
deiectionis stomachi cu-	stris robustiores sint	
ratio	129	
deligaturae ratio	346	
deliquiorum animi cau-	diaphragmatis doloris	
sa	causa	152
delirantes ex frigido et	diaphragmatis caput	
humid.	f. 1. Sect. 1.	
540	diabete quid	469
delirium unde	141.	
quid 45. quos af-	diabetes rariss.	189
fectus saepius sequatur	diabetes quibus in re-	
146. in egroto	gionibus frequentius	
quid significet	accidat	189
99.	diabete morbi signifi-	
ardentium febrium	catio	94
symptoma	104	
delirij signa	97	
dentes forati & liuidi	diacutnēti ars quib.	
unde	constet	164
145	diarrhoia quid	468
dentium dolorum cu-	diatrion	214
ratio 435. doloris	dies quid 459. decre-	
causa	torij 284. duode-	
145	cimus et decimus sex-	
de Deo error Galeni	tus 285. boni qui	
	sint	

INDEX

- sint 286. nō decre
 torij ibid.
 diei & anni partes re-
 spondentes 189
 dierum morborum di-
 scretio 284. indi-
 catoriorum numerus
 quis seruandus 289
 digerentib. nisi uacua
 to corpore non fiden-
 dum 179
 digitorū signa 115. 116
 discutientibus emollien-
 tia miscenda 184
 dispnoe causa & sig-
 na 108
 dissolutionis corporis
 signa 533
 distensionis à sanguinis
 copia curatio 176
 distributionis ratione
 misceri purgantibus
 contraria 77
 diuretica medicamen-
 ta ex quibus confici
 debeant 317
 dolere quid 459
 dolor punctorius &
 membransrum 142.
 ex humore quot mo-
 dis fiat 137. ab in-
 flammato hepate f.
 142. 143
 doloris capitis ex ardo-
 re nec non à frigore
 curatio 201. 202
 biliosi capitis, & do-
 loris ab ardore & fri-
 gore indicia 123. ca-
 pitis curatio 195.
 omnis causa 130.
 aurium à frigore cu-
 ratio 203
 dolorem flatulentū cu-
 curbitulis miraculo-
 se curari 173
 dolorem capitis ob eb-
 brietatem curatio f.
 199. differentia
 & cause 142. ex
 medicamentis ortorū
 curatio 318. capis

INDEX

tis differentie 200
 dormientes nō esse om-
 ninō sensus expertes
 12.13. unde spirent
 12. ambulantes qd
 faciat 479. quarū
 actionum præcipuē
 in somno meminerit
 14.15
 dormientibus quæ figu-
 ra corporis accidat
 11
 dormientium animam
 non quiescere 12.
 actionum uoluntaria-
 rum rationes 131
 dysenteria quid 468
 dysenteriae causæ 155.
 curatio 432
 dysenterici qui dicun-
 tur 467
 dysentericis quæ pro-
 sint 430
 dysepulotica & cacoë
 the distinguēda 450
 dulcia qualia 420

B

EBrietatis curatio f.
 199.200
 Ebrijs dormiētib. quæ
 figura corporis acci-
 dat 11
 Efflatio quid 56
 Efflatio unde fiat 12
 egestionis & cibi me-
 diocritatem seruana-
 dam esse 66
 elephas unde 235
 elephantiasis unde mo-
 riatur 37. & can-
 cri curatio 241, in
 Germania rarissima
 240
 emollientia medicamē-
 ta 422
 emplastica quæ 462,
 & 471
 emplastrum ex caricis
 427. ad splenetis-
 cos & hydropicos
 221. ad ischiadi-
 cos 248
 emplastrum

INDEX.

emplastro & calce la-	quid 450.	frigida
ta quādo utendū 333	curatur	252
emplastra & cataplas-	erysipelatarum cura-	
mata simul apposita	tio	76
non conferunt 232	euacuationis species f.	
ephemeris balneo cu-	186	
rari 379	eupatorii usus	4
epidemia quid 440	euulsio quando necessa-	
epilepsia quid 442.	ria	166.
457. 458	exaspirationis cause	
epilepsia unde fiat f.	157	
143. 373	excrementū aquosum,	
epilepsie curatio 193.	pingue, & glutino-	
196. 435. effectus	sū quid indicet 120	
199. morbi que sint	excrementi incocti si-	
tempora 278. pro	gnum 118. optimi	
fuit uomitus 212	significatio ibid. ui	
epileptica cōuulsio un-	ridis & nigri signum	
de & eius curatio	ibid. frequentior	
536	eiectio, quā cibi as-	
epilepticis quid profit	umptio perniciosum	
409	signum ibid. foeti	
epiplocele quid 454	di, stridentis, spinosi,	
erosio quid 468. un-	& uarij significatio	
de 130	120. 121. nigri sig-	
erysipelas cedematums	nificatio 121. 122	
	excrementa	

INDEX.

excrementa aestate quā
hyeme plura 46.
si diutius morantur
putrescant 39. pi-
tuitosa in uentri-
culo qualia 41. nigra
non nocent uentri-
culo 40. nigra quid
ab atra bile differant
37. impleri uentri-
culum inopia nutri-
menti 59
exercitandi tēpus 372
exercitationes quomo-
do fieri debeant 372
exercitationis definitio
et tempus 375
exercitationum utilissi-
mae quae 372
exercitiū omissum quid
generat 373. sani-
tatem seruare 359.
à repleto corpore f.
373. in quartana
376. quale debeat
esse 379. ante cibū

quid proffit 372
exercitia duplicia 376
et cibos in tempore
usurpanda 364.
post crapulam 374.
acuta nocent ibid.
qualia ante et post
cibum esse debeant
375. acuta et tar-
da 374
exercitiorum usus 376
expulsionis impeditae
causae 155. et at-
tractionis eadem uia
in uenis à uentre per
ductis ad iecur 22
expiratio quid 556.
et inspiratio quomo-
do fiant 11
extensionis membrorū
causae 10
extenuatio corporum
unde fiat 7
extremorum refrigera-
tionis in febre causae
255

c de uisita

INDEX.

Βονγατον quid 461

F

Facultatis attractricis
affecta signum 106

Facultatē augētia et de-
primētia quot 128

Facultates omniū quot
sint 178. naturales
quæ 30

facultatum alexiphar-
macarum natura du-
plex 416. & spi-
rituum usus 67

famelici unde fiant 99

fames unde 55

farinæ triticæ usus f.

423. hordeacea

usus 428

fatigatis dormientibus,
quæ figura corporis
accidat 11

fatuitas quid 455

fauus quid 454

febricitantes quantum

aquæ sinepericulo bi-

bere possint 169

febricitantium uictus ra-
tio 276

febricitantibus quando
balneum profit 379.

quibus cōcedatur fri-
gida lauatio 253.

quæ uictus ratio 169

febris quartana unde
oriatur 37. ardens

an sit in uenis 497.

continens & conti-

nua quæ sit 445.

aliquando ex fluxio-
ne in partes imbecil.

62. putrida & he-

ctica quæ 460. con-

tinua est acuta 258.

non temerè repurgā-

da 277.

febris curatio 215. &

297. calidæ malū

signum 268. pul-

sus, quādiū febris est,

nō est naturalis 360

quartanæ per theria-

cam curatio 272.

putridæ

INDEX.

putridæ signa 259.
 putridæ et diariæ ge-
 neratio 255. arden-
 tis solutio quibus ex-
 cretionibus fiat, item
 tertianæ, quotidianæ,
 phrenitidis 282.
 tertianæ & quartanæ
 signa 262. 263.
 calidæ symptomata
 quot 269. quoti-
 dianæ signa 263.
 continuæ signa 264.
 tertianæ & quartanæ
 causa 149. quar-
 tanæ curatio 139.
 hecticæ curatio 316.
 cum phlegmone in ie-
 core curatio 223.
 a dentis curatio 276
 principū quib parci-
 bus contineatur 256
 hecticæ generatio et
 curatio 271. diffe-
 rentia ex urinae scali-
 mine 93. calidæ ge-
 neratio et symptomata
 269
 febri ex stypatione pro-
 desse balneum quan-
 do 381
 in Febri quæ attenden-
 da circa balneū 382
 in Febre uacuationis
 observatio 254
 febres putridas ex ta-
 ctu dijudicandi ratio
 259
 febrium periodi quibus
 de causis uarietur f.
 254. rigoris indi-
 catio 266. duæ spe-
 cies 445. putridarum
 optimum reme-
 diū 275. intermit-
 tentium species 257.
 258. putridarum
 pulsus 84. 85. 86.
 continuarum species
 & curatio 268. ua-
 ria causa 25. 265.
 hecticarum causa &
 62 quæ

INDEX.

- quando grauiore fi
ant 274. ex crudi-
tate cause & cura-
tio 256. 257. pu-
tridarum cause & cu-
randi genera 252.
periodi quot horis ex-
pleantur 260. ar-
dentium generatio f.
268. intermittens
tuum ex partium lesio-
nis cause 266. tu-
morum Crises un-
de fiant 281. crises
unde petenda 268
febriles qualitates al-
terare, quam uacua-
re utilius 184
febris pituitosa quan-
do conducat 253.
commentibus quan-
do aqua sit exhiben-
da 251. calidis qua-
do frigida danda 269
in febris attenden-
dum concoctione 251.
utriusque quomodo
crisis sit querenda f.
289. continentibus
sanguis mittendus
299
ferarum morsuum re-
medium 411
ferina seu agrestium car-
nes ualentius nutri-
unt 391
fibre intestinorum &
uentriculi 31
ficus & pruna quibus
profint 367
figura media corporis
quibus dormientibus
accidat 11
fistula quid 447.
quando aperienda 337
flatulentum dolorem cu-
cubitulis miraculo-
se curari 173
flaua bilis, pallidaq; di-
scrimen 425
flexionis & extensio-
nis membrorum cau-
se

INDEX.

- se 10
 fluctuationis causa f. 153
 fluxionis radici prius medendum quam ulcus 179
 fluxiones quibus partibus incumbant 130.
 quibus partibus sepius accidant 61
 fluxionum pro partium situ & ratione curatio 238. derivatio quomodo facienda 183
 fluxionibus quando intendenda sint discutienda 239
 fluxus ventus curatio 312. comodus non suppressendus 313.
 e naribus quomodo reuellendus 304
 foemina quando gignatur 55
 foeminae cur appetitio res ad coitum sint 358
 foeminae qua in parte generatrices sint 54
 foeminae sinistro utero nascuntur 354
 foeminae corpore, viri corpus purius 42
 foetus in utero quo potest nutriatur 55.
 quando phlegmone tentatur 355
 foetus formationis tempora ibid.
 foetus bene uel male habentis signum 355
 foetum causa 55
 foliata unguenta 370
 formae depravationis causae 157
 formicans omnium minus 90. pulsus qui 88
 formationis foetus tempora 355
 fracturae curatio 346
 fracturae indicatio un-

I N D E X

de petenda	345	500. crassi errores
frictio	376	de Deo & mudi crea-
frictiones siccae dolores		tione 518. loci ali-
prohibentes	184	quot sibiipsis contra-
frigida quando noceat		rii 492. opinio de
49. quando dan-		actionibus uolunta-
da in febribus calidis		rijs per somnū 13.14
269		galli iracundi 489
frigida reculari que		gallinacei stercoris usus
febres non noscunt f.		434. testium om-
253		nium suauissimi 390
frigidorum morborum		gangrena quid 449.
cause	140	453
fructus horrhei quales		garrulitas & delirium
398		in egroto quid signi-
fumus fuligo quid	381	ficient 99
functiones vitales	21	generatio quid 38
furfuracearum urina-		genitalia Masc. & fœ-
rum in diuini	94	min. quid differant
		350
G		genitalis seminis copia
Galenus Moysen p-		laborantes quomodo
phetam reprehendit		curandi 361
519. 400. aure-		genu inflammati cura-
os pro curata suffo-		tio 172
catione accepit	358	in Germania elephanta-
Gal. crassi errores	499	tiasis

INDEX.

tiasis rarissima 240

glandes castaneæ ad qd

utiles 485

glandula quæ nervos

habent f. 4. Sect. 1.

glutinatoria & itē in-

durantia medicamen-

ta qualia 343

gonorrhœa quid 442

gracilium imbecillūq;

corporum curatio f.

161

gracilibus quæ medica-

menta danda 532.

lac asininum dandum

406

grauedini quæ noxia,

quæq; commoda 195

grunorum præter na-

turam in corpore cō-

tentorum signa 122

gutturis inflammatio-

nis curatio 248. &

433. tumorum cu-

ratio 432

gustus unde fiat 18.

deprauationis causa

f. 159

H

HAemodia quid 443

Hæmoptoici morbi cu-

ratio 295

Hæmoptoicorum cura

tio 208. 209

Hæmorrhoids quid 451

hæmorrhoides narium

quando sanentur 67

halitus & vapores f.

540

hæctica febris genera-

tio & curatio 272

hæctica febres quæ sol.

460

hæcticarum febrium in-

sultus post cibum cir-

citer horam fiūt gra-

ues 274. febrium

cause ibid.

hæctici balneum pro-

dest 380

hellebori albi usus 412

hemicroniæ curatio fo-

c 4 lio

INDEX.

- lio 434
- hemicromie differētie
 - et signa 105
- hemicranicum auxiliū
 - 194
- hemytritee febris 283
- hepatica affectio quæ
 - fit 467
- hepatici qui dicantur
 - 467
- hepaticis astringentia
 - miscenda 187 quæ
 - sunt miscenda 225.
 - quod uirum sit utile
 - 392. medicamen-
 - tis astringentia aro-
 - matica miscenda 187
- hepar et cor nunquā
 - omniū destituuntur
 - alimentis 51. et uen-
 - tricus 531
- hepatis indurati cura-
 - tio 221 clauo affli-
 - cto non conueniunt
 - astringentia 226.
- inflammati sympto-
 - mata 114. intens
 - peratiae curatio 224
 - imbecilli signum 119
 - hepatis imbecilli reme-
 - dia qualia 224. 225
 - hepati an neruus adsit
 - 492
 - herba iecur dissoluens
 - 476
 - hermia unde fiat 156
 - herpes exedēs qd 452
 - herpetis curatio 239.
 - qui in summa est cu-
 - ratio 240
 - herpetes quæ dicantur
 - 447
 - hieræusus 415
 - hirundinis cerebri usus
 - 429
 - horror et rigor unde
 - 149
 - humidi plerunq. lon-
 - geui 45
 - humor et qualitas con-
 - uitantur 137. cru-
 - dus quid a puro diffe-
 - rat

INDEX.

rat & unde fiat 37
humoris uacuandi ra-
tio 162. crudi duo
genera ibid. albu-
ginei usus 19
humores numero quot
sive 32. crassi qui-
bus euacuandi medi-
camentis 165e pa-
riter affecti in corpo-
re sunt quatuor 40
humorum mordacium
quatuor species 38.
confusio unde oria-
tur 32. qualitates
36. signa & lin-
gue calore 101 pur-
gatio quando & quo-
modo facienda 166.
descriptio & parti-
tio 32
humoribus quando cor-
pora abundant 533
hydrocele quid 454
hydrocelæ nascitæ quæ
medicamenta conue-

niant 333
hydropes 452
hydropis causa & cu-
ratio 221.222.233
hydropiseos hepaticæ
principium ignotum
279
in Hydropica muliere
ex menst. suppressa
sanguis mittendus 305
hydropicis quid proffit
434
hyemis initium 47
hyeme plus editur quā
estate 47
hypochondriacæ melā-
cholia 456
hypochondriacæ me-
lancholiæ signa &
causa 112.137.151
hypochondriacæ melā-
choliæ curatio 212
hypochondriorum af-
fectus quomodo cog-
noscendus 116
hypodriacis Theriaca

• 5 con-

INDEX.

confert	237	ileos quid	468
hypoglottides	211	imbecillitatis caus.	178
hypopius quid	463	imbecilles quomodo	
hyposarcæ curatio f.		nacuandi	166
219		imbecillia corpora cur	
I		nūquam grauitè æ-	
Icterus necessariò pur		grotent	44
gandus	220	impostores uiperas ci-	
ictericis quæ prosint		curantes	483
430		Ioan. Damasceni apho	
ictericorum per indi-		rismi ad filium	528
cationē curatio	220	inæqualitas quid	89
curatio	219	inæqualiter & inæqua	
ictus pulsus quid pro-		lia quæ	444
prie	82	inanitionis & lienis in	
iecur œdematenunquā		durationis causæ	136
infestari 71. herba		indurantia medicamen	
dissoluens	476	ta qualia	343
iecoris doloribus quæ		infantis pulsus qualis	
uena secanda	302.	80	
inflammati indicia f.		infantes exulcerantur	
113. inflammati cu		nutricibus malè affe-	
ratio 222. phleg-		ctis	486
mones curatio	223	infantib. quomodo me	
iecore affecto quæ ue-		dicamentum dandum	
na secanda	303	314. etiam conuul	
		sio	

INDEX.

sio accidit 250
 inflammatio unde 265
 inflammationes quan-
 do scarificandæ 341
 inflatio & œdema qd
 differant 455
 inspiratio & expira-
 tio quomodo fiant 11
 instrumenta contuma-
 cia quomodo fiât 82
 intemperantiæ hepa-
 tis curatio 225
 intemperantibus non
 medendum 312
 intemperies inæqualis
 duobus modis incidit
 50. humida facili-
 or curatu 185. om-
 nis morb. à quo sym-
 ptomata 177. inæ-
 qualis quæ 64. ue-
 hemens deijcit uires
 50. sicca quæ 185
 intemperiei cordis si-
 gna 111. sicca spe-
 cies 185. calidæ fri-

gida bona 213. cui
 uenus conueniat 361
 interitus & corrupte-
 le duplices esse in no-
 bis necessitates 65
 intermissio in febre qd
 272
 intestina uulnerata
 quâ facilius curen-
 tur 72. cur sint cō-
 uoluta 53. ab atra
 & flaua bile affecta
 quæ curantur 117.
 duplici modo nutriri
 24. duabus tunicis
 uestiuit natura, qua-
 re 486
 intestinorum affectorū
 curatio 232. uul-
 nera curatu difficilia
 231
 intestinis exulceratis
 clysmi & qui conue-
 niant 316
 ira quibus dominetur
 489

ischias

INDEX.

ischias quid 439
ischiadiorum curatio
 247
ischiadibus nil prodest
 scarificatio 302
ischiadum dolorib. que
 uena secanda ibid.
ischurie cause in pue-
 ris & curatio 234
inguli & diaphragma-
 tis dolorū cause 152
iuuenes non nisi mag-
 nis ex causis lædun-
 tur 65
iuueni panis conueni-
 ens 389
iuuenum pulsus qualis
 80

K

Kριός morbus qui
 dicatur 454
Κυρτοκλήη qd 454

L

Lac ad quid utile 347
Lac sistit & deijcit f.
 406. sero sum opti-

mum 395. gignen-
 tia & menstrua mo-
 uentia atque urinam
 qualia 424. came-
 linum an sit optimū
 495. caco chymū
 394. utile pectori
 395. ex mammillis
 haustū optimū 406.
 ad quid utile 394
lactis ignoto sero cal-
 fa ti uires 406. sub-
 stantia triplex 395.
 noxa & correctio f.
 396
lactuce usus ibid.
læthargie curatio 197
lapathi foliorum usus
 411
lapis quibus nascatur
 partibus 122
larynx quid 464
lauacrū quid & quan-
 do exercitatis 378
lassitudo quid 461.
 tensiua 413
 in *Lase*

INDEX:

in Laſitudine ex crudi-
tate non uomendum
319

luxationis cauſa 156

lepra quid & unde f.
37. 235. 452

lepræ curatio 433

lethargi effectus 198.
283

lethargios medicamen-
ta conuenientia 198

lien ſeu ſplen qualis &
eius uſus 26

lienſ aff. ſti ſigna 118

imbecilli purgatio
quomodo fiat 227.

indurationis cauſæ
136. ſcirrhoſi cu-
ratio 227

lieni quando conferant
aſtringentia 226.

medicamenta ſcirrho-
ſo conuenientia 227

liene affecto quæ uena
ſecanda 303

lienofi qui ſint 467

lienofiſ detrahendus ſan-
guis 306

lienteria quid 466.
468

lienteriæ cauſæ 155

ligamenta inſenſilia f.
3. Sect. 1. & tendo-
nes ab ignariſ putan-
tur neruiſ f. 3. Sect. 1.

& uirga quid diſfe-
rant 28. 29. durifi-
ſima quæ 6

ligamentorum uſus ib.
color 6

ligendi ulceriſ modus
337

lingua quam uim habe-
at 18

linguæ paraclyſiſ quid
439. uſus 9

lippitudo ægroto ma-
lum ſignum 106

lippitudinum curatio
204

longæui maximè qui
ſunt humidi 48

longæui maximè qui
ſunt humidi 48

longæui maximè qui
ſunt humidi 48

INDEX.

- loquela organa 19
ludus ad quid utilis f. 373
lumbrici quibus nascantur partibus 122
lumbricorum curatio 430. genera et curatio 233
lumbricis quid profit 434
lupini stercoris usus f. 432
- M
- Macor ob pblegmonas quando fiat 72
Macilētis quomodo mendendum 315
Mammæ totidem quot matricēs 27
mammarum inflammationum curatio 436
mania unde 141
manie mulieris signū 356
manus tactura pulsū qualis 90
- marasmus duplex 441
mares dextro utero nascuntur 354
masculus quando gignatur 55
masculorum & foeminarum genitalia quod differant 350. dexter partes, sinistras foeminarum generatrices esse 54
masculos gignātesque signa 478
matellæ hydrops quid 469
matres pueros debere lactare 356
matrix & vesica in muliere quod differant 28. quid & aliquādo nervus dicitur 440
matricis os et ventriculus quod differant 469. suffocatio quando nascatur 347
matrice nulla pars magis

INDEX.

gis dilatari, aut con-
trahi potest 49
matrices quot, totidem
et mammae 27
matricibus exulceratis
quid conueniat 315
medicæ artis studiū et
methodus 529
medicamentum profu-
isse quomodo uidea-
tur 312. infantib.
quomodo dādū 314.
quādo propinandū
313. ex inæquali-
ter ualentibus nil ua-
let 307. effectus
quo ordine sequatur
310
medicamenti propinā-
di ratio et obserua-
tio 315
medicamenta propinā-
di tempus 5. 2. sin-
gulis morbis parata
meliora 188. poly-
chresta non iuta ib.

diuretica ex quibus
confici debeant 317.
læthargicis conueni-
entia 198. ualidio-
ra aut remissiora quib.
danda 313. qua-
lia adhibenda corpo-
ri 191. purgantia
cum iudicio exhiben-
da 309. uaria pro
uarijs partibus sorti-
ta 411. per se ope-
rantia 429. poly-
chresta q̄ dicta 470.
purgantia quæ dicā-
tur 192. calida qua-
lia adhibenda 178.
salubria cur inuenta
403. salubria et
sanitatem conseruan-
tia ibid. emollien-
tia 422. menses cō-
entia non omnib. pro-
sunt 349. alia alijs
partib. noxia uel uti-
lia 412
medic

INDEX.

medicamentorum per se operantium cata- logus 430. purgā- tium ordo in purgan- dis humoribus 191. 192. cōpositionis scopus triplex 175	medulla spinalis & cē- rebrū quo differāt 17
medicāda certa & pau- ca usurpanda 532	melācholia Hypochon- driaca 456. quid & unde 104. 455. & pituita epilepsia 36. non uomitu cu- randa 320
medicina quid 461	melancholiæ signa 99
medicinæ pars q̄ præ- stantissima 384. stu- dioſo quæ sint neces- ſaria, & quæ obser- uanda 529	hypochondriacæ cau- ſæ 151. hypochon- driacæ signa 112. curatio 197. hypo- chondriacæ curatio 212. aliud genus 456
medicinam percipien- dam quæ ætas ſit opti- ma 42	melancholiam ex epi- lepsia fieri & è con- tra 143
medicus morbi euentū pro dicere debet 132	melancholicæ aliena- tiones 141
medici officium 164	in Melācholia mitten- di ſāguinis ratio 305
medici duo ex melle ut putabant interie- runt 488	melancholici cur ple- runq; mortem appe- tāt 212. morbi 37
medicis uoluptuarijs non credendum 529	melan-

INDEX.

melancholico ex sanguine qui morbi ori- antur 37	mensium suppressorū signa 348. prouo- catio quomodo fiat 347
melancholicorum acti- ōnes 100	miraculōsorū aliquot exempla 473
melanthij usus 431	mœstitiæ causa 141
melonum usus 397	mola quid 470
melicratum quid 472	mors sæpe sine crisi 73
meline quid 471	mortis in febre signum 269. presentis si- gna 85. 103. 117. 125. 149. tres mo- di 74. signa ex quē- busdam partib. 102
membrorū iactatio in cardiacis & stoma- thicis syncopis unde 12. flexionis et ex- tensionis causæ 10	expectationis causæ 141
meninx dura quare fo- ra minulenda 16	morbus ante Galeno non uisus 487. acu- tus & peracris quid 288. simplex per accidentia etiā quæ- rendus 267
meningis utriusq; ac- cessio ad cerebrū ib.	morbi magnitudo quos modis efficitur 181.
menonis dictum 132	frequentis significa- tio
menstrua quid prouo- cet 424	
menstruorum suppres- sio 351. curatio f. 433. 478	
mensis quot dieb. con- stet 459	

INDEX.

- ti 533. redundan-
tiæ unde oriatur 66.
tempora quatuor f.
278. principium
quid 279. euentū
medicus prædicere
debet 132. auges-
centis signum 261.
tres ordines & speci-
es 162. causa unde
petēda ibid. cogni-
tio ex coniectura, cu-
ratio ex scientia 123.
calidi & frigidi refi-
cienti tēpus par. 186
morbo curādo quæ pri-
mū cōsideranda 162
morbi maligni quomo-
do pro ætate muten-
tur 67
morbi animi quomodo
curādi 170. ex te-
nui & ex crassa flu-
xione orti 40. pa-
rentum in filios deri-
uantur 530. calen-
di 531. qui sine crī-
si sanētur 280. pes-
simi q̄ ex uētriculi flu-
xione 68. sicci q̄
curentur ibid.
morborum signa 97.
frigidorū causæ 140.
uariæ significatio-
nes 101. curatio p̄
chirurgiā 324. cau-
sæ quando afficiant
corpora 154. con-
coctio 166. indicia
ab accidentibus 111.
specialiū causæ 127.
curatio cōmunis 168
acutorum cibus 183.
definitiones, & quo-
rundam ambiguorū
distructio 437. cu-
ratio per medicamen-
ta 307. causa effi-
cacissima 65. signa
ex corporis & animi
affectibus sumi 110.
111. curatio parti-
cula-

INDEX.

cularis 193
 morbis quibus sanguis
 tutò detrahi possit f.
 299. extremis &
 extrema remedia f.
 168
 morbos acutos cogno-
 scendi ratio 287
 mores uictum & exer-
 citia sequi 363
 morū corruptio à qui-
 bus 365
 morsus animalis cura-
 tio 244.245
 motus & agens sensus
 patiens 60. sine mu-
 sculis fieri nō potest
 6. animalis quot 21
 motuum musculorum
 differentie 10
 moysen Prophetā Ga-
 lenus reprehēdit 519
 mucī curatio 195
 mulier ut cōcipiat 484
 duos abortus putrefa-
 ctos edidit 480

mulieris mania signum
 356
 mulieres menstruīs la-
 borātes quomodo cu-
 randæ 306. cur
 appetitio res ad coe-
 tum sint 391
 mulse usus 407
 mundum esse recens ita
 creatum à Deo, &
 Deum aliquando mū-
 dum fuisse 524
 murium capita ad quid
 prosint 429
 musculus magis motus,
 quā sensus 6
 musculi qui in Tendo-
 nem desinant ibid.
 qui mollius et qui dis-
 rius tentantur 30.
 temperales lesi quæ
 symptomata inducāt
 67. ani & uesticæ
 quare contrario mo-
 tu non moueantur 11
 musculorum motuum
 2 differe-

INDEX.

differentia 10. uesti
ca & ani officiū 11.
mustela cerebri usus f.
429

musculis omnib ut una
actio, ita unus motus
30

myfirarò elephantias
laborant 240

myuri pulsus qui dican
tur 444

N

Narcisi radix uomi
tioni commoda 321

Nasus primū est instru
mentum ad respiran
dum 48

Natura cuiusq; cōside
randa 173. iuuan
da 531. rerum ua
ria 532. 533

naturæ concedendū in
quacunq; specie ua
cuationem immineat
100

naturales facultates

quæ 30

nausæ & deiectionis
stoma hi curatio 218
nauseabundis balneum
non prodesse à cibo
383

neruus an hepati adsit
492

neruo uulnerato mittē
dus sanguis 300.
uulnerato frigida no
cent 49

nerui puncti curatio f.
327. 328. Et 180
nes quot modis ossib.
cohereant 8. qui
bus sint partibus exi
les, & quibus maio
res, & quare 29

neruorum situs in mus
culis f. 1. sect. 1.
Tendonum & liga
mentorū figura f. 5.
Sect. 1. colore 6.
testiculi usus 63.
mollium & durorū
ratio

INDEX.

ratio 60. conuul-
 forum curatio 332
 neruis quæ partes care
 ant f.4. Sect.1. cō
 tuis conueniens cata
 plasma 243
 neruos natura longius
 productos corrobo-
 rat 29
 nigroris et palloris cau-
 sa 153
 nocti ambulos quid fa-
 ciat 478
 nome per chirurgiam
 quomodo curentur
 324
 nuces regie quæ dictæ
 sint 471
 nucū uariæ species ib.
 nutricis ualide signa
 355
 nutriendis ægris modus
 quis 161
 nutrimenta quo ordine
 fieri debeant 25
 nutrimentum animalis

330. partium hu-
 miditas ceuros p eas
 sparsa 185
 nutrimenti & alimenti
 differentia 385. &
 medicamenti differē-
 tia ibid. quantitas
 uel qualitas minuen-
 da ubi 66
 nutritionis ordo in tria
 tempora dist. ibutus
 25. quarta species
 26

O

Obesis aut macilentis
 quomodo meden. u.
 315
 obesitatis uel incrassati
 corporis curatio f.
 237
 Obstructio quid 460
 qbus facie accidat 7
 Obstructionis remediū
 226
 ocularia medicamenta
 qualia & quæ 206
 d 3 oculi

INDEX.

- oculi conuulsi curatio 400
- 332. purulentia quo modo purganda 331.
- corneae tunicæ ususf. 20.
- arachnoidis tunica ibid.
- oculorum doloris remedium 75.
- dolorum curatio 431.
- tunicæ forma & usus 19.
- fluxionis curatio 70. 179.
- doloribus quæ uena secanda 302.
- suffusionum curatio 429
- oculis quæ conueniant medicamenta 332
- odora semper eligenda 412
- œdema quid 452. & inflatio quid differat 453
- œdemate nec thoracē, nec iē cur infestari 71
- olerum cibus 396
- olīna stomachum iuuat 400
- oliuarum usus 399
- omentum quid 23.
- ut non necessariū 26
- ophiasis quid & unde 453
- ophthalmia quid 463
- ophthalmiæ curatio f. 204. 207
- ophthalmicis quid proficit 435
- opium medicam. 175
- organa uocis quæ 444
- organorum respiratio nis auxilia 210
- oris uentriculi morborum causæ 151
- oris uentriculi à cerebri consensus 160
- ore non est opus ad respirandum sanis 48
- orientales & occidentales ciuitates quæ dicuntur 447
- orthopnoici qui dicuntur 465

INDEX.

os matricis quid 469

os uentriculi quid 466

ossis colatorij usus & situs 16.17

ossa quæ citius glutinētur 345. nervo prædita quæ f.4. Sect.1.

puellorum sola uniri posse 345. quando reponenda 345

ossium perforatio 115

fracturæ c. rati f. 248. humanorum

usus 435

oua dura quæ dicantur 472

ouorum usus 435. uariæ species 472

ouilli stercoreis usus f. 434

oxycratum potus 394

oxygala quid 472

oxymeli optimum epileptico 409. ad

uacuationem quando sumendum 169

P

Palmae uerticis usus 399

Palmularum usus ibid.

Palloris et nigroris causæ 153

Palpitatio quid 443

palpitatio quibus accidat partibus 61

palpitationis cordis curatio 241

panis conueniens iuueni 389 purissimi

confectio 388.389.

genera & usus 388

papaueris usus 398

paralysis quid 454.

linguæ quid 439

parenchyma q. l. 460

parentum morbi in filios

deriuantur 530

paristhmiorum curatio 432

parotides quando et quomodo

suppurandæ f. 70

d 4 partes

INDEX.

partes instrumentales à similarium affecti- one lesæ quomodo curande 341. for- tibus proximis ab ijs uim accipiunt 62. neruis carentes f. 4. Sect. 1. leuissima et tenuissima corporis quæ sint 9	ta ut differant f. 5. Sect. 1.
partium pro salubrita- te affectus ratio 191. nutrimentum, humi- ditas ceuros per eas sparsa 186	pepones & similes qd profint 397
partibus laxioribus et infirmioribus fluxio- nes sepius accidat 61	periodi febrium quare uariantur 254
partus unde 353	peripneumonicis quæ conferant 310
pastinacæ syluestris u- sus 397	peritoneos quid eius- que forma, situs & natura 23. 24
pectore affectio quæ ue- na secanda 303	pestis medicam. 484. in Antiochia quomodo dicamento curata f. 417
pedum stuporis causa 157	pestilentia uel pestis un- de 440
pelliculæ & ligamen- ta	pestilentia febris causa nulla efficacior 65
	phagoidis tunicae for- ma & usus 19
	philoniū medicam. 175
	phlegmon absq; pleni- tudine quādo fiat 43. an re uulsione sit ua- cuanda 496
	phleg-

INDEX.

phlegmone quid 448

phlegmone suppurans

quomodo et quando

secanda 341. iecur

pulmonē, et pectus

inuestante quæ uena

secanda 303. qui

facile tententur 45

occipitis quæ uena se

cauda 309

phlegmones iecoris cu

ratio 223. arthri

tudum curatio 249

phlegmonis curatio f.

430

phlegmonū causæ 130

phrenitis quid 456.

unde 141

phrenitidis febris solu-

tio quibus excretioni

bus fiat 282. cura

tio 197

phrenitidos differentia

et signa 104

phrenitidis signa 107

phrygi lapidis usus f.

431

phthisis quid 440

picra ad qd utilis 370

pilæ exercitiū ad quid

utile 372

pinguedo quid 471

pipcr utile crudis suc-

cis 413

pipereon 2

pisces saxatiles ad qd

utiles 365

pituita an in hepate co

quatur 493. et me

lancholia in epilepsia

36. crassa qd 437.

quæ corpori utilis 35

pituitæ causa et origo

40. aliæ species et

genera 36. diuersæ

diuersas affectiones

producunt 99. quæ

tuor species 34

pituitosa excremēta in

uentriculo qui 41

pituitosi humoris in

thorace contenti in-

d 5 di-

INDEX.

dicia	110	434. generatio f.
plantæ & animalis dif-		439
ferentia	160	pœoniæ radicis usus f.
plantarū liquores quot		431
tuplices	438	polychrista quid 470
plato quid apoplexiā		polychresta medicami-
appellârit	455	na non tuta 188
plenitudo quoad uires		polypus quid 464
quomodo dignosca-		in Polypo & similib.
tur	298	excidi cū affectu par-
plenitudinis utriusque		tes 331
purgatio quæ fol.		pomorum coctorū u-
310. utriusq; quan-		sus 398
titas et qualitates qui-		poplitum uena quando
buz definiantur	98	secanda 302
plethoricæ plenitudi-		porri usus 397
nis signa	ibid.	prænantium signa ex-
pleuritidi quando non		pulsus 354. proflu-
danda ptissana	228	uia unde 353
pleuritidis signa	110.	præteritorum cognitio
	127	128
pleuritides incoctæ q̃		principium morbi qd
dictæ	446	279
pleuritida & insepara-		principij exacti signa
bilia symptomata	113	280. in acutis mor-
podagræ curatio	431.	bis cognoscendi ra-
		tio

INDEX.

- | | | | |
|-------------------------|-----|------------------------|--------------|
| ratio | 287 | do utendum | 253. |
| prodigiorum aliquot | | ad quid utilis | 308. |
| exempla | 473 | 364. quando non | |
| profluvio intersecan- | | dāda pleuritidi | 228. |
| dam uenam cōtingen- | | pro medicamen. | 410 |
| te quid faciendū | 295 | ptissanae modus uomi- | |
| profluvium sanguinis | | tui ciendo | 321 |
| uena secta sedari | 303 | ptissanae usus | 405. |
| sanguinis pręgnanti | | confectio | ibid. |
| um unde | 353 | pudendi partes neruo | |
| profluvia sanguinis ex | | sissimę quare | 63 |
| profundo quomodo | | puelli stercus ad quid | |
| curanda | 339 | prosit | 432 |
| proptosis quid | 463 | pueri conuulsioni ob- | |
| pruna & ficus quibus | | noxij | 44. crudita- |
| pro sint | 367 | te pleni | 38 |
| prurigo unde | 137 | pueris uinum non utile | |
| pruritus causę | 154 | 365. quando uinū | |
| pseudopleuritis quid f. | | utile | 402 |
| 446 | | pueros elegantes gig- | |
| psorophthalmia quid | | nendi exemplū | 482. |
| 463 | | 483. matres cur | |
| pterygium quando per | | debeant lactare | 356 |
| chirurgiam curan- | | pulmo & dexter cor | |
| dum | 331 | dis uentriculus quib. | |
| ptisana in febribus quā | | adsint | 22 |
| | | pul- | |

INDEX.

pulmonis intemperiei
utriusq; indicia 109
affectus plerosq; è ce-
rebro ob consensum
oriri 477. affectus
non omnes esse pleu-
ritidas aut peripneu-
moniam 108
pulmone affecto quæ
vena secunda 303
pulmonum doloribus
quæ uena secunda 302
pulsus mortis indicium
85. febris, quã diu
febris est, non est na-
turalis 260. ueti-
tus excretiones indi-
cans 87. febriũ pu-
tridarum 84. 85. 86
durus & uehemens
quid differant 92. 83
tremulus quid 87.
in hecticis nunquam
magnus 86. cordis
maior, quàm arteria-
rum 83. 84. uer-

micans qui 89. for-
micans 88. uentri-
culi affectibus uariis
85. pro mollitie uel
duritie instrumento-
rum 88. uehemens
uires robustas indi-
cat 80. frigidi cor-
dis 87. differentie
secundum ætates 80.
differentie secundum
intermissionem 79.
acceptionis indicium
85. raritas pericu-
losa sola uehementia
utilis 81. inæqua-
lis collectiui quid &
quæ causa 81. ictus
quid propriè 82.
priuatio quid 86.
q̃ inter se coire pos-
sint 83. facultatis so-
lutæ et expressæ qua-
les 84. myuri quid
444. myuri q̃ 89
pulsus quæ facultas
match

INDEX.

mutet 494
 in Pulsu geminus mor-
 tus & gemina quies
 79
 pulsum usus duplex
 79. inæqualitas
 accessionibus quid in-
 dicet 85. uaria ge-
 nera 445
 punctura uentriculi cau-
 se 156
 purgandi ratio per san-
 guinis missionem 290
 purgantia quæ dicantur
 192. cum in-
 dicto exhibenda 308
 purgantium medicamen-
 torum ordo in pur-
 gandis humorib. 192
 purgatio quo pacto fie-
 ri debeat ubi sanguis
 mitti non potest 296
 per uomitum quomo-
 do fieri debeat 319.
 utriusq; plenitudinis
 310

purgationis capitis me-
 dicamentum 536
 pus laudabile 62
 putredo quid 439
 putrefacientia medi-
 camenta quæ dicantur
 471
 putrescentibus medica-
 camentis apta medi-
 camenta 326
 putridæ febres quæ s.
 460
 putridarum febrium opti-
 mum remedium 275
 putridi humores quom-
 modo curandi sint f.
 165

Q
 Qualitas & humor
 commutantur 137
 Quartanæ febris exer-
 citium 376. febris
 curatio per sanguis-
 nis emissionem 305.
 per theriacam cura-
 tio 278
 quara

INDEX.

quartus dies iudex se-	usus	26
ptimi	repletio quid	437
284	repletionis duo gene-	
quies in pulsu quomo-	ra	373
percipiatur	repurgantia quæ	470
83	resolutio quid	458
quotidianæ febris solu-	respirationis organo-	
tio quibus excretio-	rū auxilia 210. gra-	
nibus fiat	dus quot sint 55.56.	
282	difficilis causæ & si-	
quotidianæ febris sig-	gna 108. organa f.	
na	22.48. difficilis	
263	causæ in anguia	149
R	respirationem nō à no-	
Radicum usus	bis fieri exemplo pro-	
397	batur	480
Rarefaciens quid	retiformis plexus ubi	
470	locatus, eiusq; forma	
Ramex uariosus quid	& usus	17
454. carnosus qd	reuulsio	181
454	reuulsionem lōgissimē	
raphani usus	à particula affecta	
397	molienda	74 75
reciproci pulsus qui f.	rhythmus in quib. pul-	
445	sibus dignoscatur	8.
regij morbi curatio f.	in pulsu quid	79
219	rigens	
renes bilem attrahere		
cum lotionē & alijs		
quā emulgentibus		
non egere		54
renum ulceratorum in-		
dicia 120. sius &		

INDEX

rigentium causa & cu
ratio 139

rigor & horror unde

149. quid 443.

& tremor quid dif-
ferant 442

rigoris in tertianis &
quartanis cause 149

iudicatio in febris
266

risus ex auditu causa
nulla 160

ruptio unde 130

rusticorum iheriaca 427

rys quid 463

S

Salina ad quid pro-
sint 435

Sa si sapores 422

Sanguificatio quomo-
do fiat 52

Sanguis in uenis & ar-
terijs qualis sit 8.

uentriculorum cordis

9. ubi celeriter sit

emittendus 296. in

quibus morbis tuto
detrahi possit 299.

in quib. uenis sit mis-
tendus 300. quo-

modo mittendus ue-
re ineunte 290. di-

ciur confusio humo-
rum 32. in crudita-

te nunquam mittenda
293. probus

unde & ex quibus fe-
at cibis 39. in sy-

nocho quando detra-
hendus 275. quan-

do mittendus in lasse
tudine ulcerosa 293.

partu relicto quomo-
do euocandus 355.

mittendus si uires co-
sint 299. necessa-

rio mittendus quan-
do 296. Ierosus ue-

hiculum puri sangui-
nis 52. purus nul-

lus in corpore 437.

pro climaum ratio-
ne dea

INDEX.

ne detrahendus 533.
 quibus detrahendus
 295. ærugineus f.
 438. quando non
 mittendus etiam si o-
 mnia suadeant 291.
 292. quādo mitter-
 dus 301. nusquam
 melior, quā qui in
 mammillis conficitur
 54. in febris conti-
 nenti mittendus 299
 quibus, quando, &
 quantus detrahendus
 291
 sanguinis fluxus ē nari-
 bus curatio 430. flu-
 xus signū 107. flu-
 xionib. quomodo suc-
 currendū 242. flu-
 xus ē naribus curatio
 207. 208. suppres-
 sioni apta medicamē-
 ta 335. ante missio-
 nem quæ consideran-
 da 294. redundan-

tia quando uenæ se-
 ctione curanda 180.
 profluuiū ex profun-
 do quomodo curāda
 340. missio ad li-
 bras quinq; 297. ef-
 fectus in corpore 57.
 crassici causa 139. e-
 iecti aut uomiti signa
 120. ex pulmone re-
 iecti tria signa 119.
 missio quid præstet
 pharmacis purganti-
 bus 297. per nares
 eruptionis curatio
 193. mittendi ratio
 ubi habenda 297.
 missio quando diffe-
 renda 296. fluxus ē
 naribus alia curatio
 194. serosa pars se-
 cūdum magis uel mi-
 nus noxia 33. redun-
 dantiam non ubique
 postulare uenæ sectio-
 nem 293

sanguis

INDEX.

sanguini supprimendo
optimū cataplasma
339

sanguinem detracturo
quæ sint expendenda
298

saniei collectio quan-
do fiat 73

sanis & ægris signa cō-
munia 126

sanitatis tuendæ ratio
359. regula 360

sanitati quæ exercitia
profint 359. 360

sanitatem quid seruet
359. conseruantia
medicamenta 403

sanitate q̄ plerūq; uten-
tur 45

sapores acres 419

saporum in cibis diffe-
rentia 402. uaria
genera 418. 419.
differentiæ 418

ex sapore morbi signū
101

σαρκόκκλοι qui dicā-
tur 454

scabies unde oriatur f.
37. 235. quid 452

scarificatio quid pro-
fit 302. profundior

quando cōueniat 342
scarificationis curatio
182

scarificatione quando
in ulceribus utendum
336

scilliticum medicamen-
tum epilepticis pro-
dest 196

scirrhus quid 449

scirrho confert suffu-
migatio 220

scirrhi species 451

scirrhum facillimè con-
trahere, hepar, lienē
& renes 72

scirrhosorum tendonū
curatio 245

scolopendri usus 414

scythæ iracundi 489.
6 648

INDEX.

cur raro elephantia-	fit uel quomodo uita
si laborent, 240	ri possit 368
sedis ulcerum quib. cu-	sensus lesio an sit à ner
rentur 234	uo leso 498
semen ut concipiat mu-	sensuum purgationis
lier 484	medicam. 536
semen in utero quomo-	septimus dies inter de-
do augeatur 473	cretorios præcipuus
semina herbarum quæ	284
optima 398	septimum diem qui imi-
senectus & inclinans	tetur 284
ætas qd differant 42	septi transversæ curatio
senis pulsus qualis 80.	nis exemplum 475
senes plerunq; debiles	septitransversæ seu dia-
44. cui morbo ma-	phragmatis caput f.
ximè obnoxij sint f.	1. Sect. 1.
128	serapij ex aceto us.
senū exercitia qualia,	409
& ad qd utilia 377.	sermo unde 56
uictus ratio 366	sermonis & uocis or-
senibus quibus balneū	gana 19
conueniat 368. unū	serosa pars sanguinis
optimum 366. ui-	secundum magis uet
ctus humectans 367	minus noxia 33
senium humidū esse 42	serpentis exuuium ad
quomodo pducî pos-	quid utile 435
	serto-

INDEX.

ortoma & uertigo un	periculosus ubi	111.
de	causa et curatio	209
xti et septimi diei dis	singultus indicatio	121
similitudo	sinus quid	448
ca temperatura om-	sinuum & cauorum in	
niū pessima 45. cor	cute ulcerum curatio	
pōra quæ citius mo-	fitis causa 153. (325	
riatur	fitis remedium	394
ccæ partes quæ dican	sticuli unde fiant	99
tur 462. intempe	solidarum parium nu-	
rici species	trimentum	48
ccarum & contraria	somnus quibus egrotis	
rū temperaturarum	utilis aut inutilis f.	
causa	170. quibus mor-	
cci morbi qui curen-	bis utilis	171
tur	somni effectus	154
ccis uigiliæ infestis-	somnolenti unde fiant	99
mæ 168. affectib.	sonitus aurium causæ &	
balnei utilitas	curatio	205
ccitatis gradus quot	spasmi causæ	147
185	spasmo quæ ætas ple-	
ccitati corporum suc	runq; laboret	44
cedit frigiditas quan-	sphacelos quid	453
do	spicata unguenta	370
gnum quid	spicanardi usus	415
ngultus quid	spina & guttur per cō	
	e 2 sensum	

INDEX.

sensum offenduntur	221.222
114	spondylarum humiditas crassa & uiscosa
spinae partes quo altiores eò prestantiores	48
18	spui pauci in magnatussi causa
spinalis medulla quid et quomodo à cerebro differat	150
17	stabilis pulsus q
spiratio quid	445
439	stercus canis ad quid profit
spirationis defectus qd significet	432
125	sternutatio bona quando
spiritus angustia quid	98
466. in uenis et arterijs qualis sit	8.
8.	sternutationis uomitus & tussis usus & cause
quibus de causis amittatur	144
97	sternutamenti usus & mouendi ratio coryza
spiritus cohibitio quibus affectibus profit	24
478	344
spirituum & facultatum usus	431
67	stomachi doloris curatio
splen seu lien qualis, et eius usus	211
26	stomachus qui dicatur
splenetici qui dicantur	466
467	strabilismus quid
spleneticorum curatio	442
	442.458
	strumae quae sint
	454
	struma-

INDEX.

- | | |
|--------------------------|--------------------------|
| strumarā curatio 329 | nem 351 |
| στυφνὸν quid 335 | suffocationis uteri cau- |
| stupefacientia quando | sa 348. curatæ ex |
| fluxum sistentibus mi- | emplum 355. cura |
| scenda 211. qua ra- | tio 356. 357 |
| tione sanguinis reie- | suffocatione pro cura- |
| ctionem miscenda | ta Galenus accepit |
| 174 | 400 aureos 358 |
| stupor quid 443 | suffusionis causæ 158 |
| stuporis pedum causæ | suffusionum causæ 195 |
| 157 | suilla an ciborum opti- |
| succi mali causa 49. | mus 495 |
| uitiosi cibaria quot | supfluitas cuiusq; par- |
| tuplicia 40. crassi | tis dispositionis est f. |
| glutinosiq; alimenta | 103 |
| 401 | surdastri qui 464 |
| succorum crudorum re- | syderatio quid 453 |
| medium 413 | symptoma prius cura- |
| sudor & uapor quid | re quàm morbū quan- |
| differant 438 | do conueniat 176 |
| sudoris frigidi origo et | symptomatum differen- |
| signa 115 | tiæ quot 177 |
| ex sudore morbi signa | syncope quid 132. qui |
| 101 | maximè periclitentur |
| sudorū qualitates 116 | 77. 78 |
| suffocatio ob repletio- | syncopes curatio 215. |
| | e 3 uomi- |

INDEX.

- vomitu curāda 320.
 seu deliquiorum ani-
 mi causæ 128. ge-
 nera & species 133.
 causæ quot sint 131.
 ex flatulento spiritu
 curatio 243
 Syncopen uitare quib.
 rationibus conueniat
 135
 synochorū species 275
 generatio & qd 271
 curatio 275
 T
 Tabes quid 440.
 uel marasmus duplex
 441
 Tabis species & cura-
 tio 235
 Talpe uisus qualis 160
 taurinum cornu ad qd
 utili 430
 temperatura quæ pesti-
 ma sit 45
 temperaturarum cōtra-
 riarum causa 47
 tempora morborū quæ
 & quot 278. 279
 temperies seruāda 330
 tendonis generatio &
 usus 48
 tendones & nerui quot
 modis ossibus coha-
 rent 8. medij in-
 ter ligamenta & ner-
 uos f. 4. sect. 1.
 tendonum scirrhosorū
 curatio 245. color 6
 terebynthinae usus 415
 terræ intestina ad quid
 prosint 436
 tertianæ febris curatio
 265. solutio quib.
 excretionibus fiat f.
 282. & quartanæ
 febris signa 262. 263
 tertianos balneo cura-
 ri 379
 testiculi neruorum u-
 sus 63
 testiculorum qualitates
 54. uenæ & arte-
 riæ

INDEX.

- ria à longinquo ijs ac
 cedunt f. 2. Sect. 1.
 theriaca quomodo u-
 tendum 371. qui-
 bus utilis 416. 417
 theriacæ usus 237.
 compositio & usus f.
 229. 417. propi-
 nandæ quantitas 416
 thoracæ œdemate nun-
 quam infestari 71
 timidi quomodo inci-
 dendi 345
 timoris causa 141
 timesmos quid 469
 tityi fabula 490
 tonicæ actionis uehe-
 mentis signum 15
 torpor quid 443
 trachoma quid 463
 tremor & rigor quid
 differant 442
 tremoris causa & cu-
 ratio 146. 148
 tremoribus quando ue-
 næ sectio conueniat
- 477
 trifolium decoctum ad
 quid utile 411
 tristitiâ quid læuet 171
 triticeæ farinæ usus 423
 triticum mansum ad
 quid proffit 435
 tumoris excidendi de-
 liberatio 338
 tumores variari pro
 fluentium humorum
 differentijs in parti-
 bus similaribus 178
 tumorum qui facilius
 curentur 311
 tumoribus nullis adhi-
 benda attenuantia 218
 tussis differentiæ & cau-
 se 108. generatio
 ex intemperie 208.
 curatio cōmunis 150
 208. usus & cau-
 se 144

V

Vacuandum quando
 sit 312

c 4

Va-

INDEX.

- Vacuare crudos succos
 periculosum 182.
 corpus non repletum
 quando licet 179
 Vacuatio quando ne-
 cessaria 165
 uacuationis in febre ob-
 seruatio 254
 uacuationes cur facien-
 de 368
 uapor & sudor quid
 differant 438
 uari quid 462
 uarices quid 455
 uatij quid 462
 uehiculum puri sangui-
 nis quod sit 52
 uena quæ quibus affe-
 ctis partibus secanda
 301. ubi celeriter sit
 secanda 296. & ar-
 teria in cæteris cohæ-
 rent; in cerebro diuer-
 tunt f.2. Sect.1. sem-
 per in directo secan-
 de 304
 uenæ usus 9. sectio
 tremoribus et hydro-
 pisibus quando con-
 ueniat 477.478
 uenam nullam esse in
 oculi partibus 59.
 secandi scopi duo f.
 290
 uenæ quando sint ape-
 riendæ 291. & ar-
 teriæ testiculorum et
 mammarum à lōgin-
 quo ijs accedunt f.2.
 Sect.1. amputatæ
 regenerantur, & nō
 arteriæ quare 47.
 q̄ sint secandæ 300.
 & arteriæ quib. uijs
 ingrediantur in me-
 dullam sp̄malem 59
 uenarum sectiones quā-
 do fieri debeant 290
 uide sanguis. coar-
 ctatio 488. sp̄iri-
 tus qualis 8
 uenationes ad quid uti-
 les

INDEX.

les 373
 uenenū acutissimū 482
 ueneni remedium 413
 uenter durus quib. mol-
 liendus 315
 uentris solutio in seni-
 bus quib. faciēda 368
 uentriculus quibus ci-
 bis saturetur 24
 uentriculi oris morbo-
 rum causæ 151. do-
 loris curatio 211.
 ex fluxione morbi
 pessimi qui 68 for-
 ma, situs & usus 23.
 intemperies an facile
 curetur 495. & ce-
 rebri confusi signum
 105. affectioni pra-
 uæ medicamentū con-
 ueniens 216. 217
 uētriculo imbecillo ex
 diarrhoëa remedium
 218. imbecillo cō-
 ferentia 213
 uentriculum & intesti-

na duplici modo nu-
 triri 24. cordis san-
 guis & spiritus 9
 uentus uulneribus ad-
 quid agendum 334
 uentorum & aëris dif-
 ferentia 189
 uenus cui conuenit in-
 temperiei 361. sic-
 cis inimicissima 45
 ueneris usus & scopus
 360. effectus 155
 ueneri usus illiciti in-
 commoda 241
 ueris principio uacuā-
 dum 312
 ueris initium 47
 uere ineunte quomodo
 sanguis mittendus f.
 290
 uermicans pulsus q 89
 uertebraarū humiditas
 crassa & uiscosa 48
 uertigo unde 105
 uertiginis curatio 194
 uesica & matrix in mu-
 liere

INDEX.

- liere qd differant 28
 uesicae utriusq; constitu-
 tio et usus 26. 27.
 et ani musculi quare
 contrario motu non
 moueantur 11. et
 ani musculorum offi-
 cium ibid.
 uesparum morsus cura-
 tio 433
 uetula Athenis Cicuta
 uescens 491
 uictus humectans seni-
 bus 367. ratio quæ
 manet et sero 168.
 364. ratio duplex
 360. ratio post et
 exercitium 361
 uide utero suffocate
 curatio 352 cur ali-
 quando grauius labo-
 rent 352
 uigilie prohibende quo-
 modo 195. 196
 uigilia q. et quæ no-
 ceant 50
 uincula non iniicienda
 parti inflamata, sed
 illi opposita 71. qui-
 bus uipera sit pro-
 prefocata, tumoris
 gutturis cõferre 432
 uinũ astringens 404.
 optimum senib. 366.
 pueris non utile 365.
 dulce et nigrũ ad qd
 utile 391. hepati-
 cis utile 392. immo-
 dicis exolutionibus
 utile 171. pueris
 quare utile 402.
 uenenis aduersarium
 413
 uini dotes 404. me-
 diocritas quid profit
 391. uariæ speci-
 es et differentie 391
 uina aquosa ne acescãt
 430. 431
 uiperae quomodo cicu-
 rentur 483
 uiperarum morsus uis
 et

INDEX.

- Et* curatio 487.
 morsus curatio 433
 uir quidam mente cap-
 ptus per tredecim di-
 es, *Et* postea sana-
 tus 479
 uiri corpus purius foe-
 mine corpore 42
 uirge constitutio *Et*
 quid differat à liga-
 mentis 28
 uiriū substantia ex qui-
 bus constet, *Et* qui-
 bus conseruetur 51.
 signū certissimū 101
 uirtus ratio 539
 uirtutes naturales una
 sunt 530
 uisus restitutio 486
 uiscerum affectibus ua-
 lentiora medicamen-
 ta conueniunt 190
 uita humana brevis f.
 529
 uita omnis ex cordis tē-
 periei tendet 73
 uitæ longioris signa f.
 103
 uitrea pituita q̄sit 34
 ulcerosus affectus un-
 de 137
 ulcus quibus sit abluen-
 dum cum opus est f.
 326
 ulceris maligni curan-
 di ordo 344. ma-
 ligni curatio 337.
 in carne facti curatio
 244. ligandi mo-
 dus 337
 ulcera ad uinum quan-
 do excidi possint f.
 337. cacoëthe quæ
 460. capitis an sint
 uomitu purganda f.
 498. ex pituita nō
 esse aperienda 235.
 maligna quæ dicantur
 450
 ulcerū curatio per sca-
 rificationē 336. in-
 ueteratorum cura-
 tio

INDEX.

- No 432. ambustorū
 curatio 434. causæ
 140. ueterū cura-
 tio 176. sedis quib.
 curentur 234
 ulceribus putrescenti-
 bus apta medicamen-
 ta 326. malignis
 quæ medicamēta ad-
 hibenda 326
 unctio 376
 unguenta foliata & spi-
 cata 370
 unguis quid 463
 uocis & sermonis or-
 gana 19. 22. 444.
 acute & grauis cau-
 se 150. cassitate cau-
 se 151. intensio qui-
 bus morbis p̄sit 183
 uoluntariarum actio-
 num per somnū ra-
 tiones 13
 uolatilium carnes quæ
 optime 390
 uomitus quando sit cui-
 tandus 533. in syn-
 cope quibus ciendus
 320. epilepsie pro-
 fuit 211. quo pacto
 cietur. 322. causa
 156. sternutationis
 & tussis usus & cau-
 se 144
 uomitui commoda quæ
 321
 uomitum singulis men-
 sibus præcipiebāt ue-
 teres quare 319
 in Vomitorijs quæ ui-
 tanda 320
 urina pessima quæ 92
 laudabilis unde fit
 62. optima quæ sit
 91. omnium opti-
 ma quæ sit 96
 urine indicationes 91.
 cognitio 540. pin-
 guis significationes
 94. uariæ indicatio-
 nes 95. profluuij
 definitio 469. sedi-
 mentum

INDEX.

mentum album quid significet 56. turbida triplex differentia et effectus praesignifica tio 92. quib. febr. bus plurimum subsi dentiae habeant 93	ob in anitionem 351 suffocationis curatio 350. suffocatio in tuidis ex seminis re tentione 352. dolo res ex ocio 349
urinam quid prouocet 423. qd mouat 436	utero inflammato quae uena potius secanda 351
urinarum crudarum pes sima 93. fursuracea rum significationes 94	uuarum passarum usus 400
quae sit optima in ae grotis 92. descri ptio 91	uulneri receti quid ma ximè profit 335
urinis quaedam pilis si milis 475	uulnera intestinorum cu ratu difficilia 231.
urinas spectandas in fe bribus 91	epiploi uel peritonei integro altero facilia 231
ursa generatio 483	uulneratis in uentre q situs esse debeat 334
uteri suffocationis cau sa 348. offensiones unde 353. cōuulsio	uuulosarum dispositio num curatio 216
	uuulus quid 468

Finis Indicis Aphorismorum.

ERRATA QVAE NOBIS IN-
uitis, Can lide Lector ob obscurum & barbarum
autographon irrepserunt, sic emendabis.

Nota, prior numerus paginam,
posterior lineam denotat.

Pap. 2. linea 8. leg. contrarijs ibid. lin. 11. pro
ducta ib. 16. pectoris 3. 21. qui 5. 16. quæq; 6. 12.
nullus 11. 25. particulam 11. 2. ijs. ib. 26. uentris
13. 4. uariè ibid. 5. bra, & quum 14. 16. tungitur
ibid. 23. sanis 16. 3. firmitus ib. 5. cogitationi ib.
15. sanis. ib. 18. purgentur 19. 23. læ locum 20. 8.
quæ ib. 16. cornu 22. 5. dele quæ 23. 6. simus fieret
item oblōgus 25. 7. ijsq; ib. 8. affigitur. ib. 13. uen-
triculus ib. 20. alterationem ib. 21. affixionem 26
25. re. pur. 27. 18. citra noxā ib. 23. Singularis 16
24. fuit 28. 22. tiā, tūm 29. 3. sensus 32. 15. scarif.
34. 19. horrerent 35. 5. morem ib. 18. elaboratum
ib. 22. factus 37. 10. præter ea 38. 22. de ib. 25. f-
cū 40. 9. renum 42. 23. senium 44. 22. qui 46.
6. marasmus 47. 3. spermatis ib. 12. fiat ib. 26. effi-
ci 50. 19. alterationem 51. 26. cum 52. 25. partē
53. 6. de lema. ib. 12. intestinum ib. 23. quidā 54.
15. præd. 56. 15. bus insunt 57. 5. in sang. ibid. 22.
sanguinis. ib. 25. perpatitur 58. 13. sanguine puro
ib. 14. pro ib. 19. locus 60. 8. particulis 61. 2. pal-
pitatio 62. 6. participent 63. 21. differētijs ib. 13.
Glauc. 64. 25. dictus 65. 18. modicū ib. 19. exces-
sum

sum 68.23. percuratu 69.12. cephalea ib.26. influant 70.12.
 tenuātia 71.17. caputūe ib.21. sin.73.23. Nemo 75.12. cauē
 da 76.21. erys.77.13. medicamētis 79.19. differēt ib.26. qe=
 tis 80.18. senis i.23. simus est iuuen.81.18. comitatur sēp cor
 dis ib.21. cōpressio 84.20. ordinis 85.5. differēt.86.20. distē
 sionis 87.12. paruos 89.8. differētia ib.16. emarcuerūt 92.3.
 nephrit.94.4. uenose i.14. Diabete ib.18. hordeacee 99.26.
 uerō 100.1. euacuat.101.14. ardētissimū 102.12. quacūq; ib.
 18. amurice 105.9. lues nau.107.12. dolorifico i.15. ē narib.
 108.25. oportet 109.16. spiratio 111.8. inconst. ib.12. hepati
 112.25. laborat 113.16. ouor.114.22. peruranij 116.2. autem
 ib.7. saporem ib.12. sit'ne 118.6. ait 120.5. Phoenicium 122.
 15. sanguinis 128.3. cibus 129.8. patiuntur 130.14. scilicet
 131.23. uertar 132.12. nouit ib.22. reprehendar 133.8. scil.
 ib.11. cū aut diuturnitate 134.12. est 135.23. auxiliēis 136.
 19. perferri 139.19. mento 140.10. arodendi 141.24. exter
 nis 142.21. membranarum 144.3. aut ob ib.11. arden
 tes ib.14. different. ibid.25. prioris 145.8. dolere 148.9.
 part. ib.12. sitq; 149.14. est. 152.15. internis ib.17. im
 pensius ibi.18. supernis, ib.19. tunc. 153. replent ibid.15.
 splen. 154.7. incidat 156.12. quo 160.2. manuum ib.3. ridi
 cularū 161.12. imbecillia 162.12. prior uenies 163.17.
 minuas ib.22. conferues 164.22. facta 165.12. perniciosi
 167.24. sanitati & 25. Ario 168.5. gustare 169.25. pro
 pinatur 170.16. interiores ib.18. uiresq; 171.4. internis
 & externis ib.9. cogitio ib.16. siccis 173.8. dissolutionem
 175.8. stupefaciat ib.23. penetrat 177.29. cæcolor 178.6.

arc.

are. 178. 22. illa cibis 179. 5. dele a astrin. ib. 6. intemp. ib. 11.
 nitiosus 180. 15. abundantis 185. 3. communia 191. 16. si 193.
 18. nare prorumpat 195. 25. sedantur 197. 8. redundante ib.
 18. detractio 198. 13. diffecet 199. 2. uimorū. ib. 11. cremore
 ib. 20. faciat 200. 3. Brassicæ folia 201. 17. sceminis ib. 23. in
 maturarū ib. 25. cydonij 202. 7. affuso ib. 18. substantia 205.
 9. diffecantibus 206. 20. hæmatites ib. Stibium 207. 15. calidē
 208. 14. duab. 210. 1. pueris 211. 3. cōflata 214. 11. leni 217. 4.
 os 218. 9. uinciri 219. 12. dele & 220. 8. uomitu ib. 15. omni-
 um q; 223. 7. exquisitiss. ib. 11. sine 226. 23. astringentia 229.
 1. alio ib. 22. quæ 231. 11. numeratur 233. 25. ex sang. 235. 9.
 citius 236. 15. ministrato 239. 9. medicamento 240. 1. caninē
 ibid. 12. cutem 241. 26. quam 248. 2. coxend. 249. 9. callos
 255. 13. tenuium cor. ibid. 20. officio, oportet. 259. 7. percip. ib.
 8. penit. ib. 19. mordaces manu tan. 260. 14. & quies duab.
 261. 19. significant 264. 14. intumes. 265. 16. inguinis 266.
 1. eros. 267. 17. dicitur 269. 7. uigere ib. 8. appareant ib. 19.
 salsa 271. 3. si hæ. 272. 3. ac tamd. 280. 24. sine 285. 2. maxie
 me 286. 12. attingat 287. 20. nephritis 288. 8. sunt ibid. 19.
 perfecta 289. 3. hi 9. missionem 295. 2. hemoptoicis 304. 11. ē
 di. 305. 24. arbitraris 311. 26. uimolentos 365. 13. seruatur
 383. 12. Quos 395. 5. Thoracis 396. 22. oleraceis 397. 13.
 porri. 410. 3. oxymeli 429. 26. ceruini 431. 8. domum ib. 20.
 comitalem 433. 25. uesperum 434. 8. ulcera ambusta 435.
 21. bullitum 436. 8. albumen 437. 2. dele quibus 447. 9.
 Leptice 485. 11. fame.

Cetera diligens Lector facile proprio
 Marte emendabit.

RABI MOYSIS
APHORISMI, EX

Galeno collecti.

SECTIO I.

De situ, forma & usu partium cor-
poris humani.



VSCVLIS om
nibus, aut in i-
psū caput ner-
uus infigitur,
à cerebro, uel
spinali medul-
la facultatē sen-
tiendi, ac mo-
uendi adferēs:

aut omnino in earū partium aliquā,
quæ capiti subsunt, aut certē non in-
fra medium corpus. Ad caudam au-
tem nunquam: alioqui principium
ea esset Musculi & non finis. Gal. 7.
de us. part.

2 Caput septi transuersi, ad quod
annectuntur fibræ: & in quod nerui
ipsi descendunt, in medio eius consi-
stunt: extrema autē, seu fines sunt, quæ

A cit

circumscribunt ipsum or. 13. de usu
part.

3 In cæteris corporis partibus, a
deò propinquæ sunt semper uena &
arteria, ut mutuò sese contingant, ac
uena semper arteriæ incumbât: at in
cerebro quod satius esset ex locis di-
uersis, aut potius contrarius uasa in
ipsum inseri, à corde sursum per collū
uenæ atq; arteriæ ad ipsum usq; ca-
put simul prodantur, inde hæ quidē
ad plexum retiformant. Illæ autem
ad summum capitis uerticem diuer-
tunt. 9. eiusdem.

4 Maior pars totius arteriæ ad iu-
gatum tendens, ossi medio pectoris
iungitur. Vena autem caua illi subdi-
tur, ex quo arteriis positio compara-
tur opportunissima: ut quum per col-
lum diuisum feruntur arteriæ quidē
in profundo sint: uenæ autem ipsis
incumbant. 16. eiusdem.

5 Venæ atq; arteriæ in suū quæcūq;
ut sibi est proximum organum fun-
duntur, ad testiculos autē atq; mam-
mas natura eas, à longinquo porre-
xit,

xix, multipliciterq̃, priusq̃ inserta-
ret, inuoluit, ut diutius in eis uasis
sanguis moraretur, & lac atq̃ semen
exactim coquerentur. Ibidem.

6 Natura ossibus exiguas adeo tri-
buit uenas, ut ne clarè quidē cernan-
tur. Nusquam autem uena ab arteria
relinquit̃, sed ubi uas arteriosum ui-
deris, ibi necessum est uenam etiam
adesse: at uenę sine arterijs, quanquā
pauce admodum: in corpora quę ad
cutim pertinent. Veluti in cruribus
& anterioribus atq̃ externis brachij
partibus disseminantur. Ibid.

7 Retiformis plexus ascarotiti-
bus arterijs ad basim cerebri conuo-
lutis oritur, quo circa neruo lęso aut
conuulso, lęduntur simul & arteriæ.
10 de pulsib.

8 Vbi teretes syndesmi tendones-
quę uisunt̃, p̃ dissectionū sunt ignari
neruos eos imaginant̃: potissimū &
q̃ tēdones multo duriores eos ner-
uis esse non intelligant. At ubi lati
sunt eos à neruis diuersos esse, pu-
tant: cæterum ipsos à sese discernere

A 2 non

non ualent, neque nos asserimus, nisi ex dissectionis ratione: omnium quę isthic continentur partium naturam didicissemus. 6. methodi.

9 Nullus neruus, neque in ossa, neque in cartilagine, neque in ligamenta, neque in quasuis glandulas, quarum duplex est natura, inseritur, quę motu uoluntario aut sensu non indigent. Glandulae uero ad succos animanti utiles comparatae, quemadmodum arterias & uenas, ita & neruos habuerunt unius sensus gratia. Et ex ossibus omnibus, solis dentibus neruus mollis inest, tum quod nudi ipsi, quae accidunt sint expositi, tum quod una cum lingua sentire oportuit sapores ac diiudicare, non aliter quam ceteras oris particulas. 16. de us. part.

10 Tendones tanto sunt duriores neruis, quanto ligamenti molliores: quin & mole corporis tales, ut qui ex ambobus maxime facti sint. Multisque locis neruos sexcupla, multis etiam decupla crassitudine superant, & merito, siquidem nerui & ligamenti usum

et usum exhibere eos oportebat.

Item est ligamentū quidem omne insensibile, nervus autem omnis sensu præditus: tendo uerò neq; insensibilis qui est nerui particeps, neq; ita sensibilis ut nervus, non enim est nervus tum. 1. de motu Musc.

11 Tria sunt instrumenta corporis, forma prorsus similia, nervus, ligamentum, & Tendo. Quorum hic quidem alligat Musculos subiectis ossibus, in quorū capita munita cartilagine inseritur, estq; nervosus: utpote ex nervo, & ligamento compositus, ac nervus omnis rotunda est figura, quoq; diuersa ratione. Tendo non item, sed sunt quidam rotundi, alij latè. Ligamenta autem pleraq; lata & ampla sunt sicut pelliculæ. 1. de placitis Hipp. & Plat. qui nondum extitit.

12 Omnes pelliculæ sunt tenues, & molles, ligamenta uerò ratione alterius magis uel minus crassa & dura. Item Ligamentorum quedam media sunt inter nervum, & cartilaginē.

A 3

Cæte

Cæterorum autē duriciem, nec mem-
brana, nec neruus, nec durissimus,
neq; tendones attingunt. Ibidem.

13 Neruus, ligamentum, & tendo-
tria sunt organa, alba solidaq; pariter
& sanguinis expertia, quæ in fibras
soluta scinduntur, præter ligamenta.
Ea enim, ob duritiē, nullo modo re-
solui possunt. Ibid.

14 Musculus est instrumentū non
sensus, sed motus, etiam si utriusq; sit
particeps, quia nullus motus volun-
tarius potest sine Musculis fieri, &
sensus inest uniuerſis particulis, que
nerui sint participes. i. de motu Mu-
scul.

15 Ligamenta per quæ ossib. Mu-
sculi colligantur, coalescuntq; mem-
branas circa ipsos gignunt, & quas-
dam intro propagines in ipsam car-
nem Musculorum demittunt. Ibid.

16 Omnis tendo, in ossiū aliquod
omnino inseritur, non tamen om-
nis Musculus, in tendonem desinit,
In nullo enim Musculorum mouen-
tium linguam (constat autem ex ua-
rijs

rijs Musculis) tēdo nascitur, quæ nul-
lum os erat lingua motura. Similiter
mouentium labra, oculos, faciē nul-
lus in tendonem desinit: Item eorum
qui quippiam aliud, quam os mouēt
nonnulli, ueluti in oculis lingua, te-
stibus porri, laryngæ, &c. ceteri uerò
omnes desinunt. Ibid.

17 Quibus uasa, à natura astrictos
meatus sortita sunt, facile in iecoris
& renum obstructionem incidunt.
Quippe in uenis, quæ per caua ieci-
noris, aut per mesareon feruntur, re-
dundans humor necessario, uel pu-
tredinem contrahit, uel continentes
particulas phlegmone afficit. Gal.
de Euthym. & cacothym.

18 Extenuata corpora fiunt ex in-
equali membrorum temperatura, ue-
luti si quibus uentriculus calidissi-
mus, cerebrum uerò frigidissimum,
uel contra fuerit: aut si quibus pul-
mo & pectus frigida, uentriculus ue-
rò calidus, eodem modo etsi hepate
calido, reliqua sint frigidissima, atq;
ita in cæteris. 3. de alimentis.

19 Ossa maiora, quęcunq; neruo aut tendoni necessario cohærent, uel perforantur, uel membranıs coope- riuntur, & neutro participant, quę nuda fuerint. Vbi igitur hęc, quę mē- branıs cooperiūtur, nerui, uenę, aut ligamenta iunguntur, ibi duriores sunt earum membranarum partes, ut ab hęc conseruentur. 2. de us. part.

20 Sanguis & spiritus in uenis, & arteriis sunt calidi, at sanguis arteria- rum multo subtilior & uaporosior est, eo qui in uenis continetur. Quemad- modum à contrario uenarum spiri- tus id quidem paucum atq; caligino- sum est, eo qui in arteriis habetur.

Communis est autem utrisq; *ἀναστό- μωσις*, hoc est, mutua quędam oscila- lorum apertio, ubiq; in corpore per quam exactis quibusdam & angu- stis uis sanguinem ac spiritum sibi uicissim, communicant. Gal. 6. de us. part.

21 Itaq; cordis ipsius uentriculi, pulsantes, quidem ambo apparēt a- perto thorace, non tamen ex æquo in u-

APHORISMI.

in utroq[ue] sanguis & spiritus contine-
tur, abundat enim in dextro quidem
sanguis, in sinistro uerò spiritus. Ibid.

22 Leuissimum eorum, quæ sunt
in corpore, est spiritus, secūdū hūc
halitus: tertio sanguis exactē certus
absolutusq[ue]. 3. de uirtut. naturalib.

23 Quædam sunt re ipsa duo seu
gemina, quæ unum tamen uulgò es-
se existimantur, ea sunt cerebrum,
lingua, maxilla, pulmo, matrix, & hu-
iusmodi: in his enim, dextræ sinistris
partes sunt, & numero partes, & ma-
gnitudine, & colore, & uirtute, liqui-
dem uenarum & arteriarum, adeoq[ue]
neruorum, quantum in una est earū,
tantundem, & in altera reperitur. Ga-
len. 6. de opificio Dei, qui nondum,
quod sciam extitit.

24 Lingua duas habuit in seipsam
insertas arterias: utrinq[ue] uidelicet ue-
nam: duas itidem uenas: at neruorū
coniūgo eius duas, mollem unam, al-
teram uerò duram: ac mollem quidē
in extremam ipsius pelliculam, durā
uerò in eius Musculos distributam:

A 5 ut

ut illa sapores discernere, hac uerò uoluntario motu moueri possint. II. de us. part.

25 Quatuor omnino differentia motuum reperiuntur, in musculis: nā aut contrahuntur, aut extenduntur, aut transferuntur, aut tensi manent. I. de motu Musc.

Addit Moyses.

Ex his uerbis & alijs Galeni in eodem libro de motu Muscul. summam collegi, ut complicitur membrū, animali facultate iuuante, contrahi ad caput suum oportere: ut uerò extendatur, externum. Quod si neuter tonum animale habuerit, æquipolentem partis ipsius motum fieri ueluti latitudinem quandam habentē. Si uerò omni uirtute destitutus fuerit, mortuum esse.

26 Si externum incideris Musculum, flecti membrum ultra mediam figuram uidebis. Pariq; modo si internum incidas, extendi particulas plus medio. Ibid.

27 Sola figura simpliciter media, Muscu

Musculos omnes quiescentes exhibet. Eaꝓ ius tantum accidit, qui ob ebrietatem, aut fatigationem, aut uirium infirmitatem eius corporis partes omnino exolutas habentē in mediam eas figuram reducere dormiendo, Musculis permiserunt. 2. de motu Musc.

28 In Musculo ani & uesicę, & diaphragmatis aliter quā in Musculis linguę res habet. Nam cū singulis harum partium unicus tantum lit rotūduꝛ, sine ullo opposito Musculus, in contrarios deduci motus, non æque faciliꝛ possunt. Musculi autē qui est ad uesicam & anum officium est, non excernere superflua alimēti, sed retinere, nisi fortē per accidens, quū desierint agere & phrenes, atꝓ omnes Musculi epigastrii intestina uentriculumꝓ presserint. Ibid.

29 Expiratio & inspiratio phrenibus fiunt, hęc quidem his agentibus & in seipsos coeuntibus: Illa uerò cōtensis & ab oppositis Musculis propulsis, aliās Musculis uentus agentibus,

12 **RABI MOYSIS**

bus, aliās intercostalibus, & his quidem solis. Ibid.

30 Quum expirationi cōtraria sit inspiratio, efflationi uerò uehemens inspiratio, priorem quidem oppositionem solę phrenes efficiunt, alterā uerò intercostales cum Musculis, qui ad thoracem ex collo scapuliscq̃ perueniunt. Ibid.

31 Musculi os sibi annexum quasi lapidem grauem sustinēt, si sint ualidi grauitatem ponderis non sentiunt: Si sint infirmi, tunc sentiunt, & auguntur cupiuntq̃ onus abijcere, & figurā mutare, nec possunt. Quo fit, ut quamuis impotētes simus ad motum, si præmimur dolore, aliās alio iactemus membra, figuram dolore carentem quærentes, sed nil inuenire potentes. 1. de mot. Musc.

32 Homines per somnum spirant reliquis Musculis omnibus præter eos, qui ad thoracem pertinent, tunc ferientibus. 5. de loci aff.

33 Dormientium anima non quiescit, neq̃ enim penitus expertes sensus

his q
sunt dormientes, quanquam eo-
rum actiones non omnes sunt natu-
rales, sed multæ ex his animales, ue-
luti, quumuarij transferunt membra
quum loquuntur, quod mirandum
non est, siquidem neq; palpebrarum
motui, neq; manuū ac pedum actio-
nibus animum semper adhibemus
dum uigilamus. Eadem autem est
causa in uigilantibus, & graui som-
no oppressis. 2. de mot. Musc.

Addit Moyses.

Galenus in eo libro, à proposito di-
gressus causam rei, neq; reddit, neq;
quæstionē soluit inductam. De dor-
mientium enim actionibus tantum
difficilem esse quæstionem fassus, ta-
cet. Ego igitur aliquot rationes huic
adferam, quas docēde actiones dor-
mientium, non sine causa uoluntari-
as esse utiles probaui, quarum prima
est, quòd uoluntas mouetur ex recor-
datione & memoria uisorum, quem-
admodum si quis ex inspectione stel-
larum, somniet ex his aliquam cer-
nere, aut semen mittat imaginatione
amica

amicæ ductæ, aut saliat ueluti pulue-
ris ictū sentiens. Secunda quòd ima-
ginationis effectuum tempora sunt
somnia: tunc enim cæteris rebus obli-
uioni relictis uoluntas, ad id q̄ obij-
ciē primum mouetur. Tertia q̄ ani-
mal somni tempore, ipso etiam Gale-
no afferente, sentiat, quanquā id qui-
dem remissius, & ueluti quid ab ope-
re fatigatus sentire potest. Ex his er-
go perspicit, quicquid Galenus de
his actionibus retulit, ad imaginatri-
cē uim & sensibilem referri: ut cum
primum ad oculos dormientis acce-
dit lumen, aut ad aures sonitus in-
gens, aut ubi aculeo iungitur, aut ue-
hementi calore, uel frigore, uel fame
affici contingit expergiscatur. Hunc
autem motum à natura sensus profi-
cisci. Neq̄ uerò quod conturbare de-
bent apoplectici & ebrī, nullo mo-
do expergiscantes. Sententia enim
in annis & in imbecilibus intelli-
gi debet. Quòd igitur edormien-
tes & uigilantes obliui quid fecerint,
aliī ambulēt, aliī coquantur, & actio-
nes

nes uoluntarias exercean, id ex impressionibus rerum priorum imaginatione conceptis, & firmitus asseruatis, uoluntatiq; in somno, uel presenti cogitatione obiectis. haecenus Moyses.

34 Meminimus semper actionem quas sani & his intenti fecimus, at earum quas uel ira, uel curis, uel ebrietate, uel phrenitide, uel metu capti agimus, non item. 2. de motu Musc.

Causa huius aphorismi (inqt Moyses) est memoriae uirtus labilis ac imbecilla genere, non nisi quae praecipue placeant, & cupiam consecutrici memoriae committit, ea uero in sanie diligenter seruat, & tuetur.

35 Sunt qui paruum aliquod corpus, flexis digitis etiam dormientes seruant. Id autem signum est tonicae actionis uehementis. Sicut & in maxillis coniunctis, & in meatuum excretoriorum musculis, qui ne in dormientibus quidem permittunt, quicquam excerni, priusquam ratio iusserit. Ibid.

36 Natura congenitam quādam motionem cerebro, cum corde tribuit qua inspirando se uentilaret, atque excitaret ad pulsum, expirando uerò pituitosa, & muncosa excrementa à se abigeret. Coarctatur enim cerebrum dum sese cōtrahit, quum uerò undiq; se dilatat funditur, atq; ita externus aër: illud, quum se retrahit, sequitur: cum uerò diffundit se efflatur. Gal. de instrumento olfactus.

37 Meninx tenuior in omnes cerebri partes se insinuat, totum ipsum contexens, extendensq;. Crassa uerò ab ipso est seiuncta, excidentibus tantū quibusdā uasis cohærēt. 8. de us. par.

38 Dura Meninx quæ cerebrum contegit, perforata est, ut per eius foramina purgantur pituitosa cerebri excrementa, & facilius uapor exeat, inspiratione & expiratione cerebri permixtus. Ibid.

39 Opposuit natura olfaciēdi sensorio, os quoddam uariē pertusum colatorium dictum, ueluti spōgiam quandam: simul ne aliud corpus dur-

runt

rum extrinsecus incidat, simul ne uiribus integris aer frigidus inspirando, in uentriculos cerebri irrumpat: Ibidem.

40 Retiformis plexus omnium, quæ circa adenes uisuntur maxima admiranda particula, collocatus est, inter os palati & cerebrum, complectens in orbem ipsum adenem pertingensq; retro longissime. Toti siquidem basi cerebri propemodum hic plexum subiicit ex maxima portione earum arteriarum, quæ à corde sursum ad caput feruntur contextus. Estq; non simplex rete, sed cuiusmodi sunt uulgaria piscatorum retia, si plura alia alijs cumulata superinijcias. Etenim ubi natura uult exacte materiam conficere diuturnam ei moram, in coctionis instrumentis comparat. 9. de us. part.

41 Spinalis medulla est humiditas crassa & uiscosa à cerebro ducta, & in uertebis contenta ad motionis facilitatem conducens. Meningibus autem uestitur, cerebri inuolucra si-

B milita

militudine prorsus referentibus, nisi
quod crassa medullæ spinalis me-
ninx undiq; tenuem tangit, & com-
prehendit, cerebri uerò crassa à tenui
seiuñcta, quoad ipsi, dum pulsant, sus-
cipiendo esset satis. Præterea cerebro
nullum extra crassam meningē aliud
operimentum fuit circūdatum: Spia-
nali autem medullæ, quæ ipsius ossi-
bus uehemens motus inesset, tertia
illi fortis atq; nervosa tunica data est,
cui etiam glutinosus humor est cir-
cumfusus, ne assiduo motu exicce-
tur. 13. de us. part.

42 Lingua tangendi & gustandi
uim obtinet, à neruis ex tertia coniu-
gatione ortis, in suam pelliculā disse-
minatis. Crebrius tamen læditur gu-
standi, quam tangēdi facultas, quod
huius sensorium crassissimū, illius te-
nuissimum existat. 4. de loci aff.

43 Spinae partes quò fuerint altio-
res, eò sunt præstantiores, quare quò
affectio fuerit inferior primis duab.
uerterbris, eò inferet multò minorem
noxam. ibid.

44 Vox

44 Vox uocalium instrumentorū
est munus, loquela uerò eorum, quæ
sermoni deputata sunt, inter quæ lin-
gua principatū obtinet, cui non pa-
rum conferunt, nasus, labra & den-
tes, ut inter uocalia instrumenta gut-
tur, & ipsum mouentes muscoli ac
nerui, qui à cerebro ipsis mouendi
uim deferunt. 4. de loci aff.

45 Tunica oculi uuea est intrinse-
cus humida, & mollis instar spongię,
ne contactu suo humorem crystalli-
num affligeret, sed benignè ac molli-
ter excipiat: Ea uerò pertusa est in cē-
tro sui, & quā duntaxat foramen exi-
stet, nulla alia tunica inter crystallinū,
& corneā media est, sed ueluti per te-
nue, & candidum eorū splendor in-
ternum cum externo, commiscetur
& communicat. Simulq; humorem
albuginem syncerum, & tenuem ob-
duxit crystalino. & spiritu aëreo om-
nem pupillę lacum oppleuit natura
non solum ut spacium uacuum ex-
pleret, sed etiam ne crystallinus hu-
mor & portio uueę tunicę inter-

na exiccaretur. 10. de us. part.

46 Tunica arachnoeidis, araneis subtilior anteriores crySTALLINI humo-
ris partes uestit, in eaq; ipsius pupillae
imago, ueluti in speculo conspicitur
fulgens & leuis supra omnia specu-
la. Non tamen ambit totum crySTALLI-
num, sed ea parte, quam uitreus hu-
mor ad eum nutriendum inuehitur,
aperta est & detecta; qua uero foras
eminer, tota extenditur. Ibid.

47 Quod omnium est in oculo ex-
tremum operimentum ac propugna-
culum, tenue, album ac durum est,
quasi eorum: tenue quidem & album
ut splendores propterea transmittat, du-
rant uero ut tuto conseruet. Ibid.

48 Exciso capitis osse, uiuente ad-
huc animali, & crassiori detecta mem-
brana, si utrobique medio rectitudinis
quam cerebro haec plexu duplici incun-
bit, per hannulos eleuatam, aut sola
hanc partem exciderit aut totam, imo
si cerebrum ab ipsa quomodo cunq;
excindas, neque insensibile, neque im-
mobile animal ipsum euadet priusquam
ad ali-

ad aliquem uentriculorum ipsius, ipsa sectio pueniat. 7. de placitis Hippocr. & Plat.

49 Sensilez motus in sanis animalibus corporibus duplices genere existunt, alij enim fiunt uoluntatis imperio, quod à neruis & Musculis editos medici uocāt actiones libere uoluntatis. Alij à corde & arterijs, & uocantur functiones uitales. Est & tertius in uenis, insensilis, de quo hoc loco non uidetur commodum dicere. Gal. de tremore palp. conuuls.

Addit Moyses.

Hic tertius est is, de quo (ut opinor) in 3. de naturalibus facult. loquutus est, his uerbis. Iam illud difficile compertum non est, tractum & expulsionem diuersis temporibus per eundem meatum fieri. Id enim in uesica fellis cernitur & præterea in utero, cuius stomachus sicut intro seminis, ita foras partus uia est. Quum igitur attractionem & expulsionem per unam eandemque fieri uiam cernamus non debemus mirari, si per quas uenas à

B 3

uentre

uentre in iecur facta est digestio, rursus ex iecinore in ipsum trahi aliquod nutrimentum longa inedia potest. Venæ siquidem illæ, quæ mediū spatium inter iecur et partes, quæ circum uentrem occupant duplex ministerium præstāt: nempe ut quum in his fuerit abundantia nutrimenti, per eas sursum feratur in iecur: quum autem uacua sunt, nutririq; indigēt, per easdem ipsas ex hepate rursus trahatur.

50 Ambulatio fit altero crure in terra firmato, altero autem circumlato. Sed firmari quidem, pedis, circumferri uerò totius cruris est actio. 3. de us. part.

51 Pulmo uocis simul & respirationis instrumentum existit, trahit enim cor aërem externum non protinus per fauces, sed medium pulmonem, quem quasi spiritus promptuarium natura statuit. His autem quæ aërem per fauces, nares, & os inspirant, pulmo & dexter cordis uentriculus inest. Reliquis uerò quæ his carent,

rent, neq; pulmo, neq; dexter cordis uentriculus, qui gratia pulmonis est factus. 6. de us. part.

52 Ventriculus est rotundus, ut minime lesioni obnoxius & capacissimus fieret, inter oblongum, ut longius tenderetur. In dextraq; parte animalis consistit, & superius orificium inferiore latius habet. Ambit autem hunc hepar, quibusdam locis ceu digitis amplexum in regione dextra & superiori. Habet etiam ut ex sinistris lienem longe protensum a quo sinistrae partes calefiunt, sic retrosum spinam & Musculos, ut ab illa prohibeatur iniuria, ab his uero molliter calor eius foueatur. In reliqua parte anteriori calefactionis gratia, omentum corpus densum & leue. 4. eiusdem.

53 Omentum ex duabus quidem tunicis densis atq; subtilibus sibi ipsius incumbentibus, quam plurimis uero arterijs & uenis pinquedineq; non pauca conflatum est. Ibid.

54 Est alia membrana peritoneos dicta uiscera omnia, quae sub septo

B 4

trans.

transuerso sunt, tegens: citansq; ex-
cretionem aridorum excrementorū,
& ne uenter aut intestina flatibus distendantur prohibens. Siqui-
dem anterioribus ipsorum partibus
protensus est. Superiori uerò extre-
mitate septo transuerso internè adhe-
rescit, & inferiori ostibus pubis atq;
iliū: itaq; illa quidem hepar & uen-
tricus uestiuntur, hac uerò uesica
& intestina. Ibid.

55 Ad perfectam intestinorum &
uentriculi nutritionem natura primū
mesenterio & omento plures, inte-
xit uenas nutriendis illis dicatas,
nequaquam trañciētes alimētum ad
hepar, sed cremore quem ex eo con-
ficiunt eas partes nutriendas. Dein-
de in longiori inedia per easdem ue-
nas sanguinis benignioris retractio-
nem per quas prius distributio ad he-
par facta est. Ibid.

56 Vbi abundè saturatus est uen-
ter, benignioremq; ciborum substan-
tiam suxit, quod reliquum est ueluti
fecem onerosam reijcit, atq; idem in
inte-

intestinis, & cæteris partibus perpetuò fit. 3. de natur. facult.

57 Omni naturæ circa nutrimentum opera, in tria tempora distributa est. In primo quidem alimentum manet in uentriculo & concoquitur. In secundo transit ad intestina, usq[ue] ipsis & iecinori ad saturitatem opponitur, quo tẽpore iam affligitur uentriculo quod in primo tempore fuerat appositum. In tertio, per omnes corporis partes digeritur & apponitur, quo tempore uentriculi iam nutritur, ijs, quæ affixerat assimilatis. Iecori uerò & intestinis affigatur, quæ ijs fuerat apposita. Ibid.

Sic ordine fiunt tres nutritiones, 1. in uentriculo, secunda in hepate & intestinis, tertia in omnibus particulis, & singulæ tres habent alteriores, appositionem cibi affixionem & assimilationem.

58 Est quidem quarta mutationis species dicta assimilatio, quæ quamquam nutritionis nomine latius patet, tamen unum & eundem, cum ip-

B 5

sa est.

sa effectum habet. 3. de sympt. causis.

59 Omento seu epiploo ad uitam conseruandā aliqui non indigemus, sed quæ uenas & arterias ei tribuit natura, cauendum est, ne quid excidatur, quod si contingat ligetur superius, & quod prominet incidatur. 6. de ul. part.

60 Splenis corpus est rarū admodum atq; laxum spongię instar: sic ut crassos & melancholicos succos facile trahat excipiatq;: quare illi arteriæ multæ & magnæ tributæ sunt, contractione sua illius expellentes excrementa fuliginosa. 4. eiusdem.

61 Renum alter quidem superiorem, alter inferiorem positionem sortitur. Quum uerò uterq; serum sanguinis trahat, neuter alterius tractui moram adfert. Nunc itaq; uterq; liberè agit, solusq; attrahit, quum nil sibi habeat à regione oppositum. 5. eiusdem.

62 Vtraque bilis & urinæ uesica, quum attrahant sibi familiare purū, atq; ab alijs secretum excrementum,
alia

alia à renibus uasa, alimentū sibi sup-
pediantia iure optimo habuerunt.
Vesicæ igitur quæ urinā excipit, ner-
uos à spinali medulla, quā parte latū
os situm est inseruit natura, uenasq;
& arterias à propinquis ipsi uasis in
eam disseminauit: alteri uerò quæ ad
iecur situm habet, arteriam quidem
& neruū ab ijs, quæ in uiscum ipsum
inseruntur, deduxit: paruum utrunq;
admodum & uix conspicuum, at ue-
nam satis amplam ab ijs, quæ sunt ad
portas, cum his duobus ad collum
eius, usq; in fundum productas pro-
duxit. 5. de us. part.

63 Collum matricis à natura factū
est neruosum simul ac durum medio-
criter, ut circa noxa contrahatur & di-
latetur. Vt autem matricis mulieri-
bus due in unum collum desinentes
sunt factæ: ita & ubera duo, utrunq;
sue matrici instar ministri boni sub-
seruiens. Singularia etiam prouiden-
tia ipsius naturæ fiunt, semper recep-
taculorum matricis numerum, æ-
qualem numero mammillarum præ-
scri-

scribi. 14. de uis. partium.

64 In mulieribus uesica matrice est neruosior: quò fit ut eius quoque ulcera duriora & magis feratilia quo ad pulsum fiant, nec illa ab hac alia re differt in muliere. Gal. introd. ad pul.

65 Quatuor organorum genera omnino duabus tunicis constant, æsophagus uenter, intestina & arteriæ omnes, præter eas, quæ in pulmone mutantur in uenosam. Quatuor, item, unica nempe felliculi fellicis, uesica, matrix & uenæ, omnes, præter eas, quæ in pulmone mutantur in arteriosas.

66 Virga ex ossibus pubis idq; ex superioribus eorum partibus enascitur. Sic enim cum ab ano plurimum est dissipta, tum ad coitum locum opportunum nacta est. Ex osse emergit non aliter, quam reliqua omnia ligamenta, tum propter substantiam tuam quod ad ipsius actionem sic erat melius, ut rectum & stabile totum pudendum seruaretur, uidelicet à corpore stabili exortum. Solū autem ex omnibus

nibus est cauum, quò cito impleatur,
tendatur & induetur. Præterea in
partib. eius inferioribus, meatus sen-
sus (qui lotio est cum illo cōmunis)
medius constitutus est. Et incubat
hinc nervus cauus, qui spiritu refer-
tus tenditur, unde penis erigitur. 15.
de us. part.

67 Nervi renibus, hepàti, lienì, &
uesicæ fellis exiles omninò dati sunt,
quòd maiorem sensum non postula-
rent, utpote à proprijs excrementis
nil accepturi incommodi. At uesicæ
maiori, ut sensu essent prædita maio-
re, plures & maiores nervos natura
dedit, sicuti ualidiores, quàm alijs tu-
nicam, quòd passim distendenda es-
set & euacuanda, antequam à lotio
acriori noxâ pateretur. 5. de us. part.

68 Natura ubi per longū iter ner-
uum est ductura, aut motui Musculi
uehementi ministraturum, ibi substā-
tiam corpore crassiori quidem, cæte-
ra autē nervo simili intercipit, cuius
beneficio contingit nervo ipsi cras-
sescere atq; corroborari. 16. de us. pa.

69 Muscu

69 Musculi costarum pectoris & uentris quādiu quiescunt, perpetuò connexi sunt. Cum autem agunt, intrò cedunt, minusq; curui fiunt, contra quā faciei, manuum, pedum, & Musculi. His enim dura & renitentia subsunt ossa, illis uerò mollia & facile cedentia corpora. 2. de mot. Musc.

70 Omnis Musculus unum habet motum natura, alterum uerò per accidens. Siquidem operatur quisq;, trahens ad seipsum motam particulam, non operatur autem cum ab alio Musculo in contrarium simul cū mota particula abducitur. 1. de mot. Musc.

71 Proiecto in uterum semine, alteratrix naturæ facultas, quæ ex mēstruo sanguine hanc aut illam particulam generauit, generatio dicitur, & alteratio: quæ uerò compagem & formam fecit, efformatrix uirtus: quæ ars optima existens tam consultò & artificiosè compingit singula, ut aliter habere se melius non possint.

Item: Quæ in omnē partē eas particu-

ficulas simplices profert. Auctrix.
& quæ ei quod nutrit affigit, id quod
nutrimenti specie affluit, nutritio est.
Cuius causa fit prius appositio, tum
agglutinatio, deinde assimilatio, po-
stremo & expulsio. 1. de natural.

72 Donec fœtus in utero est, au-
ctrix, & nutrix facultates sunt ueluti,
alteratricis & efformatricis ministre,
ubi uerò editum est animal, auctrix
quidem usq; ætatis uigorẽ domina-
tur, à quo tẽpore ad finẽ uitæ nutrix
præest subministrantib. ei reliqs. Ibid.

73 Omnium quæ mouëtur instru-
mentorum corpora pro fibrarum po-
situra motus habent. In singulis qui-
dem in testis circulares, in utraq; tu-
nica sunt fibræ, quod contrahantur,
duntaxat nec quicquam trahant.
At uenter alias rectas habet, quibus
trahat, alias transversas, quibus con-
stringat. 3. de facult. nat.

74 Alteratio generationis & nu-
tritionis genus est Sed in generatio-
ne quod os non erat, postea os factũ
est. In nutritione uerò ei, quod iam fa-
ctum

ctum est, id quod affluit efficitur si-
mile, quare etiam propriè dicitur assi-
milatio. i. eiusdem.

DE HUMORIBVS.

Sectio II.

1.



Vmorum omni-
um in corpore est
quædam confusio
& mixtio in hepa-
te genita, quæ à san-
guinis maiori co-
pia, & ueluti impe-
rio denominatur Sanguis. Reuera
autem non est sanguis, sed superflui-
tas illa, quæ sacificatione, aut uenæ
sectione uacuatur. Cùm autem hu-
mores quatuor numeramus, flegma
sanguinem, flauam bilem & atram.
Non ibi confusionem hanc omnium
simul humorū intelligimus, sed san-
guinem purum & simplicē, qui non
nisi cogitatione & ratione ab alijs se-
paratus concipi potest. 4. in 2. epid.

2 In Sanguine sicut in lacte aquo-
sum

sum quiddam excernitur à qualitate naturali remotum, quod pro humoris abundantis natura magis, uel minus perniciosum est. Si enim ex melancholico sanguine abundanti fuerit, maximè nocet, sin ex flauo & tenui, minus: Si ex pituitoso multò minus: Si deniq; ex sanguine multò omnium minimè. 2. in 6. Epid.

3 Bilis flaua, siue pallida sit, siue flaua, siue uitellina, in uasis, id est, uenis & arterijs gignit. At in uētriculo quēdā alia gignit bilis, q̄ porri colorē refert: alia quæ ab æruginis similitudine æruginea uocatur: alia q̄ isatidis imitatur colorem. Gal. de atra bile.

4 Bilis quę porri similitudinem refert, plerunq; in uentriculo gignitur ex cibis difficilis cōcoctionis, cuiusmodi sint, cæpa, scylla, allia, porrū. Aliquando etiam fortasse in uenis ex calore naturali imbecilli: à quib. postea in uētriculum & intestina effunditur. Gal. in 2. prognostic. Hipp.

5 Est etiam bilis arsenico seu auripigmento similis, quæ interdum uo-

C

mitu

miturubicunda. Interdum etiam per inferiora efficitur. 1. in 6. Epid.

6 Omnis frigidus atque humidus succus, ad pituitæ appellationem refertur. Cuius tamē quatuor sunt differentia. Vna usque adeo frigida, ut quum detinetur alicubi, dolores acerbissimos excitet, quam Praxagoras uitream uocat, quod uitro fuso sit per similis. Altera non est exacte frigida, quam plerique cum screatu expuunt, sensibilemque habet dulcedinem. Tertia sentitur expuentibus acida, estque minus frigida quam uitrea, magis uero quam dulcis. Quarta est salta aut ob putredinem, aut ob serosæ humiditatis missionem, ex qua febri citates non rigant, sed tantum horreat. 2. de diff. febr.

7 Quemadmodum in musto fermenti duo sunt excrementa, flos uini, qui est tenuior pars excrementi, & fex, quæ est magis terrea: Sic in sanguine generando, quod ferme humidum & fluidum est, flaua bilis dicitur naturalis, quod feculentum & terreum, & atra bilis

bilis, uel æter succus naturalis est. Cui
autem præter naturam se habent, bi-
lis quidem perassatur: fitq; crassa ig-
nea & uitellina. Atra uero bilis, acris
euadit in mores aceti, & corpus radit
& terram fermentat si proijciatur. quã
nimium exustione quapiam ac pur-
trescentia ueluti ciuis quidam reddi-
tur. Reliqua bilis genera partim ex
eorum mistura constant, partim tan-
quam uig sunt ad harum tum gene-
rationem, tum inter se mutationem:
2. de natur facult.

8 Bilis genera naturæ aliquem u-
sum utraq; cōferunt, ab ijs enim pur-
gatur sanguis per lienem, & per uesi-
cā fellis. Quod uero relinquitur mo-
deratissimè elaboratur per uniuersas
partes digeritur. Requirit enim san-
guis in non paucis animalis particu-
lis crassitudinem. In nonnullis etiam
flauū, qui tamen igneis ad extremū
fructum non fit. Ibid.

9 Quemadmodum ex bilis gene-
ribus, aliud utile naturale q̃ in anima-
libus adest, aliud inutile & præter na-
G 2 turant;

turam. Sic pituita quod dulce est, salutare animanti. Quod acidum salustumque est, inutile: hoc siquidem putruit, illud crudum manet. Ibid.

10 Interdum pituitosum in uentre humorem, interdum biliosum acervuari contingit. Atque ipsius pituitosi alius acidus, alius salsus, alius dulcis, alius insipidus uel sensibilis, qualitatis expers. Rursus alius, liquidus, alius crassus, alius viscidus, alius dissipatur difficilis. Sic humoris biliosi alius est flavus, alius pallidus & pro maioris minorisque ratione. Atque id prodest etiam noscere ad aegrotantium alui excretionem, uel cohibitionem discernendam. 1. de alimentis.

11 Atra bilis sicca est & frigida: flaua, calida & sicca: ut pituita frigida et humida, ac sanguis denique humidus & calidus. 1. & 2. morb. de sympt.

12 In epilepsia, pituitosum humorem appello, in quo humiditas frigiditasque, ut melancholicum, in quo licetitas & frigiditas dominatur. Ibi quoque utriusque genera explicat. 3. de loc. aff.

13 Ex-

13 Excrementa nigra, cum talia sepius uomantur, qualia sunt & denunciantur, ab atra bile plurimum & qualitate, & facultate dissident. Nam neque acerbum saporem, neque acidum manifeste habent cum atra bilis, tum gustui, tum olfactui talis sit. Adhæc, illa terram non fermentant, ut atra bilis, quæ in hoc aceto est similis, quando acetum est tenuius. Protecta ab illis muscæ non abhorrent, hanc uero nulum animal ne gustare quidem sustinet. Atque ea est unde Cancris, carbunculi, elephantiasis & huiusmodi tumores accidunt. Gal. de atra bile.

14 Et in 3. de alimentis. Affectus melancholici sunt, cancer, elephas, scabies, lepra, febris quartana, & quæ peculiari nomine melancholia nominatur.

15 Crudus & crassus quidam humor, ex alimentis crassi glutinosique succi gignitur in ijs, qui ab exercitijs alienis utuntur: qualis humor, qui in urinis subsidet puri prorsus assimilis, nisi quod pus & graueolens est, &

C 3

len.

lentum, crudus uerò succus, non itē,
2. de aliment.

16 In pueris ferè & uiris in ocio a-
gentibus plurimum humoris crudi
colligitur: unde & multam habēt u-
rinæ subsidentiā. 1. de crisib.

17 Flauibilis, uim possidet desic-
candi ut muria & maris salsum. Quā
obrem in ictericis tunicam arteriarū
indurādo & desiccādo, pulsum quo-
que reddit duriores, & minorem ac
proinde crebriorem, etiam cū nec
febris adest. lib. 4. de caus. puls.

18 Humorum mordacium repe-
riuntur quatuor species magis & mi-
nus dicuntur. Nam qui modicè mor-
dent pruritum inferunt, ut scilla, qui
uerò magis, rodunt, ut lepra, qui etiā
acrius mordent, horrorem excitant.
Cū uerò prorogatur atq; augetur
horror tum mordacissimi existunt, ri-
goremq; faciūt. Gal. dum plen.

19 Si in uentriculo humor uitio-
sus infederit, ac putruerit, malignior
euadit & sanè qui ingeruntur cibos
corrumpit. 6. morb. & sympt.

Excre

20 Excrementa singula, si moram in corpore diutius trahant, putrescunt: quare mordacia & acia, atque his quę ipsa continent infesta redduntur. unde & uesica, quę iecinori subest seu multitudine, seu qualitate succi offensa, expulsionē perpetuò desiderat, etiam si neruorum sit expers. 3. de natur.

21 Venter, si quam nutrimentum postulat, neque eius copia datur, excrementis biliosis, pituitosis, atque sciosis impletur, quę utique trahentis iecur illi remittit. Ibid.

22 Nil in cibariis omnibus ad boni succi generationem tam pertinet, quàm si probe concoquantur, qui igitur cibi in tumorem crescunt, dum in aqua coquuntur, omnes concoctiones facilius admittunt, & ad bonos humores gignendos sunt aptiores. Gal. de Euthym.

23 Quod autem uitiosi humores, morbos gignant cruditas assidua ciborum, siue bonorum, siue malorum in causa est: quāquam deterior est a-

lijs quam uitiosi succi cibaria effecerunt. Ibid.

24 Cibaria uitiosi succi sunt duplicia, tenuia quæ acutos morbos cum malignis febribus inuehunt, succo quæ in unam solùm partem decumbente tunc erysipelata hepates & calidæ affectiones aliæ oriuntur. Et crassa quæ articulorum & rerum uitia, podagras, anhelationes, lienis, iecinoriscque scirrhos affectus gignunt. Ibid.

25 Humores quâtitate pariter, & qualitate dominâtes in corpore sunt quatuor. Pituita bilis, melancholia, & sanguis serosus. Gal. in 1. Aphor.

26 Sola pituita ex humoribus facere atrum succum nequit, etiam si exustione magna afficiatur. Gal. in 2. de uētis. Hipp. quem neque extare adhuc nouimus.

27 Pituita ex imbecillitate caloris gignitur, cum enim uenter non potest coquere cibos ingestos, augeri ipsam uidemus. Gal. in Hippo. de dolorib. mulierum, quem neque habemus adhuc.

28 Nul

28 Nullam bilis portionem in uē-
triculum immisit natura, quæ mala
induceret tāta ut functiones ipsius,
ob acrem mordentem & omnia ra-
dentem facultatem, quam habet, fun-
dius deturbaret. At melancholicum
excrementum in ipsum excreuit, ceu
nullam illi noxam allaturum. Acer-
ba siquidem acidaq; cum sit atra bi-
lis contrahere ipsum constringereq;
non subuertere est nata. Quare non
modo non lædit, sed iuuat intendens
ipsum, contrahensq; ut cibos ad un-
guem amplectatur: quousq; fuerint
percocti. 5. de us. part.

29 Quæ mordent absterguntq; ci-
baria biliosa sint, & cacothyma om-
nia. Ibid.

30 Pituitosum excrementum gi-
gnit quidem uenterculus, quia id ui-
tium adeo exile est, ut præsidio exter-
no abūde corrigi possit: Quanq; ubi
ex prauo corporis habitu copiosius
colligit: ileos lienterias linesmosq;
oīum q; uētriculo cōtingunt morbo-
rū grauissimos inducere solet. Ibid.

SECTIO III.



Lorescens ætas omnium animalium, maxime in medio extremorum est 12. de temp. & in Hippo. de humana natura, adolescentia omnium ætatum temperatissima.

2 Adolescentia autem dicitur, quæ à decimoquinto anno ad uigesimum quintum agitur. In 5. Aphorif.

3 Vniuersa ætas quæ uigori succedit, frigida est & sicca. Manifesti autem fines inter eorum ætatem, qui iam declinant & eorum, qui senescunt, humidorum est excrementorum exuperantia. Vnde quidam decepti statuerunt serium esse humidum. Gal. de tabe.

4 Totum corpus uirile ad perspiratum est optime comparatum purum excre-

excrementisq; uacuum neque compressum: foeminis autem contrario modo dispositum. Quare ut illorum ad magnitudinem sic horum ad paruitatem pulsus uidetur aptus. 3. de caus pulsum.

5 Rariora corpora, minorib. sunt obiecta periculis, itaq; facile morbos resoluunt, & intemperiem sedant, & excrementa noxia deiciunt. 2. de precog. expulsi.

6 Corporibus raris morbi ferè extrinsecus accersuntur, ex humoribus in corpore corruptis rarissimè. Densius uerò & ualidis contra. Galen. de formis.

7 Sepe quidem dolor sanguinem ad se trahit, & partiū debilitas phlegmonem absq; corporis plenitudine contrahit, quum uidelicet partes fortiores p uenas, ceu per canales quosdam excrementa semper ad imbecilliores propellant, donec ad partem imbecillissimam omnium defluerint, & q̄ ex se amplius ppellere q̄ redundat in ipsa nequeat. Gal. de uenę sect.

8 Si in

8 Si in aliquo carneum ac adiposum particularum genus, aut etiam humores uiribus interim eosdem fines seruātibus, adaugeantur, necesse fuerit motiones imbecilliores fieri, motu nimirum aucto, mouēte uero æquali permanente. Gal. de plenitudine.

9 Spasmodum seu cōuulsionem patiuntur citiūs pueri, quā reliqui: habent enim adhuc debiles neruos, qui minori impetu conuelluntur. Sed ipsis quoq, quā alijs minus noxius adest. Gal. in 1. Epid.

10 Qui habitu sunt ualente, diuq, a morbis immunes fuerunt, periclitantur si eis prahendantur. At imbecilli qui ob raritatem corporis ad omnes obiecti causas, facillimè restituntur, quum nimirum a qualibet uel minima re offensi, magnam causam non expectant. 3. de præcog. expuls.

11 Eorum quæ in senili ætate constituti sunt nulli robur adest. Qui uero eadem ratione pueros imbecillos peritarunt, a uero errarunt. Gal. de uenæ sect.

12 Erit

i 2 Erit maximè diuturnum quicquid erit minimè siccatum. Proinde qui maximè sunt humidi, n̄ maximè longevi sunt, & sanitate, ubi corpus ad robur peruenit, plus ueteris fruuntur. Maximè si excretioni recrementorū & exercitationi operā manet. 6. de sanit. tu.

i 3 Pessima omnium meritò sicca temperatura est: quippe quod tēporis spacio sensibus accidit, id ijs statim à principio contingit. Prodest itaque exercitatio modica, nutrimentū humectans & calidum, calidi uini portio, somnus liberalior & excrementorum quotidie excretio. At uenus huiusmodi siccis temperamētis semper inimicissima est. Ibid.

i 4 Qui plethoricus est uel uitiosis succis premitur, uel acris est sensus, uel eorum quibusdam omnibus afficitur, si cutis tantum acupuncta sit, phlegmone tentabitur, quare non est quidē medicamen quod glutiet, imponemus cuiusmodi sunt anhæmata illa, quę recentibus uulneribus applicantur.

plicantur, sed molle & blandum quod
dolorem mitiget, & ne fiet in particu-
la phlegmone prohibeat. 6. Method.

15 Qui uehementer cordis sicca
intemperie affecti sunt, celeriter are-
scunt: atque is marasmus breui morte
affert. Proximè huic, qui ab iecinore
est affectus, mox qui à uētriculo. Qui
uerò ab alijs particulis ortum habet,
tantò sanè tardius, quantò quælibet
harum minoris est præstantiæ, quàm il-
la. Si uerò leuiter cordis corpus sic-
catum sit, senescunt quidem celeritè-
ter: cæterum plures annos trahunt,
quàm qui uehemēter sunt lēsi. 7. Me-
thodi.

16 Scire licet, solidorum corporū
siccitatibus si perdurēt, succedere ne-
cessariò frigiditatem celerrimè, nam-
quæ ex nutrimenti defectu refrigerā-
tur partes: propterea quòd ex calido
sanguinis succo nutriuntur. Ibid.

17 Superflua pauca sunt hyeme
utpote frigore repulsa intrò: æstate
uerò multa à calore liquata. Atque hye-
me quidem idcirco editur plurimū,
sicut

sicut æstate bibitur. Gal. in 1. de uentis Hipp. quem nondum uidimus.

18 Sprenatis & sanguinis temperatura alia hyeme est atq; estate. Sperma enim æstate calidius est & siccus: hyeme uerò frigidius & humidus. Propterea & diuerse sunt his & illis temporibus genitorum animalium natura. Gal. in 3. de uentis, Hipp.

19 Amputatas uenas ac rursus generatas in magnis ulcerib. uidimus, id quod fita raro tamen, conspirante in unum robustissima facultate cum materia spermatica copiosa. Arterias uerò aut neruum nemo unquam uidit regeneratum, ob materiae defectum, quam huiusmodi uasorum generatio copiosam, & ualide facultati inuictam requirit. Gal. de semine.

20 Aestatis principium faciunt gemini ascendentes, hyemis uerò descendentes: quemadmodum etiam ueris pisces cum sole orientes: autumnii uerò occidentes. Gal. in 1. de uentis.

21 Solidæ partes, quæ uerè solide sunt ac primæ nullo modo affici humido.

midiores possent. Intercepta autem in ipsis spacia hac uel illa humiditate complere possibile est. Hoc uero est proprium partium similarium alimentum, quod ex appositione fit, & non per uasa attrahit. Gal. in arte Medic.

22 Spondylę omnes ab ea connectione, quam parte anteriore habent, retrò pgressi, paulatim à se diducuntur locum omnem medium refertū habentes humiditate crassa & uiscosa, quæ motionem conducit. 13. de us. part.

23 Tendo primum instrumentum est motus, Musculus autem ad constituendum ipsum fiunt comparatus, carnisq; coagmentę, & ex fibris nervorum, & ligamentorum inter se mixtis compositę animali contra iniurias extrinsecas præbet utilitates. Siquidem cadenti uel discumbenti, uel percusso ipsi sunt molle stratū & propugnaculum. 12. de us. part.

24 Nasus primum ordine, respirandi instrumentū est, os uero, si nullius affectus infestet animal: hoc est, nisi quid

quid asthmate multò ac uehementi urgeatur. Nullo pacto respirandi est instrumentum. . 1. de us. part.

25 Quinetiam & alia quædã sunt (præter membranam, quæ ambas matrices copulat) ipsis matricibus, cum ijs corporib. quæ dorso mulieris adiacent, uincula laxa: qualia ne in alia quidem particula reperiuntur. Nulla enim cæterarum esse quæ dilatari plurimum & rursus ad minimum contrahi possit, præter hanc matricem. Vnde & omne fibrarum genus eius tunicæ est inditum & per ligamenta illa soluta, & laxa circumiacentibus corporibus alligata, ut tensioni ipsius & concidentia facile cederem ac obsequerentur. Eam uerò minimè auelli aut deturbari permitterent. . 14. de us. part.

26 Eorum quæ uulneratum neruum contingunt, nil esse frigidum debet, quando quidem ea pars maxime sensibilis est, & principum partium primati continua, & temperamento suo frigida. Quorum omnium occasio-

D ne

ne facile à frigido offenditur, & suam
offensam impertit cerebro. 6. Me-
thodi.

27 Ciuitates ab orientalibus uen-
tis, aut frigidis, aut calidis perflatae
sunt minimè omnium salubres. Gal.
1. de uentis.

28 Omnis intemperies uirtuti nat-
urae inimica est: eamque si sit uehe-
mens, destruit ac omnē eius uim de-
cit. 3. de caus. morb. & sympt.

29 Inæqualis intemperies aliàs in
toto animalis corpore fit, ueluti in ea
hydropis specie, quam anasarca uo-
cant ac ferè in omnibus febribus ex-
ceptis quas appellamus hecéticas: in-
terdum in singulis partibus. Idcirco tū
ob fluxionem, ut cū fiūt tumores,
tum ob qualitatū alteriorem. Gal.
de ineq. intemp.

30 Vigiliæ duobus modis fiunt,
aut enim in negotijs occupati spon-
te uigilamus, & hi non nocent, aut
coacti à causa quadā externa, hæ ue-
rò attractricem uim & concoctricē,
adeoque omnes naturæ actiones ual-
de im-

le impediunt. 4. in 6. Epid.

31 Morbosam cordis intemperie,
siue ex se sit illa, siue ex alia particula
inducta, sequitur spiritalis uirtutis
diminutio. Sicut & cerebri intempe-
riem, animalis & obstructione men-
tis suffocatio. 4. de præcog. expul.

32 In curandis morbis, unus ac pri-
mus scopus est uirtutis custodia.

Quoniam autem uirium substantia
tum ex spiritu, tum ex carnosa specie,
tum ex solidis ipsis completur, ex ijs
quæ similia sunt, moliri cuiusque custo-
diam oportet, Spiritui, ex respiratio-
ne, transpiratione & uapore, qui ex
sanguine attollitur: Solidorum uero
generi ex solido nutrimento: Carno-
so per eam naturam, quæ in medio
humidorum ac de solidorum corpo-
rum est. 11. Methodi.

33 Cor quidem, (cui est ualentis-
sima attrahendi facultas) cum sit o-
rigo pulsuum & arteriarum, quem-
admodum hepar uenarum & sangui-
nis, nunquam moderatis alimentis
destituuntur, nisi enim ualida sangui-

D 2

nis

nis penuria uniuersum occupauerit corpus. Quare ubi corpus ex longo morbo extenuatum fuerit, putandū non est cor quoq; atq; etiā iecur, esse pro aliarum partiū proportionē extenuata. Gal. de Marasmo.

34 Alimentum à uētriculo elaboratum, ubi ad hepar traxerunt uenæ, ibi rursus feruet & concoquitur alteraturq; in sanguinis generationē. In ebullitione autem hac ex ipsis excrementis, quod feculētum quidem & crassum est subsidet, quod uerò tenue existit & leue innatat, & ueluti spuma quēdam in superficie sanguinis fluitat. Excipit autem quod flauum & tenue est uesica fellis ad hepar posita, quod crassum & limosum Lien quem in sinistris uentris partibus subdidit natura. Quod reliquū est rubrum quidem illud & purum à uena cava in gibbis hepatis orta excipit, eaq; ueluti aqua ductu sanguinis pleno, ad utramq; animalis partes fertur superiorem & inferiorem. (Nam illa per totum corpus in uarios scissa

os scissa ramos disseminatur) liquido tenuiq; & aquoso humore, qui adhuc in hac reliquus est, ueluti uehiculo ductum: donec ad dextrum cordis uentriculum peruenit, ubi hunc Renes excipiunt, & ab his uesica maior per quam eijcitur. 4. de us. par.

35 Intestina conuoluta sunt plurimis cōuersionibus orbiculatis ne alimentum ocyus elabatur. Nam que animalia simplex & rectum à uentriculo usq; ad anum intestrium sortita sunt, insatiabilia omnia & gulosa existunt. Ibid.

36 Intestina innumerabilem uenarum multitudinem ex hepate sibiipsis habent insertam, quibus omnem in uētriculo coctum succum sursum mittunt. Sicq; humor nutriendo idoneus nullus ab animali labitur, quādo naturaliter se habent corpora. At uerò orificia uenarum quæ in intestina se aperiunt modicum, quod & nutrimentū assumūt, plurimum uerò uenarū. Nam sanguis naturaliter cōtinetur etiam in arterijs. Ibidem.

D 3

37 Re

37 Renum uterq; plurimum sibi
bilis conciliat, multum etiam tenuio
ris & humidioris sanguinis. At ijs ad
sui nutrimentum tertio quopiam alio
uase opus non fuit, præter duo ma
gna, quorum alterum oritur ab arte
ria, quæ spinæ incubat, alterum à ue
na caua. 5. de us. part.

38 Nulla in parte corporis melius
conficitur sanguis, quàm in mammil
lis, siquidẽ ex uena caua sursum per
cor ad eas delatus, rursusq; deorsum
tendens, exagitatusq; à motu thora
cis sic incælescit, & in uasis perpetuo
motu perditis moratus, perfectã nan
ciscitur concoctionem. 7. eiusdem.

39 Partes dextre testiculorum in
masculis & matrices in foeminis sunt
calidiores sinistris, quia sanguinem
purum recipiunt, sinistrae uero humi
diores, quia impurum sanguinẽ, ex
crementosum, humidum & serosum
excipit. Quod quidem si uerum est,
ac præterea masculus calidior est foe
mina, probabile utique fuerit, partes
quidem dextras masculorum; sini
stras

stras autem foeminarum esse genera-
trices, ut Hipp. dixit. Si dexter testi-
culus attollatur, id est, si ualēti-
or fuerit masculum gignet: sin uerò sinister
foeminam. 14. de ul. part.

40 Ipsorum foetuū causa est prin-
cipium uenarum, matrices ipsas nu-
trientium, ac mammas cum eis colli-
gantium. Sola enim hæc instrumen-
ta per uasa coniungi expediebat, ut
quando in matricibus augetetur fo-
tus atq; conformaretur illi soli uenæ
communes ex utrisq; partib. alimen-
tum affunderent: quando uerò in lu-
cem editus esset: mammis rursum to-
tum alimentum su. reperet Ibid.

41 In facultate uentriculi qua pe-
nuriā sentit, primum symptoma o-
mnium est inanitio. Secundum ina-
nitarum partium naturalis appeten-
tia. Tertium, uenarum, quæ per uen-
triculum porriguntur, suctio. Quar-
tū suctionis sensus, qui est fames. Po-
stremò ipsa animalis appetētia. 4. de
morbo. & sympt.

42 Quinq; sunt circa respirationē

D 4

& uo-

& uocis efformationē actiones, consequentia quadam inter se conuenientes, exspiratio, efflatio citra strepitum. Efflatio cum strepitu uox & loquela: quarum si prima lædatur, reliquas omnes lædi necesse est. Ultima uerò læsa reliquæ, haudquaquam leduntur. Semper enim ex præcedentibus offensio, posterioribus adest, nō contra. Ibid.

43 Expirationē efficiunt uniuersi thoracem contrahentes Musculi: Efflationem (quæ uehemens exspiratio est) Intercostrales maximè strepētem efflationem, ij qui faucibus: insunt, uocem uerò ipsam, gutturis Musculi absoluunt. Loquela postremò lingua articulatim uocem distinguens: item dentes, labra, narium foramina, palatum, gurgulio & linguæ ipsius uinculum, quorum aliquo uitiato uitiari sermonem contingit. Ibid.

44 Hypostasis urinæ alba est inter saniam & naturalem humorem media: fit autem ex cibo, non cocto à natura, neq; in sanguinem cōuerso ob
affe-

affectionem contra naturam. Gal. in
Prog. Hipp.

Sic Moyses, Idem quicquid mihi
(inquit) uidetur & sic conijcio, ex ci-
bis naturali calore hepatis & sangui-
nē uerti non potest, id esse quod cras-
sioris humoris cernitur in urinis eti-
am sanorum. Quod uerò in urinis æ-
grotantium & aliquando sanorum,
in imo confidit, id esse quod in mem-
bris ipsis à natura non potuit ex san-
guine in alimentum conuerti.

45 Sanguis non solū nutrimen-
tum animantis partibus est tributus,
sed caloris etiam naturalis conserva-
tio. Itaq; ipsi⁹ corporis calor, interdū
quidem seipso minor efficitur, aut
propter sanguinis copiam à qua ni-
mirum extinguitur, aut propter in-
gentem inopiam, aut propter frigidā
qualitatē: Interdum uerò maior pro-
pter calidam sanguis qualitatem, aut
propter exiguam inopiam. Quicquid
autem cor in caliditate, frigiditateq;
propetitur, eius quoq; & aliæ corpo-
ris partes sunt participes. At quæ par-

D 5 ti alie

ti alicui accidunt caliditates, aut frigiditates, eas quæ parti quidem affecte uicinæ sunt unâ alterant, in totû tamen extendi corpus priusquam cor immutent non possunt. Galen. de sang. miss.

46 Totum cerebri corpus, cum arterijs plexus retiformis multipliciter diuisis contextum sit, & uenis ex eius uertice descendantibus: his quidem in ipsius uentriculos superflua excernentibus. Illis uerò respirantibus, relicto uenarum sanguine fruitur oro nutrimento, & arteriarum spiritu uegetatur. 9. de us. part.

47 Cutis quidem certè, ubi secundum naturam se habet, laxa est in ijs, qui crassi non admodum existunt: Et cocus medius, cui incumbit ipsa, uacuis. nec secus ea, quæ in carne sunt spacia conspiciuntur inania. Omnia autem hæc per inflammationes replentur sanguine ex uasis quidem per eorû tunicas resudante, in omnibus quæ carnis partibus ad modum roris permisto: quem si uicerit natura, extra

tra carnem pellitur à facultate expultrice : si uerò incumbens cutis dura tensa^q extiterit, ibi pus detinetur & abscessus gignitur. Gal. de tum præter natur.

48 Caloris duo sunt genera in animali, unus quidem naturalis, qualis in sanguine cernitur: alter uerò acquisitus seu foris petitus, cuiusmodi in febribus esse solet. 4. comm. in 6. Epid.

49 Nulla uena est in his humoribus oculi crySTALLINO uitreo albugineo, quemadmodum nec in cornea tunica. Ex quo perspicuum est nutrir eos, quidem per accessionem ex uno in alium, ueluti crySTALLINUM ex uitreo, uitreum ex ambiente corpore retiformi quod plenum quibusdam arterijs & uenis, cernitur. Cornea uerò tunica ex eo quod ab uuea defluit 10. de us. part.

50 Venæ & arteriæ medullam spinalem ingrediuntur iisdem uijs, quibus egrediuntur nerui, q̄ fit eodē modo in cæteris partibus 4. de us. part.

51 Ner-

§ 1 Neruorū ratio huiusmodi est. Quibus mēbris minimo sensu opus fuit, molles, quibus uoluntario duri quibus utroq; utriusq; etiam generis nerui dati sunt, at quibus nullo omnino, nulli. 16. de us. part.

§ 2 Cutis per se nullis neruis est prædita, sed particuli quibusdam neruorum subiacentibus Musculis colligatur, à quib. sensum accipit. Ibid.

§ 3 Sensus ad cutim etiā pertinet quamlibet proprii nerui expertem, non minus quam ad membranas tunicas, arterias, uenas, matrices intestina, uētriculum, uesicam, & uiscera reliqua omnia. Ibid.

§ 4 Nemini debet esse mirū quod sensu cutis amisso, subsistentis Musculi motus maneat. Nerus enim p musculū sparsum adhuc integer est, particule uero quibus ei alligatur cutis læsæ sunt. Quod si cutis ipsa excorietur, Musculus tamen non minus mouebitur, quamuis non sentiat: at sentire quin moueatur nunquam poterit, motus enim agentis, sensus uero pa-

rō patientis est. 4. morb. & sympt.

55 Palpitio quæ est dilatatio præter naturam, omni parti, quæ dilatationem suapte natura admittit maximè accidere potest, aliarum uerò nulli: At dilatari nata sunt omnia, quæ naturaliter mollia existunt. Quamobrem cuti palpitatio, subiectisq; illi musculis & uisceribus uentriculo, uelicæ, matr. intest. hepatis, spleni & maximè cordi accidit. Ossibus autē & cartilag. quæ non dilatantur, quid duriora sunt non item. 5. morb. & sympt.

56 Glandulæ fluxionibus excipiendis maximè omnium partiū sunt idoneæ, tum ob substantiæ laxitatē, tū quia inter cæteras partes minimè robustas facultates (excepta alteratrice) sortiuntur, sicuti & pinguitudo. Post has pulmo, deinde Lien, tertio cerebrum. Quibus igitur hæc natura sunt robustiora. In his ad glandulas carnesq; deueniunt fluxiones ubi totus habitus est infirmus, ut in rheumaticis accidit. Galen. de uenesect.

57 For-

57 Fortiores partes ad proximas imbecilliores vires suas extendunt. Ex quo fit ut illa membra duplici uirtute, una quidem per se, altera per aliud, nempe per uicinum membrum participem. Gal. in Hipp. de uict. rat. in morb. acut.

58 Fit etiam nonnunquam ut ociosa corpora febrim ex huiusmodi fluxione forte contrahant, nonnunquam uerò ut exiccentur, uidelicet membris debilioribus malo cibo nutritis. Gal. de somno & uigilia.

59 Pus quidem in inflammationibus abscessibus atq; tuberibus, eandem habet rationem quam & humorum putredo in uasis: Siquidem utraque probè tum perficiuntur, cum alterandi ac concoquendi uis superat in illis. Pus enim optimum sic efficitur, album & crassum, ac undiq; sibi simile aspectui, tactui læue & præterea minimè foetidum. Urina quoque optima albam, læuem, æqualem & minimè foetidam habēs hypostasim. quod contrà omnino utrobique fit quan-

quādo imbecillis illa uis est. 1. de dominis febr.

60 Spacium uacuū in medio corporum quibus abscessus fieri solet, substantiam aliquam spirituosam, aut humidam, aut mistam comprahendit, quæ ubi diutius hæsit, uarias alterationes suscipit. Nā & lapidibus, & arenis, & testis, & lignis, & carbonibus, & limo, & permulis alijs id genus similia corpora in abscessibus sæpe contineri inueniuntur. 2. ad Glanc.

61 Virga masculi, & matricū stomachus, & alia quæ sunt circa pudendum ipsum membra, quia sensu exactiore indigebāt propter uereream copulationem, optima ratione multis neruis & musculis sunt a natura donata, quorum qui circa pudendū ipsum sunt positi insigniores & maiores, qui uerò alijs genitalium partibus insiti fuerunt, subtiliores, & ferè quales in hepate & renibus uidentur. 14. de us. part.

62 Quoniā pendent testiculi masculo,

sculo, propterea & musculus utriq;
ex regionibus iliorum peruenit, ut n;
quoq; participant motu, qui fit im-
petu coitus. Ibid.

63 Humorem in partes organi ua-
cuas effusum, si uirtus integra est, in
sanguinem uertit: sin deficit aut im-
becilla est, in putredinem abit, non a-
liter quàm in corpore mortuo. Om-
nino enim ut ipsa se habet uirtus, ita
est corporis affectio. Gal. in Progn.
Hippoc.

64 Vbi calida fluxio procubuit in
musculū ac maiores arteriæ uenæq;
oppletæ distenduntur: deinde mino-
res, postremoq; etiam minimæ, & in-
de ubi per ipsarum ora una pars, per
tunicas alia transcolata est ad exteriora,
spacia uacua, quę inter prima cor-
pora sunt, & sic nerui ligamenta, mē-
branæ caro ipsa, arteriæ & uenæ in-
calescunt. Maximè uerò uenæ, quæ
interius distenduntur, exterius uerò
præmuntur, morbus fit phlegmo-
ne dictum, quæ musculi intemperies
est inæqualis. Distatq; eò ab æquali,
quòd

quod in omnibus intemperanter affecti corporis partibus, non insit æqualiter. Gal. de inæq intemp.

65 Causarum morbos efficiētium nulla citius corpus contaminare potest, quàm uitiati aëris inspiratio (que causa pestilentis febris est) in corpore humores ad putrescēdum paratos habente. Nulla uerò causarum sine patientis aptitudine agere potest: alioquin ex æquo omnes afficerentur ab eadem causa. i. de febr.

66 Corpora diu sana, firma & bene affecta permanentia, nullis ex inuolidioribus causis mutātur. Quare nec inuenibus ualdē nocet ingurgitatio & ingluuies: At senibus uiris, & languidis uel modicis quantitatis atq; qualitatis in cibo excessis maximum adfert detrimentum. Galen. de sanit.

67 Affectio quæ appellatur senium ipsi marcori plantarum proueniēti ob siccitatis excessum quadam proportionē respondet, unaq; est omni genito corpori corruptelæ inte-

E

ritusq;

ritusq; connata necessitas. Altera autem quæ præcipue in ipsis animalibus cernitur, totius substantiæ, fluor quem insitus calor excitat. Hæc incōmoda nullum quod genitum sit corpus effugere potest. Reliqua uerò quæ hæc sequuntur, & quæ ad unius rationem pertinent prouidentia consilioq; certè potest. 1. de sanit. tuēda.

68 Redundantiæ morbi oriri solent ubi quod exhalat à corpore minus est ijs quæ accipit. Quare prospiciendum est, ut eorum quæ eduntur & bibuntur respectu eorum quæ expelluntur, seruetur conueniens mediocritas. 6. de sanit.

69 In morbis redundantia ut seruetur modus detrahimus de nutrimenti, uel quantitate, uel qualitate: de quātitate quemadmodum dematur notum est: de qualitate demitur cum unius maxime alentis cibi loco, alius exigui nutrimenti apponitur. Ibidem.

70 Inueteratorum morborū, quales sunt asthma, calculus, hæmorrhoides

des narium, ulcera maligna, & huiusmodi alia sanantur partim in pueris quidem & infantibus ad quadragessimum diem, aliquando ad septimum mensem, nonnunquam etiam ad septimum annum. Partim uerò sanantur pubescētibz genitalibus in masculis, in puellis certē mēstruis incipientibus. part. 6. de sig. mortis.

71 Temporales musculi si læsi fuerint cōuulsiones, febres, sopores, deliria, symptomataq; lætalia maximē omnium inducunt, utpote cerebro existentes proximi, & per plures neuos, quā alij musculi ipsi cerebro hērētes: quā ob causam capitis etiam ossibus abdidit natura. 1. 1. de us. par.

72 Quoniam corpora nostra perpetuò mutantur, nec in eodem statu manent: propterea data est ei à natura ad instaurationem eorum quæ ex quantitate sui effluunt, nutriendi & alterandi facultas, ad ea uerò quæ ex qualitate abeunt, spiritus duo, quorū unus pectoris motu, alter pulsu efficitur. 5. in 6. Epid.

E 2

73 Dis

73 Difficilis connexio est quoties uel in calidum uentris frigida, & pituitosa sanies defluit, uel in frigidum calida. Atq; harum duarum alteram semper expertus sum magis ad curandum rebellem, nempe in qua frigidi pituitosiq; succi in calidum decidunt uentrem: pessimam uero, ubi praeter id, alius natura etiam solubilis non sit, nec uomere ex facili homo possit. 6. desanit.

74 Conuulsiones quae ex plenitudine neruorum partium uel ex humore mordente, uel denique ex ingenti frigore oriuntur curari possunt. Quae uero ex neruorum particularum ariditate proueniunt nullus certe ulla ad sanitatem est locus. 1 2. Methodi.

75 Qui ob siccitatem uehementem distenduntur & discrutiantur, si curari non debeant, humectationem desiderant. Sed si is affectus sit febris occasione contractus, percurata est difficilis, uel potius curationem non recipit. Ibid.

76 Quibuscumque cephalea intra calua

caluariam est, hīs usque ad oculorum radices dolor extenditur, propterea quod oculorū tunicæ ex cerebri inuolucris suam ducūt originem. 2. de comp secundum loca.

77 Cæphalea ex calore uel frigore semper grauis est, ex siccitate, leuior: ex humorum copia propè nulla nisi si meatus obstruantur. Nam pro quantitate obstruentium & replentium humorum nasci semper cæphalia potest: alioqui si absit obstructio, grauedo tantum. Ibid.

78 In parotidibus, quæ fiunt glandulis secundum aures affectis, nō utimur curatione reprimente, repulso-ria uel, sicuti in partibus inflammatis. Sed pharmacis attractorijs, humores ex alto elicientibus, aut his nil efficientibus, cucurbitulas affigimus, aut fomenta assidua adhibemus, infestū humorem ad cutim trahentes præsertim si affectio in capite hæreat. 3. eiusdem.

79 In parotidibus si uehemēti impetu redundantes influat humores,

E 3 nil

nil nos curiosius agentes omnia per-
mitteremus naturæ: quæ si eos nō dis-
cussit supputatibus, pharmacis ute-
mur, ut frumenti farina cum oleo &
caricarum decoctio: aut eo quod ex
polline & fermento conflatur: At si
discussit & suppuratae sint paroti-
des tunc aut per sectionem pus elice-
re oportet, aut per pharmacū absces-
sum rumpere: quale est similitum uo-
catum, & quod ex alijs constat: aut p
attractoria & temantia discutiemus,
bis in die ñsdem ablatis, & fomentis,
admotis, donec dolores remiserint.
tumq; semel tantum solutis, postea i-
pſis pharmacis permittere, siquid re-
liquum in profundo hæreat. Ibid.

80 Pompholyge lota (quæ est o-
mnium pharmacorū leuissima, utimur
ad tenues & acres oculorum fluxio-
nes, sed uacuato prius capite & uni-
uerso corpore. Capite quidē, i. garga-
rismo apophlegmatismo, corpore ue-
rò, uenæ sectione & purgatione. Vti-
mur etiam reuulsionibus primū qui-
dem ad infernam corporis partem:
dein

dein etiā ad occiput, & ad capitis cutem. Item sectionibus arteriarum, earum interdum quæ retro caput iuxta aures exporrectæ sunt, interdum uerò temporalium, postremò & collyrijs ipsi oculo proprijs. 4. de comp. secundum loca.

81 Thorax & iecur itemq; septū transuersum & cor nunquam cedemate pituitoso, neq; crasso sanguine affliguntur, propter densitatem corporum. Quapropter si quæ in ea fluxiones decumbant, omnino uel flauæ bilis, uel calidi sanguinis, & tenuis sint oportet. 4. de puls. præcog.

82 Vbi pectus aut uētriculus, aut partes circa collum caput ne laborāt phlegmone, excogitatum est artus uinciari. Quippe pars affecta minimè uincienda est, sed si in manib. orta sit phlegmone, crura: sint in cruribus manus. 13. Methodi.

83 Vbi iecur phlegmone erit obsessum, mediocriter astringi per cataplasinata mistæ materiæ oportebit, quòd altricis facultatis principium

E 4

ani-

animalibus sit, & uenosum ab hoc exoriatur genus. Ibid.

84 Opportunissima ad scirrhum sunt iecur lienq̃, si quid parum habita de his ratione, glutinosis cibis utatur: itemq̃ Renes, quod ex eo perspicitur, quia nephritidas alias omnino solui non posse, alias a gr̃e uidemus. Crassa enim sunt substantia, & calculi uitio uexantur siquid crassi succi cibis nimium uescatur. Ibid.

85 Crassa quidem intestina sanatu sunt facilia, cōtrā difficilia quæ tenuia existunt. Ieiunum autem est omnino incurabile, tum propter magnitudinem, multitudinemq̃ uasorum, tum quod tunica eius neruosa, prætenuisq̃ sit, adde quod bilem synceram hoc intestinum recipit uniuersam, omnium maximè est uicinum iecinori. 6. methodi.

86 Marasmo afficiuntur corpora propter inflammationes, quando cōdensatis humoribus paulatim emaruit caro, & totū corpus arefcit. Gal. de introd. ad puls.

87 In

87 In phlegmonis & calidis abscessibus colligitur sanies, omnis intra uigesimalium dñe, nec ultra producit, in œdematibus uerò & frigidis intra sexagesimum. 1. Prognost.

88 Animal omnino mori non potest nisi prius ipsum cor afficiatur, ad cuius intemperatias immodicas mors necessario sequitur. Siquidem cum singulæ partes peculiari temperie cordis suas actiones perficiant, hac profectò pereunte reliquarum actiones perire necesse est, ac proinde cerebri etiam & iecoris non contra. 5. de loci aff.

89 Corde affecto necesse est arterias pati, & de natura moueri, utpote earum principio affecto. Afficitur autem per cōsensum uicinarum partium maximè pulmonis. Deinde hepatis tum diaphragmatis & cæterarum deinceps. 4. de præcog. expuls.

90 Neruo subito morbum euasit sine crisi: multi uerò sine hac intereunt subito, plurimi in accessionum principijs, non pauci in accessionum par-

E 5 ticu-

ticularium declinationibus. In totius autē morbi declinatione, nullus unquam extinguitur propria morbi ratione, sed ob errorem commissum.
3. de cris.

91 Tres omnes mortis modi sunt. Primum in accessionum principiis in magnis inflammationibus præcipuorum membrorum uel humorū multitudine & crassitudine. Secundus in tempore status morbi uel natura superata: Tertius in declinationibus qui rarissimè accidit. Ibid.

92 Ut possis, qualem sit habitura exitum præsens crisis agnoscere, præuidereque futuram, primum ac maxime omnium expendendæ sunt coctiones, ex urinis alui excrementis, atque ex sputis ipsis. Quippe neminem uidi intereuntem, qui ex præcedentibus coctionibus crislam ipsam habuisset.
3. de cris.

93 Reuulsio quā longissimè à particula fluxione tērata, est semper molienda. Quia ratione, si hepar aut uentriculum, aut intestina plegmone occupat

cupare iam cœperit, medicamine q̃ aluum deñciat uti non conueniet, ne que urinæ prouocatione si uesicam aut renes: neq̃ menstruorum si uterum, at si pudibunda, uomitu uti, in diuersa reuellens auxilium est. Eadem ratione in omnibus quæ circa caput accidunt, alui subductio in cōtrarium auertit. Si qua uerò circa fauces, & palatum & linguam, aut denique in ore phlegmone laborare cœperint in his omnibus canenda sunt, quæ pituitam per os euocant, Græci apophlegmatismos appellât. 13. Methodi.

94 Cucurbita in occipite defixa, efficax est remedium ad oculorū fluxiones. Vacuari tamē totum corpus prius, expedit. Nam si refertum sanguine corpus sit, in quacunq̃ parte capitis cucurbitam defixeris, totum ipsum implebis. Ibid.

95 Verum cucurbita utendum in ipsa parte, quæ phlegmone afficitur, inter initia non est, sed postquam uniuersum corpus uacuaueris, & aliquid

quid uacuari posse uidebitur. Quod si sit necesse etiam initio uti, minimè ipsius membris quæ laborare incipiunt, sed his quæ continua his sunt imponi debet, auellendi in contrariū causa. Ibid.

96 Medicaminum repellentiū genus, quibus utimur in principijs inflammationum, in materia refrigerantium consistit: quorum sanè ea quæ astringendi natura prædita sunt, efficaciorē uim habent ad ocys repellendum influxum, inest quippe ipsis statim etiam facultas cogendi & densandi superficiem corporis cui admoventur. 5. de comp. Med. secundum loca.

97 Quemadmodum in phlegmones curatione post totius corporis uacuationem repellentibus auxilijs utimur, sic in crysipelate, pro sanguinis missione medicamento quod bilem trahat purgandum, ipsam uerò partem afflictā refrigerādum. Cuius sanè refrigerationis terminus esto, coloris mutatio. Quod enim purum est ery-

est erysipelas, statim cū illa quiescit.
14. Methodi.

98 Regula Medicinæ obseruanda est, quæ præcipit cōpositione medicamentorum, ei quod morbo contrariū est, immisceri aliud, quod nec omnino sit contrarium, nec omnino augeat, sed medium, ut sit ueluti uia alijs. 7. de comp. secundum loca.

Addit Moyses.

Veluti, cum mastichem quæ facultatis est astringentis, prærogantibus medicaminis miscemus immundi oris uentriculi gratia, ne scilicet omnino illa postea respuat, item cū gal-
lam, cū colocynthide, ne nimium soluat uentrem.

99 Qui prætenues succos habent ita ut ocysimè exhalent, syncope perunq; opprimuntur. Ac tanquam eos qui ex humoris multitudine syncope periclitantur, prorsus ad interitū spectare diximus, si uel his iecur, uel uentriculum phlegmone obsederit: idem ū de quibus nunc agimus, insanabiles sunt existimandi, si uiribus

bus iam languentibus: aliquod egru
uiscus phlegmone infestetur, quoni-
am nec assidue eos nutrire fas est, sed
tantum in remissionibus: nec serua-
re eos si modo nutrantur licet. 12. Me-
thodi.

100 Quum per magna differen-
tia humanorum corporum sit, ob id-
que unicum medicamentum omni-
bus conuenire non possit, duo sem-
per in perpetua habenda: quorum al-
terum sit ualentius, sed ex similibus
genere confectum: alterum mitius
& blandius: quæ inuicem temperas-
dum postulabit usus pro uarietate
mistræ, permulta alia media inter i-
psa constitues. 3. de comp.

med. secundum
genera.

DE

DE PULSIBVS ET
eorum definitionibus.

Sectio III.

1.



Vlsu generando
rū duplex est usus,
primus atque maxi-
mus tutela natiui ca-
loris: alter uerò ani-
malis spiritus gene-
neratio. i. de præcog. expulsi.

2 Pulsus ex gemino motu constat
contractionis & distensionis, in quo-
rum utroq; gemina quoq; quies acci-
dit, una quidem à distensione prius-
quam contrahatur: altera à contra-
ctione priusquam distendatur. i. de
dominis febr.

3 In pulsu, tarditas quidem & ce-
leritas in distensionis contractionis-
que tempore collocatur, crebritas ue-
rò & raritas, in utraque quiete, at
Rhythmus dimensio est temporis di-
stensionis, & simul insequentis eam
inquietis, collati ad tempus contra-
ctionis

ctionis simul & excipiētis eam quietis. Ibid.

4 In solis uehementissimis pulsibus exactè rhythmus dignoscitur, q̄ in cæteris magna pars initij distensionis & contractionis finis nos fugiat, id quod maximè offendit, 3. de dignoscat.

5 Vehemēs æqualisq̄ & magnus pulsus, semper uirium robustarum est signum. Quare si in septuagenarijs is adsit, affectusq̄ iubeat, etiam in ijs secabis uenam. Galen. de uenæ sect.

6 Pro ætatis qualitate, hoc pacto pulsus uariantur, infantis pulsus creberrimus & celerrimus, rarissimus serius & tardiùs omnes, qui inter hos intercedunt, proportionem seruant, prout ad puerum, uel ad senem accedunt propius. At in uehementiæ & magnitudinis differentia, maximus & uehementissimus, & iuuenum pulsus, minimus & languidissimus senum medius, & paulò maior pulsus puerorum. In quibus animalis spi-

lis spiritus cum instrumentis augetur, dum adoleuerint, inde uerò semper minuitur. 3. de caus. puls.

7 Pulsus raritas summa nunquam uacat periculo, sicut nec remissio, neque paruitas, sola extrema uehementia in pulsibus non modò uacat periculo, sed etiam est maximè utilis. Preterea ueloces pulsus tardis sunt securiores: siquidè summa celeritas, summa tarditate est securior. Nam summa tarditas sicuti raritas tum incidit, cū calor naturalis extinguitur. 2. de præcog. expulsib.

8 Inæqualitas motus collectiua dicta, hoc est, quæ in compluribus arteriæ motibus æqualitatem rumpit, commiatur semper cordiæ intemperiem uitiaq; instrumentorum, & facultatis plenitudinem, quoad uires, compositionem, duritiem, &c. 2. de caus. pulsib.

9 Non omni facultatis lēioni succedit collectiua inæqualitas. Siquidem cum per se infirma est, nō ita crebro; At ubi suapte natura est ualida

E op.

opprimitur autem à copia humorū,
aut etiam contumacia instrumenta
sortitur, tunc illam inæqualitatem ef-
ficat. Ibid.

10 Contumacia instrumenta fiūt,
uel obstructionibus, uel compressio-
nibus, uel duritie, quæ sanè durities,
inflammatis scirrho affectis, resicca-
tis, perfrigeratis, ac deniq; distentis
accidit instrumentis. Ibid.

11 Ictus in pulsu est is propriè mo-
tus uiolētus, qui dum tangimus, ta-
ctum facit comes semper duri, uehe-
mentis, magni celeris, alti, conuulsi-
ui & uibrati pulsus. 4. de dignosc.
puls.

12 Duo tantum genera habentur
pulsuum uiolenter ferientium, nem-
pe uehementium & durorum. Qui-
bus autem carnis nostræ natura ce-
dit, ea dura uocantur, quæ uerò car-
ni, hæc mollia. Veluti manus, aquæ
rapido fluctui occurrēs, ab ipsa euer-
titur non tamen premitur: at si lapidi
occurrat, quem altera manus sensim
admoueat præmit à lapide, lapis ue-
rò ab

ro ab illa eueritur, durus igitur pulsus proprium est premere, uehementis euertere. Ibid.

13 Durum simul & uehementem non raro eundem cernas, sicuti & durum simul, & uehemētissimum: at uehementissimus, & durissimus nunq̃ idem existit: nec maximus uehementissimus q̃ atque idem tardissimus.

Quippe uehementissimi & maximū maiori ex parte sunt celeres: sin minus at non tardi. 2. de diagnosc. puls.

14 Quietem superiorem, quæ secundū distensionem præcedit contractionem, quāta sit tactu queas ad unguem assequi, inferiorem non itē planē, quod utrinq̃ sibi asciscat partes, ad initium quidem, contractionis extremitatem, ad finē uerò principium distensionis. 1. de dominis puls.

15 Facultate ualente nunquā pulsus, ad summum paruus esse potest. 1. de præcog. expuls.

16 Si cor quidem calidius sit, frigidiores autem arterie, ipsa motuum

F 2 ex

exordia utrobique fiant, si modo uenē
à corde, facultatem citra lesionem re
cipiant. Cor tamen singulis arterijs
maiores, celeriores, uehementio
remque pulsum habebit. 3. de præcog.
expuls.

17 Nonnunquam in corde ipso
percipitur temperamentorum pug
nantia, nam modò frigidius uisceris
corpus æquo est, & in uentriculis cō
tenta substantia calidior: modo edi
uerso substantia frigidior: cor autem
calidi, ubi etiam pulsus fiunt mode
ratis similes, qua in re multi quidem
& periti decipiuntur. Ibid.

18 Solutæ uires primū langu
dum ac ualde frequentem pulsum ef
ficiunt: præstę uerò pulsus mutant,
cū in reliquam omnem inæqualita
tem & ordine confusionem, tum in
eam, quę in uehementia spectatur &
magnitudine. Nam inæqualitates hæ
oppressarum uirū maximè propriæ
existunt. Gal. introduct. ad puls.

19 Febres putridas comitatur in
initijs quidem pulsus parvus ac ue
lox,

loxx, quum uerò consistunt, uelox simul & magnus. Sic & quæ circa externam quietem uersatur frequētia, in huiusmodi febribus deprehenditur manifestè. 1. de dominis febr.

20 Morsus uentriculi, uomitus, nausea, singultus, appetitus, priuatio atq; dissolutiones: præterquam quòd pulsum paruum efficiūt & languidum, ipsum etiam minus frequētem reddunt, & quibusdam moderatur celeriore. Compressio autem sola citra ea omnia rerū, tardū, paruum, obscurum. Præterea quibus fames est magna, pulsus est eiusmodi.

21 Inæqualitas pulsuū, quæ ferè inuadit una cum accessionibus, compressarum, uel obstructarum modo arteriarum, uel copię humorum opprimentium facultatum est signum. 3. de præcog. expuls.

22 Pulsus in utramq; partem mutatio, si citra alienam occasionem acciderit, accessionis initium nunciat. Ibid.

23 Existimare conuenit, ubi acer-

F 3

uus

ius materiæ humidæ initio accessio-
nis ad cor peruenerit, in primis qui-
dem mortis periculū esse quod præ-
nunciat maxima mutatione pulsū,
in raritatē, tarditatem pernicitatēq̃.
Nam si his insignis remissio succe-
sit, extemplo peribunt. Ibid.

24 Nec magnus pulsus, nec uehe-
mens unquam cum febribus hec-
ticis coeunt, sed si alterutrum habeant
horum, minimè sanè sunt hec-
ticae. Ibidem.

25 Febres putridæ initio accessio-
nis magis augent contractionis cele-
ritatem, in incrementis cum hanc, tū
externam etiam quietem plurimum
concitant, ut pulsus in illa creberri-
mus esse uideatur. At in uigoribus,
utrunq̃ motum contractionis & di-
stentionis habent celere. Atque hi
pulsus febriū per se sunt proprii, nec
unquam fallunt. Ibid.

26 Vbi per totum corpus sensu
nostro pulsare nulla arteria percipi-
tur, is affectus dicit̃, pulsus priuatio,
reuerè tamen in corpus uiuum nun-
quam

quam cadere potest, neque enim est unquam, quin cor unâ cum arterijs in omnibus agitetur. 1. de præcog. expuls.

27 Pulsus tremulus non admodum est conspicuus, languidusque est simul & parvus. Facultatem autem imbecillam, tunicam arteriæ mollem, corporisque gracilem nūciat habitum. 2. de præcog. expuls.

28 Frigidæ cordis intemperies pulsus per nos, tardos, rarosque efficiunt. Ac primū crebritas mutabitur, deinde celeritas, ultimò magnitudo, si quidem illæsa facultas fuerit: nam si sit offensa, ad paruitatem, & tarditatem potius, quàm ad raritatem pulsus mutabitur. 3. de præcog. expuls.

29 Inæqualis pulsus in plurimis quidem crisi- bus fit, & præcipuè cum nō fiunt sine periculo & pugna. Vndosus etiam & insigniter mollis, sudores, críticos, expectandos nuntiāt. Durus uerò uomitum magis, quàm sudores, altus omnimodæ excretionis est index perinde ac uehemens.

F 4

Si

Si uerò magnus extiterit, motus ad exteriora potius per fluxum sanguinis, quam ad interiora per aluum & stomachum indicatur. 3. de Crisib.

30 Mollitudinis in qua est pròptitudo distentionis, comes est magnitudo, renixus & contumaciæ, paruitas, itemq; illius & huius tarditas nō tamen ex æquo, paulò enim celerior est pulsus à mollitudine instrumētorum profectus, eò quem procreat durities, maior autem permultò, quia tunicæ arteriæ quāuis duriores sint, ad celeritatem quandam sunt faciles ad magnitudinem uerò distentionis ineptissimæ. 1. de caus. puls.

31 Solutarum ob alimenti inopiā uirium, pulsus uertuntur quidē principio in languorem, paruitatem, celeritatem, ac frequentiam, ad mediā autem in languorem, paruitatem, tarditatem & raritatem. Postremò in paruitatem summam languorē, frequentem, & eumentam celeritatis imaginem, qui pulsus dicitur formicans. Gal. introd. ad puls.

32 Ver

32 Vermicans pulsus fit uiribus iam dissolutis, sed aliquantum adhuc resistentibus, nō autem ad summum languorē deducitur, sicut formicās: Estq; præterea inæqualis, sed minime malignus. Gal. introd.

33 Inæqualitas, æquabilitatis est labes in quacūq; pulsum doctrina accadat, quæ fit dum partes moueri tempestiuus aut serius incipiunt. Ibidem.

34 Marcessantium pulsus nō simpliciter, neq; secundum unam speciē mutatur. Qui namq; una cum phlegmone nondum soluta paulatim emartuerunt, pulsus habent languidos, celeriores, frequentes ualde, atque cum depressione in angustum redactos, qui uocantur Mynri.

35 Quemadmodum undoso pulsui succedit uermicans imminuto, ita formicans uermiculanti, ubi multis amissis motibus in unū eundemque prorsus paruum desuerit. i. de dominis puls.

36 Formicantis inæqualitas præ
F 5 exigui-

90 RABI MOYSIS

exiguitate non potest percipi, est enim hic pulsus parvus, quo nec alius est minor, languidissimusq; & creberrimus, non tamen celer. Ibid.

37 Arterijs tangendis manus ipsa quæ tanget, non modò promptè sentiat oportet, uerumetiam sit mollis, sic enim uel minimos motus dignoscet. i. de dignosc. puls.

38 Contractionem autem comprimendo magis, quàm leniter attingendo dignoscet, nec minus si infernè quàm si supernè tangas. Perinde enim utrobique contractionem tactus sequitur. Ibidem.

DE



Quoniam quidē febris
omnis ægritudo est in
uenis (nam & arterias
hoc genere cōprehen-
dimus) necesse est pro-
fecto in ijs ex urina indicium sanita-
tis quærere. In ijs autem qui laterali
morbo afficiuntur, primum quidem
sputa, secūdo loco urinas: quoniam
is morbus omninō cum febribus ori-
tur ut in passionibus uentris, si sine
febre fuerint, sola excrementa inspi-
cere oportet, si autem cum febre, eti-
am urinas. 1. de Crisibus.

2 Optima urina quę ex putrescen-
te humore perficitur, qui adhuc con-
coctionem à continenti uase suscipi-
at, est quę albam, leuem, æqualem &
minimè foetidam habet hypostasim.
Pessima autem quę in omnibus ma-
ximè contrario modo habet.

3 Vrina consistentia & colore un-
diq; æqualis superiorem esse naturā
mor-

morbo indicat. Bullæ uerò in ea nantes, & ab humore frigido spiritû flatuosum ambiente factæ, methriticum & locum morbum prænunciât, 7. Aphorif.

4 In ægrotis urinarum illa optima est, quæ urinæ sanorum simillima, nempe subrufa uel subflaua, magisq; subrufa, quàm subflaua. Itē quæ subsidentias habet albas, & læues, & æquales, aut nebulas quasdam, aut suspensa similia, hæ siquidem omnes urinas bonitate præcellunt. 1. de Crisibus.

5 Pessima omnis denigrata urina, est, adeò ut neminem unquam sanatum uiderim, qui talem minxerit. Minus tñ perniciosa est si sola sit hypostasis nigra: atq; adhuc minus si solū, id quod in medio pendet, ac multò minus etiam si nebula. Ibid.

6 Urinarum turbidarū triplex est differentia, una quæ cum talis mingatur, paulò post residet altera, quæ semper similis permanet, tertia quæ pura quidem mingitur, postea uerò
contur

conturbatur. Ac praua quidem ex di-
ctis tertia est. Bona autem prima, me-
dia inter utramque est secunda. Siqui-
dem prima illa aliquid inæqualis tur-
bulentiæ super esse demonstrat. Se-
cunda uigere adhuc, quæ est in san-
guine agitationem, tertia tantum in-
cipere concoqui, quare deterrima est:
nam longiori tempore & uirtute for-
tiori indiget ad concoctionem. Ibid.

7 Omnibus his, qui ex ocio & re-
pletione febricitant, si sanitati resti-
tui debeant, in urina plurimum ne-
cessario sublidet: contra his qui ex in-
edia, & labore rubidæ simul, & bilio-
sæ excernuntur. Soluitur quippe mor-
bus priusquam subsideat aliquid, suf-
ficiteque in his, & nebula, & suspensio
optima qualis est alba læuis & æqua-
lis. Ibid.

8 Quando febris ex crudis humo-
ribus nascitur tum plurimo sedimine
repletur urina. Cum uero ex choleri-
cis seu biliosis nullo protinus aut cer-
te exiguo. Gal. in prognost. Hipp.

9 Urina quæ ad summum incocta
est omne

est omnes turbidas malignitate superat. Est enim aquosa exquisitè, ac proinde ueluti desperatæ concoctionis, affectioq; uenneosæ naturæ existit, quæadmodum uentris cruditas. Ibid.

10 Urina pinguis & alteram biliarum speciem referens, pinguedinis liquefactionem ab ardore febris indicat, quemadmodum & carnis, si quando olei colore mingatur, quam carnis liquefactionem periculum mortis sequitur. In 2. Epid.

11 Vbi urina celeriter mingitur, *ὑδαρὸς* & Diabote appellatur, extinctæ utriusq; facultatis retentricis, & alteratricis indicium: estq; inter omnes crudas urinas pessima. 1. de Cris.

12 Quæ farinæ hordeace crassior in urina sunt subsidentia similes, grandis colliquationis & ardentissimi incendij sunt signa. Ibid.

13 Optima omnium urina subflaua & subruffa est. Cæteri colores omnes perniciosi. item si quid aliud præter hæc, nempe *ὑαλῶδες* suspensionem in medio, *ὑπόστασις* subsidetiam, &

& νεφελήν nebulam eminentem appareat, id omne perniciem indicat. Ibidem.

14 Nil aliud oportet considerare in modo crisis præter naturæ ipsius inclinationem. Distinguendum autem est, an calidus & acutus sit morbus crisisque in primis fiat periodis: quippe necesse est tunc post crislum non abscessum, sed excretionem subsequi. Attardi & diuturni morbi per abscessus quiescere consueverunt, precipue si urinæ tenues & caudæ longo tempore exierint. Ibid.

15 Frustula quædam seu grumi simul cum urina nonnunquam ægrotus emittit: quæ si hordei aut lenticulæ similitudinem habent, ab hepate malum esse significant, sin carnis potius comminutæ, à renibus: si teredinis ac ramentisculorum, à vesica: si farris non nigri, à nervis & carnis liquefactione. Sin uerò nulla sint frusta, sed sit urina nigra omnino, à splene, si pinguis à pinguedinis liquefactione esse malum significat. i. in 6. Ep.

Ad.

Addit Moyses.

Quod ex iam recitatis Galeni uerbis de urinarum iudicio discere potui, summam, id est: Optimam urinam omnium esse in morbis eam, quæ laudatum & probum habeat, sedimentum, primamque dici, quod concoctionem fieri indicat, alteram quæ illi & bonitate, & numero secunda esset, eam quæ turbidior omissa paulò post resideat, quæ concoctionem incipi tantum iudicatur. Tertia quæ turbida eiecta, rarefcit quidem & attenuatur, sed in funda nil residet, quæ tempus concoctionis nondum adesse monstrat. Quartam, quæ & turbida mingit, & sic manet: quæ à concoctione, magis quam superiores abest. Omnium uerò maliciã superare eam, quæ tenuis raraque emittitur, eademque semper manet, quæ nullam omninò esse, nec futuræ spem concoctionis. præbeat.

DE

DE SIGNIS MOR-

borum. Sectio V.



Poplexiæ seu morbi attoniti signa sumuntur ex affectione spiritus. Si enim respiratio omnino nulla sit, peior esse morbus non potest. Sin sit quidem, sed intermittatur & magna cum uiolentia trahatur, uehementer afficitur, sed non fieri similiter. Si uero respiret exiliter quidem, sed uno ordine, minus leditur & adhiberi remedium à diligenti medico potest. Ex Moyse ipso.

2 Amittitur spiritus deficientibus ui, motuq; pectoris, aut nimio frigore cerebrum occupante. Gal. in 4. Aphorif.

3 Delirium ex solo calore, nulla materia corrupta natum, simile est ebrietati. At quod ex flaua bile incensa oritur, temeritatem, sollicitudinem & tristitiam infert: & plerunque si forte incensior fiat, utramque bilem

G

ad misce-

admisceat, maniam. in 6. Aphorism.

4 Sternutatio in morbis diuturnis, si modo non sit in pectore morbus, omnino bonum est signum, significat enim concoctionem fieri & cerebri uim ualidam esse, in primum Prognost.

5 Vtriusque plenitudinis quantitas ex propriorum signorum magnitudine definitur. Si enim grauis quodammodo sibi homo uidebitur, plenitudinem quo ad uires creuisse constabit: Sin auctus fuerit tensionis sensus, auctam quoque plenitudinem quo ad uasa, qualitas uero partim ex colore humorum, partim ex ijs, quæ eorum naturæ coniuncta sunt. Gal. de sang. missione.

6 Venarum tumor forsan poterit esse plethoricum signum, inseparabileque ubi corpus ita se habuerit, ut neque externa interius, neque hæc illis caleant magis, nec præterea calor immodicus uniuersum corpus detineat. Carnis autem & adipis moles, etsi eorundem multitudinem indicabit,
non

non tamen eius plethoricæ plenitudinis, quæ uacuationem desiderat, signum existit. Gal. de plenitudine. & paulò post. Iam rubor si nec ex sole, nec ex balneo, nec ex immoderato exercitio, neque ex calore, nec ex ira iracundiæue, neque ex alia denique occasione extrinseca oriatur, sed undequaque æqualiter corpus fuerit sic affectum sanguine plenitudinis nobis indicium existit.

7 Pituitæ species (præter crudam) sunt dulcis acida & salsa: ex dulci fiunt somnolenti: ex acida cum redundat, famelici: ex salsa siticulosi, à cruda autem denicitur appetentia somnolentiamque etiam efficit. Humectat enim & refrigerat cerebrum, quod est sentiendi principium: unde soporescit, quemadmodum in uigilias illabitur, si siccescat & incalescat. Ibid.

8 Aegroti iam garrulitas, iamque diuturna taciturnitas melancholiam, cum phrenesi seu delirio iunctam significat. Quod enim garrit, delirium est: quod uerè silet, melancholiæ. Gal. in 3. Epid., G 2 9 Sua

9 Superflui humoris inuacuatio fit, aut solutione uētris, aut urina, aut sudore. Cū autem natura ex se harum trium alicui imminet, à duabus reliquis abstinere oportet. Quamobrem si per sudores crisis futura est, constypandus uenter & retinenda urina est. Sic enim facilius primum rigescit corpus, deinde sudat. 1. in 6. Epid.

10 Lippitudo in oculis, uel in facie sudor ægroti, pulueris modo exiccatus, malū portendit ægrotō, quē admodum in morbis acutis, uisus detrimentum significat, caligatio seu uisus obscuritas. Ibid.

11 Morborum symptomata etiā si sunt grauissima si facies naturalis & pulchra appareat, non est periculum timendum. Contra uerò symptomate minimē periculoso, uultu autem à natura alieno apparēte, nusquam est tutò fidendum. Gal. 6. in 6. Epid.

12 Melancholici ferē sunt omnes timidi, n̄ sc̄q̄ res quam timent, si morbus simplex unaq̄ est, cernitur eadē una.

una: at si mixtus compositusue, gemina ipsa duplexque apparet. Auget autem istud paucior timorque pro morbi magnitudine: quæ uirtus animalis fore compositionem corporis sequitur. Gal. in 6. Epid.

13 Certissimum uirium signum in egroto est, oculorum apertio eadem quæ in sanis. 4. in 6. Epid.

14 Ex colorib. linguæ, facile quis humor in uenis hepatis, Renum, uesicæ, & uiscerum præcipuus sit, discernitur. Si enim nigra est, siccum febremque ardentissimum esse signum est. sic de cib. Gal. in 6. Epid.

15 Cibus dulcē & molliter suauem soli, qui sani sunt sapore discernere possunt. Aegroti reliqua possunt tantum etiam pro ratione morbi diuersa. 5. in 6. Epid.

16 Sudor frons aut colli, aut thoracis in ægro, uirtutis animalis debilitatem significat. Frequens autē cruditas & ciborum putrefactorum itaque panis crassi appetitio, lumbricos uentris. 7. in 6. Epid.

G 3.

17 Bi-

17 Bilis atra semper est lætifera, siue in sputo, siue uomitu, siue in urina excernatur. Secundum hanc uero flaua, si pura simplexque sit, cæteri humores minus periculosi in huiusmodi excrementis. Gal. in 2. de humoribus.

18 Bulle in lingua turgentes magnitudine penedactyli significant hominem uix diem secundum euasurum. Tumor autem niger in digitis manus, orobi magnitudine, quæcunque febris specie laboret æger, si grauem inde dolorem senserit, quarto die moriturum indicat. In 6. de sig. mortis.

19 Exactæ bilis atræ humorē, qui ex humore atro nēpe facie, aut amuricæ instar sanguinis, supra modum assato generatur, semper excerni ad perniciem animaduerti. Gal. de atrabile.

20 Qui in humorum cognitione & experientia est uersatus, causam facile uidet, cur atræ bilis excretio sit periculosa, nigrorum uero excrementorum non sit. Cum interim inexpertus miretur

retur illud hac ratiocinatione ductus
quòd noxiæ rei effluxio nullo modo
nocere debeat, sed potius prodesse.
Ibid.

21 In uniuersum nemo seruari po-
test, nisi natura superauerit morbum,
nec perire nisi illam morbus prostra-
uerit. Morbi autem singuli ex sua na-
tura magnitudinem quandam possi-
dent, quàm si uires superent omnia
probè eueniant, sin supra hac ipsa fu-
erit, opprimuntur & homo prorsus
moritur. In ijs uerò ascensus uirium
superantium in concoctionis signis
consistit, quemadmodum in ijs, qui
morituri sunt in cruditatis & letalib.
Gal. de totius morbi temp.

22 Cuiusq; partis superfluitas, eã
quæ illi inest dispositionem ostendit,
si cocta quidem fuerit salubrem: cru-
da autem, egram. Veluti alui, sanita-
tem, excrementa mollia, & cohæren-
tia, & eorum exitus eadem hora, qua
in sanitate solebant. Et sputū, instru-
mentorum respirationis & urinæ, ue-
nosorū instrumentorū. i. de Crisib.

G 4

Cocli

23 Coctionis signa nunquam male apparent: decretoria autem est, ubi male. Neque enim in augmentis, neque in principijs, sed in statibus illa apparere conuenit. Ibid.

24 Supinum iacere & hiare cum stercore, aut exolutionis, aut ebrietas, aut ignauia sunt signa. Galen. de motu Mus.

25 Phrenitis signa modò cum febre, modò sine febre ex melancholico succo de preassata bile facto, in cerebri uentriculi mentibus retento gignitur, nonnunquam mitior, ubi scilicet à pallida bile ortum trahit, interdum uehementior est ubi flaua bilis eam peperit: nunquam uerò eam pituita generat. 3. de locis aff.

26 Febrium ardentium symptoma delirium est, quod nimirum fit, elatis ad cerebrum multis uaporibus calidis. Eam autem insaniam speciem, quæ breui melancholicum uocat, succus melancholicus inducit, ubi in corpore cerebri abundat. Ibid.

27 Affectio suffusioni per similis
à uen-

à uentriculi dispositionibus ortum trahit. Namq; uentriculo cerebrum, cerebroq; uentriculus suas affectiones transmittit, propter neruorum à cerebro ad os uentriculi descendentium magnitudinem. Vnde & fracturas capitis, ubi ad membranas perueniunt, uomitus biliosi, & quosuis capitis dolores mausa, stomachique morbus consequantur. Ibid.

28 Eorum quibus dimidia capitis pars dolore infestatur (uocantur hemiconici) alij extra caluariam, alij in intimis capitis partibus dolent, fit autem is dolor, ex uaporosi calidiq; spiritus repletionem, aut ex biliosis excrementis, ac spiritus quidem dolores sensus pariunt biliosa excrementa, mordaces, plenitudo, grauitatis sensum; At si rubor adsit & calor, calidos esse in causa humores est signum Ibid.

29 Si afficiatur posterior pars cerebri, reliquarum faciei partium motu & sensu incolumibus, solius linguae motus uitatur. Cum enim à par-

G 5 te an-

te anteriore cerebri, facies suas ner-
uos recipiat, à posteriore uerò om-
nes partes, quę sub capite sunt, à qua
oritur septima neruorum cōiugatio
in musculis linguę insertorum, non
ab re quidem altera cerebri parte au-
steriore affecta, reliquę anteriores
manent incolumes: quemadmodū,
parte altera anteriore affecta, sola li-
guę motio uitio caret, in altera om-
nes faciei partes sensu & motu uolū-
tario destituuntur. 4. de locis aff.

30 Si in iecinore attractrix facul-
tas quomodocunq; afficiatur, cibum
quem confecit uenter, atque in
chylum conuertit, relinquet ut liqui-
dus excernatur per aluum, atq; hoc
ipsius facultatis affectu erit signum.
Siquidem quicquid ab aliquo profi-
ciscitur tanquam à causa, id etiam ef-
se illius signum constat. 5. de loc. aff.

31 Phrenitidis signa seu sympto-
mata sexdecim præcedūt, utputa im-
mensa uigilia, somnus uarijs imagi-
nibus turbatus, rerum omnium quę
faciunt ægri obliuio, tumultuosa aut
teme-

temeraria responsio, modica & exigua sitis, occipitis dolor uehemens, oculorum squalor, aut ex altero horum acris lachryma, lippitudo, uenarum tumor, sanguinis & naribus stillatio. Quo tempore nil exacte prudenter respondent: floccos uellunt & festucas carpunt, & acidiori febris torquentur, lingua quoque ipsa aspera est, nonnullique auditu falluntur, atque interdum iacet cogitabundi. Quinetiam uel dolorifica dolore affecti, uel aliquo acrius praeemente, ceteros haudquaquam sentiunt. Ibid.

32 Fluxus sanguinis, & naribus, lienis, hepatisque soluit inflammationes ubi simul adest acuta febris, sicuti & reliquas quae sub praecordiis fiunt feruētes acutasque omnes. At per directum ex parte affecti uisceris cum fluere oportet, ex dextra quidem, patiente hepate, & locis sub dextris praecordiis positis: ex sinistra autem, liene & uicinis illi partibus. 3. de crisib.

33 Omnino quae inter animalia & plantas uelociter crescunt, breui etiam

etiam tempore cadere solent. Gal. in
2. Epid.

34 Accidit interdum in morbis quibusdam acutis, ut vitiosi succi in pulmonem decidant, qui si sint pauci, non inflammantur, sed per sputa eijciuntur. Id uero medici imperiti conspicientes, pleuritida continuo uel peripneumoniam, sed falso esse credunt. In 6. Epid.

35 Tussis malignae causa est, uel humorum a capite fluxus, uel phlegmone, aut abscessus in spiritualium partium aliqua, natus, aut denique sanies putrida in pectore collecta. Arida uero earundem partium intemperies, & gutturis ac tubi pulmonis crassities. In 6. Epid.

36 Causae dyspnoeae seu difficilis respirationis sic explorantur. Si uideris aliquem respirantem aegre, ita ut inter respirandum thoracis omnes moueantur muscoli, pectusque etiam una cum scapulis attollatur, certe ex tribus unum conicere oportem, aut uirium imbecillitatem, aut uiarespiritus

ritus angustiam, aut uehementem in
corde & pulmone caliditatem. Ac ca
loris quidem uehementiam indicat,
omnium thoracis musculorum di
stensio, ueloxq; & frequens eorum
actio, & spiritus calidus ac feruidus.
Imbecillitatem, spiritus per nares tan
tum emissio, narium pinnis manife
ste dilatatis, nec ulla per os facta ef
flatione. Angustiam uero totius tho
racis plurima celerq; & frequens di
stensio, & absq; ulla efflatione exspi
ratio. Si uero couenerint calor & an
gustia, quod fit in peripneumonia,
nec maxima, nec frequentissima, ut
celerissima spiratione sufficere potest,
sed surgere conantur a gri, quod sic
melius eis thorax dilatari uideatur.
Difficile autem est sic affectos cura
re. Quod si tres omnes cause coiēnt,
mortem proximā adesse tumore o
portet. 4. de locis affect.

37 Vexatur interdum pulmo inæ
quali, sicuti & æquali intemperie ci
tra humorum affluxū. Inæqualis qui
dem tussim excitat: æqualis uero, si
mode

moderata sit, spirationis concinnitatem uariat, sin uehemens & quidem calidissima, frigidi aëris, & potionis cupiditatem inducit, fitq; febris tractu temporis. Frigida uerò si modum seruarit, calidi aëris & calidæ potionis desiderium facit, sin modum excedit, replet uiscus ipsum fluxionibus. Ibid.

38 Si citra febrim in pleuritide serofus aut pituitosus humor defluens excitaret spirandi difficultatem, æger tunc tenue sputum, ab initio quidem exiguum, sed cum uehementi iussi, ubi uerò concoctum est plus atque crassius, & cum mitiori tussi expuere solet. Ibid.

39 Pleuritidis inuadentis, signum certissimum est perpetuus lateris dolor, nulla cataplasmatum appositione remittens. Vehementis autem, sputi crassi, lentique repletio, difficulter efferentis se, utpote multo & uehementi spiritu ad id egentis. In 1. de mor. acut.

40 Corpora ad similitudinem aliquius

cuius morbi à natuta affecta, facile in eum incidunt, ut hydropicis similia, in hydroposim, pthificis, in pthifim, seu tabem, melancholicis in melan- choliam. Item & animorum affectus indicant. Maledici enim & conuitia- tores in insaniam, similis illi uitio na- turæ affectū in fluuios cadunt, inco- stantes & leues ac mobiles, in deliri- um &c. 5. in 6. Epid.

41 Singultus si phlegmone affe- cto hepat accedat periculosus est, sic spasmus, si uigilijs & tussis, hydropisi. At sternutatio, si singultui simul inci- dat, eum dissoluit. Gal. de sig. mortis.

44 Intemperies cordis interdum in eius uentriculis cōtinetur, ex quo ei tremor fit interdum in corpore ip- so uisceris, & tunc nullo tremore affi- citur. 3. de præcog. expuls.

43 Ab accidentium proprietate, effectuum indicia oriuntur: ut qui- busdā per tabificos morbos ungues adunci euadunt. Per intempestiuum horrorem cum febre, inflāmatio ad suppurationem transire significatur, per

per linguam nigricantem, ardens febris. 1. de locis aff.

44 Sicut actionum noxæ, affecta partē notant: sic differētiæ ipsum affectum ostendunt. Ea igitur sola sunt affectuum propria signa, quæ per accidens ipsos sequuntur. Ibid.

45 Melancholiæ hypochondriacæ & flatulentæ, quæ a uentriculo oritur, signa sunt, post sumptum cibū concoctu difficilem, ructus acidi cū eo quæ & flatus, & æstus, diuiditur paulò post fluctuatio in præcordiis, uentriculi uehementes dolores, qui ad dorsum usq; nonnullis extenduntur: à coctis cibis quies, ab alijs ingestis eorundem symptomatum reditus, quæ interdum ieiunos, à cœna affligunt, & pituitum, adeo non nunquam acidat uomitibus, ut dentes torpēre uideantur. Præterea, mœsticiam & metus perpetua sunt illi: item certissimum si alui deiectione, uomitu proba concoctione, ructibusq; leuetur is, qui laboras. 3. de locis aff.

46 Inseparabilia lateralis morbi sym-

symptomata sunt febris acuta, dolor proinde ac si locus, uel intendatur, uel pungatur, spiratio frequēs & exigua pulsus paruus, arteriam & durā & quodammodo tensam indicans, tussis magna ex parte cum coloratis sputis. 5. de locis aff.

47 Iecur declarat magna inflammatione affici grauitas in dextera præcordiorum parte, dolor tota præcordia retrahens, atq; ipsius ad iugulum usq; extensio: exigua tussis, linguæ color in primis quidem ruber, deinde uerò niger, ingens cibi fastidium, inexplibilis sitis, uomitus tū sincere, tum eius, quæ anorum luteis assimilatur bilis, quæ aliquando æruginis quoq; colorē refert. Alui quoque astrictio, nisi una cū uisceris huius imbecillitate, inflammatio ipsa acciderit. Ibid.

48 Cæcidit quidam ab alto, ita ut dorsi initiū affligeretur, is tertio die exiguam admodum uocem, quarto nullam omninò emisit. Resoluta q; simul sunt crura manibus illæsis, sed

H nec

nec spirationem amisit, nec dyspnoea laborauit. Nam soli intercostaliū musculorum nerui, qui afflatum, efficiunt, affecti erant. Thorax autem & Diaphragma erant integra. Vbi igitur sedata est spinæ inflammatio à septimo die uox restituta est. Huiusmodi autem noxa per consensum spinæ cum intercostalibus musculis & gutturis. 2. de locis aff.

49 Quæ in sinus iecoris partibus eueniunt inflammationes, ut magis quàm illæ, quæ in gibbo fiunt, fastidium, nauseam, uomitum, biliosum ac sitim ingentem inducunt: sic à contraria, hæ maiori quàm illæ inter spirandum dolore laborantem infestāt, magis quæ tussim excitant, atque dolorē usque ad dextrum iugulum, adeo ut detrahi uideatur extendunt. 5. eius.

50 Dolores capitis in superficie quidem hærentes periraniæ affectionem significant, qui uerò in profundo sunt, cerebri inuolucrorum. Atque in his si cum grauitate sint, multitudinem humorum cum pulsu, ob ortam inflam-

inflammationem: si cum tensione ci-
tra tum grauitatem & pulsum spiri-
tus tenuis, & flatulenti repletionem.
2. de comp. secundum loca.

51 Dolores membranarum ossa
tegentium à plerisque dicti sunt ossium
penetratio, quòd æger dolorem etiã
interiorum partium sentiat, atque in
ossibus esse existimet. Id uerò accidit
plerumque ex labore. 2. de locis aff.

52 Fieri nõ potest ut inde oriatur
frigidus sudor ubi febris acuta sedet.
Alioqui enim ab illis partibus cale-
fieret, quare in partibus iam frigidis
factus propter exhaustum naturæ ca-
lorem, uel iam iam exhauriendum, &
extinguendum, nascatur necesse est.
Significat autem aut mortem esse pro-
pinquam, aut morbum fore diutur-
num, quod posterius ubi superflui
humoris copia est, sæpius euenire so-
let. in 4. Aphorif.

53 In morbis diuturnis, ægrorum
digiti ferè sunt frigidi: at in hecticis
febris calefiuntur, quòd huiusmo-
di ægrorum digitis minimum carnis

inhæreat, ex hoc cutim perspicî potest, quod in partib. solidis febris maximè contingit. Gal. in 2. Prognost.

54 Sudores tam sanorum, quàm ægrorum sunt falsi, sed hoc differunt, quod ægri sudor humorem corruptum, unde est ortus magis sapore referat. In 2. Epid.

55 In hypochondriacis affectibus, manum imponēs parti affectæ principio doloris, ut ex his sentias primum sine phlegmone an scirrhus, an uerò flatus, an purulentia, an sterco-
ris repletio, an aliud. Tū cognito affectu solutionem aggredieris. In 2. Epid.

56 Appetitionis uis amittitur aliquando ex humoris cuiusdam mali, in ore uentriculi repletione fortassis etiam ex hepatis corrupta natura ex quo maximum ægroto desiderium mortis solet accidere. quia nihil sapiat. In 3. Epid.

57 Apostematum omnium leuissima sunt, quæ extra corpus apparēt, & secundum hæc, quæ acuta sunt, contraria

traria uerò his pessima. Ex his uerò quæ ad maturitatem producta uacuantur per se, ea quæ undiq; æquè cocta sunt, neq; in ambitu obduruerunt. i. in 6. Epid.

58 Spasmus ex percussione aut medicamine purgantis potu profectus, malum signum. Rursus uerò in τετανω, id est, distensione ceruicis, qd est spasmus genus, præsentanea mors. De sign. mortis.

59 Pustulæ nigræ post aures magnitudine circiter orobi natæ, & sitis simul uehementior mortis signū est. Alioqui certè si etiam crura defluerit chynnus, difficillimè curat. Ibid.

60 Quemadmodum intestina citra alicuius auxiliij spem ulcerantur ab atra bile, à flaua autem difficulter curantur, sic in profundo sitis accidit cæteris partibus, his præcipuè, quæ in testinis sunt nobiliores. Intestinorū enim curatio faciliior eo quod medicamina, quæ per sedem iniiciuntur, statim locis affectis occurrunt, quod in cæteris fieri neq; Gal. de atra bile.

H 3. 61 Lien

61 Lien malè affectus, uel ex inflammatione, uel scirrho, uel imbecillitate, ad nigrū conuersus colorem uitiosum in toto corpore efficit. Ibid.

62 Alui excrementum optimum (aut Hipp.) est molle atq; coniunctū quod ea hora exierit, qua sanitatis tēpore consueuerat, & cuius quantitas est pro ratione cibi assumpti, itemq; leue, & non admodum fœtidum, & subruffum. Tale quidem concoquēdi uim in inferiori uentriculo ualidā esse ostendit, aut in uentre, neq; in circumstantibus organis erratum esse.
1. de Crisib.

63 Alui excremēta, leuia quidem & cohærentia, & statis horis soluta, sed non pro quantitate cibi assumpti significat in intestino colo, aut alio quodam tenui retentam esse materiam, quod periculosum est. Ibid.

64 Incoctum alui excrementum est album, tenue, asperum, humoris expers ac ciborum retinens qualitatem. Ibid.

65 Secundum genus excrementorum

torum non ex ciborū fit dispositione
sed ex confluentibus à toto corpore
ad uentrem superfluitatibus, quod si
sit uiride, indicium bilis æruginosæ
existit perniciosum. Si autem nigrū,
uel atrę bilis, uel sanguinis eo loco p-
ulsi. Ibid.

66 Per hepatis imbecillitatem, ex
crementa alui aque in qua carnes nux
per mactatæ ablutæ fuerint, assimilā-
tur. At in peripneumoniciis maxillæ
uidentur cubeæ, &c. 1. de loc. aff.

67 Contingit plerunq; ut uel ero-
sa, uel rupta uena, sanguis tussiendo,
affatim eñciatur: at si spumofum sit a-
liquid simul eductum, efficacissimū
est, ipsum educi à pulmone indicatiū,
multoq; magis si brouchi pars quæ-
piam aut arteriæ, aut uenæ tunicæ,
aut etiam pulmonis ipsius caruncu-
læ reiñciatur: itemq; si nullus dolor in-
festat eos, qui sic afficiuntur. 3. de lo-
ci affect.

68 Efficacissima exulceratorū re-
num coniectura est, si exiguæ carun-
culæ, atq; interdum sanguis per uri-

H 4

nam

rinam excernantur, utpote quas, re-
num essentia partes, easq; ob uehe-
mentem ulceris erosionem auulsas
esse constat. 6. de loc. affect.

69 Sanguinem egerunt ac uomi-
unt sæpissime phœnicum, & uerum
aut certè ueri similē, quibus aut pes,
aut manus incisa est, itē quibus men-
ses, hæmorrhoidesq; suppressæ sunt,
ac plerunq; etiam, qui ab exercitio
consueto destiterunt. At quibus ex-
rupto in uisceribus ulcere, taniosum
& faci potius similem. 1. de loci aff.

70 Si quid ueluti humidum in ex-
cremento apparuerit, ubi non fuerit
tale aliquod intra corpus sumptum
(id quod semper intelligendum est,
in excrementorum signis) partium in-
ternarum ualidum frigus, ac mortifi-
cationem ostendit. Si uerò pingue,
pinguis colliquationis, si glutino-
sum, colliquationem solidarum par-
tium portendit, quæ multo est peri-
culosior. 1. de Crisib.

71 Excrementa uehementer foeti-
da, si foetoris causa non est ex cibis
sum-

sumptis, uehementem putrefactionem indicat, & ibidem. Excrementum striduum flatum quidem sibi cum tenui humiditate permixtum esse declarat: organa autem in unum coarcta atque in angustum restricta. Spumofum feruorem humorum, uel flatu alicuius cum humiditate colluctationem: quorum illud immoderate caliditatis corpus colliquatis, hoc uero inaequalis perturbationis effectus. Varium, uariis corpus affectibus esse obnoxium ostendit, & ob hoc ipsum & diuturnum, & malignum existit. 1. de Crisib.

72. Morbis uentriculi symptomata eiusdem etiam commiscuntur, ut in ipsius commotione, quae ueluti conuulsio est, ei que per singultum accidit. uenter enim per singultum prae uere cibos amplectitur, conaturque deprauato illo conuulsioque motu, etiam molesta expellere. Id autem accidit ei ex imbecillitate. 3. de caus. symptom.

73. Excrementa nigra significant

H 5 aut

aut adustum humorem, aut putrefactum dominari, aut certè melancholici defluxum. in 4. Aphorif. & paulò pòst. Eadē in principio morbi, hepatis affectum pestiferum, post uim autem morbi bonum significant.

74 Appetitionis amissio principio morbi orta ex biliosorum humorum ab hepate ad uentriculū fluxione, non est mala: At ubi iam productus est morbus, facultatis exhaustæ periculosissimum est signum. In 6. Aphorif.

75 Grumos uocatos, nempe sanguis bolos non solum eos, qui in uesica, sed multò magis eos quoq; qui in intestinis, uentriculo atq; thorace nonnunquam continētur, animi defectio & color pallidus sequi solet, pulsus uerò paruus obscurus, & frequens apparet, laboransq; ipsi cum anxietate resoluitur. 6. de loc. aff.

76 A locis etiam morborum indicia sumuntur, ut soli oculi suffusione laborant, & lapis in uesica & renib. duntaxat nascitur, at ut nōnullis placet

et etiā in colo. Lumbrici in intesti-
nis &c. 1. de locis aff.

77 Qui caput ob humorem bilio-
sum dolent, ijs signa similia sunt ijs,
quæ ab ardore proficiſcuntur. Maior
tamen his morſus & faciei pallor, &
nōnunquā oris amaritudo, ætati au-
tem uigoris, temperaturis calidiori-
bus & uitæ ſollicitæ, & ijs qui flauam
bilem accumulanti præcipuè contin-
gere ſolet. 2. de comp. ſecundū loca.

78 Eis autem qui ex ardore caput
dolent cutis tactui aridior ad primū
contactum apparet, oculosq; rubros
habent, ac frigidis tum perſuſioni-
bus, tum illitionibus oblectant. Qui
autem ex frigore, ijs facies decolor,
minimeq; arefacta conſpicitur, & fri-
gidis, neq; gaudent, neq; iuuantur. I-
bidem.

79 Maximè quidem artis curandi
coniectura in affectionum cognitio-
ne conſiſtit, quæ ubi inuentæ fuerint
curationem non coniecturaliter, ſed
ſcientificè indicant. 2. de comp. ſecū-
dum loca.

Addit

Addit Moyses.

Noui equidem medicorum sententiam, ut tres dicant esse uirtutes corporis, animalem, uitalem, & naturalem. At ego hoc loco omnes uno nomine actiones corporis uoco, atque harum nobilissimam, spiritus: secundam, pulsus: tertiam sensus. quorum etiam primum pono uisum, secundum hunc auditum, tertio loco cibi & potus appetitionem, quarto sermonem, quinto memoriam ac imaginationem. Postremo motum cuiusque organi proprium. His uero cognitis, naturæ nomen æquiuocum seu omonymum esse sciendum erit, de multis enim dici diuersa ratione ex quibus præcipua illa est uirtus, quæ ab ipsa denominata naturalis appellatur. Eam uero existimare æquum est totum corpus regere, & ipsius nobilissimas actiones edere, generationem, augmentum & nutritionem, quarum uim omnium etiam seruare conatur.

Quod si parte aliqua ab alio lædatur, ei obstitit, repellitque, quantum potest,

test, uerum si infirmior ipsa succum-
bit, tum debilissimo membrorum ad-
herescit eiusque actionem coacta qui-
dem, qua minimum potest, offendit.
Si autem amplius cogatur, ad illas
quoque descendit, eisque nocet, sed inui-
ta: quo fit ut ne accusari quidem ius-
te possit. Ex his igitur perspicuum est,
quo modo facile distingui letiferi
morbi a contrariis debeant, atque indi-
cium colligi, quae sit ipsius naturae uis
& facultas. Si enim neque inspiret, ne-
que expiret corpus haud dubie sig-
num est omnis obitae & defunctae il-
lius actionis. Idemque de pulsu, de ce-
citae, de uentriculi deiectione, de ser-
monis priuatione, de mentis pertur-
batione, uel de omnium quadam inter-
missione iudicandum. Haec uero sig-
na dicuntur quidem omnia interitus.
Idcirco pro facultatis lesae ratione.

Quapropter apoplexia si sit gra-
uis, non potest, non esse pernicio-
sa, si leuior, at curatu quidem difficilli-
ma, ut ait Hipp. nec fieri certe aliter
potest, cum in ea deficient praecipuae
natu-

naturę actiones, quę sunt spiratio, recta mentis constitutio, Sermonis usus, sensus & pulsus. Certum est autem huius pestis causam, non ex unius instrumentorum simplicium affectu proficisci, sed ex uniuersę animalis corporis facultatis esse. Alio, qui non ita deiecta corpora fore, cū multos phreniticos, qui ex solius cerebri melancholica affectione laborant, diutissimē superesse uideamus. Multos cęcos, surdos, claudosq; longissimam uitam uiuere, quod uidelicet unica tantum parte, non totius corporis affectione laborent. Hanc ergo definitam sententiā, id est, aphorismum notari a lectoribus, hoc nomine maximē cupio, quod continere maximam certē predictorum signorum partem uideatur. Hactenus Moyse.

80 Ego etiam aliquot symptomata ex methodo & arte comperi, quę eadem in sanis morbum & in ęgris salutem pręficiunt, quorum hoc unum est clarissimum. Somnus altior solito.

solito. Itemq; maxima cibi auiditas
& sternutatio uehemens. Hęc enim
in sanis periculosa, & in egris saluti-
fera ut plurimū uisa sunt semper. Ga-
len. comp. 7. in Tymęum.

81 Maximum sanē existit indicatiū
pleuritidis si pulsus sit magnopere
durus, ob idq; similiter paruus & ob
ambo hęc, caloremq; creberrimum.
Pleuriticus namq; cum tali pulsu est
nullus unquā seruatus. 4. de pęcog.
ex pulsib.

DE CAUSIS
morborum specialium.

SECTIO VI



Ausæ antecedentes
quæ robur faculta-
tis adaugent partim
in ipso insunt corpo-
re; ut humores semi-
cocti adhuc & cru-
di, qui iam conco-
quantur, & naturæ ad indicationem
impe-

impetus, ac præterea iracundia. Partim adueniunt extrinsecus: ut uinum rebus, modicæ exercitationes, & omnia quæ intemperies corrigunt. Deprimunt uerò facultatem inedia uigilia, sollicitudines, mœrores, uacuationes immodicæ, uehemētes dolores, uel cum quadā proprietate accidentes, ut stomachicus affectus, qui animi deliquium inducit. Deprehendūtur autem præteritæ causæ ex præsentī constitutione, quā pulsus omnium primam indicat. i. de præcog. ex puls.

2 In febribus considerandę syncope, id est, defectus animi & exolutio, quæ duo nomina de unica re dicuntur, cuius plures sunt causæ. Si quidem non solum per uarios affectus corporis, sed etiam uehementissimis animi perturbationibus exoluti quidam fuerunt præcipueq; senes & natura imbecilli Etenim complures eorum tristiati, aut lærati, aut irati animo defecerunt, & qui robustiores erant, ex immodicis uacuationibus,

bus, aut abscessu rupto & materia ad uentriculum, uel ipsius os defluxa, ex dolorum uehementia, ex neruo percusso, & musculi capite, & maligno in articulis ulcere, immoderata quadam caliditate, uel frigiditate. Inflammatio præcipua cuiusdem partis, & multis alijs idē pariuntur. 1. ad Glauconem.

3 Accidit nonnullis colliquatio ex angore & tristitia, itemq; intemperies ex nimio desiderio nimioq; amore, & summa habendi dominandiq; cupiditate. Cuius rei causa est, quod sic affectionis nulla fiat concoctio, neq; in uentriculo, neq; in uenis assidue ista animorum contensione præpeditis. 3. in Hipp. de humorib.

4 Cur robustiora sint dextræ partes, sinistris causa, hepar in dextro latere situm, & inclinatio cordis ad sinistrum latus minor, quam ad dextrum. Nam si paulò magis ad illud declinet fieret sinistrum robustius maxime his accedente hepatis uirtute & magnitudine cōmoda. 6. in 7. Epid.

I

5 Om.

5 Omnis doloris causa (qui solis sensibilibus partibus contingit) est aut continuitatis diuortium & solutio, aut aliqua alteratio non sensim, sed confertim & uiolenter facta. Nā quæ sensim fit motio nulla generat morbum. Ipsam autem continui solutionem necesse esse uel ruptionem quæ ex distensione, uel contusione, quæ ex grauantē aliquo, uel erosionem, quæ ex mordēte prouenit qualitate. 1 2. Methodi.

6 Signitur omnis phlegmonē, uel ob confluxū sanguinis copiosioris si quā pars postulet: quo tumore obfessa particula auctior, quā pro naturali habitu calidior, & rubicundior redditur, tenditurq; ac tangenti renititur, cū dolore ac pulsatione sensibili. 1 3. Methodi.

7 Superuacanea quę expelluntur à ualentioribus partibus, ea semper in imbecilliores procumbunt. Vnde accidit ut glandulosa corpora, cū sint omnium imbecillima, facile fluxiones illas recipiant, tumoribusq; præter

præternaturam (quos bubones uocant) celerrime corripiantur: tum alias, tum uel maximè ubi propter magnam arteriam, aut uenam fuerit ulcus aliquod ortum. Ibid.

Moyſes de cauſis Syncopes.

Galenus in syncopes curatione, nec cauſas diſtinguit, nec omnes diuidit, ut Methodi ratio poſtulat, & ſicuti idem in alijs facit, febres enim per genera diſtinxit, deinde ſingularum cauſas aſſignat. At ſyncopæ cauſas neq; ſpecie diſcreuit, neq; definiuit, ſed tamen ex hac & ex illa eſſe cauſa dixit, quòd in eo authore proſectò mirum eſt. Poſtea tamen ubi ſententiam expoſuit, quatuor eſſe eiùs cauſas colligit, quibus etiam ſi uidetur (inquit) addes intemperie membrorum Miror ſanè hoc loco cur non omnes certo numero comprehendat ut alibi paſſim ſolet, ſed ad me reuertat. Illius loci difficile eſt proſectò ſententiam conſequi, quàm tamen quam breuiſſimè potero exponam. Oportet enim medicum uniuerſas ſyn-

I 2 copes

copes causas prospectas & memo-
 riæ infixas habere, ut cum opus erit
 conuenienter curet & possit ne fiat,
 prohibere, euentumq; symptomatis
 repentini prædicere, atque annunciar-
 are. Nam quemadmodum ait Me-
 non filius Zor. Qui syncopen non
 præuidit, aut præuisam non annun-
 ciatur, profectò mortui hominis ho-
 micida est. Verùm enim est illud Me-
 nonis dictum, & qui causas synco-
 pes mouit eius euētum facile uidet,
 eiq; obistere debet quātum potest.
 Quod si tam citò prohibere nequit,
 at prædicere certè potest. Propterea
 hoc loco definire & eius species di-
 stinguere uisum est, ut pronoscatur
 quid sit illa, idq; aphorismis quinque
 faciã ex Galeni libris desumptis, qui-
 bus interdum aliquid de meo addēs
 quò dilucidior sit oratio, non repre-
 hendat.

Primus igitur erit eiusmodi, Synco-
 pe præceptus est repentinusq; uirium
 lapsus. Virtus enim corporis tempe-
 rie membrorum, spirituum, & humo-
 rum

rum omnis continetur, nec quātita-
tis solum, sed etiam qualitatis modū
postulat. Deficit uerò horum intem-
perie, ex qua syncopes tria summa
genera existunt, quæ rursus singula
quantitatis, qualitatisquē ratione in
duo diuisa, sex simul species gignūt,
si membrorum duas totidemq; hu-
morum & spirituum.

Membrorum igitur quantitatis q-
dem syncope est, eum aut diuturnita-
tem longorum morborum, aut ui ue-
hementiaq; acutorum, aut febre ar-
dente, ipsorum essentia minuitur &
undiq; resoluitur. Qualitatis uerò,
cum temperamentorum quatuor, fri-
gid. hum. sic. & calid. aliquod multū
à modo & mediocritate sua recessit.

Spirituum autem quantitatis qui-
dem syncope est eorum essentia, uel
naturæ resolutio ac imminutio, à ue-
hementiori quodam motu profecta:
ueluti gaudio, ira, tristitia, dolore, ti-
more uigilijs, &c. quæ posteriora per
se eiusmodi sunt, ut uehementer spi-
ritus conficiant, uel ab instrumento-

rum spiritualium dissolutione ac porosa laxatione, uel ab alimentorum inopia, uel denique à nimio grauioribus defluxu, quæ duo etiam ad membra & humores, sed Galenus tamen propriè spiritibus attribuit. Qualitatis uerò, cum immutantur aut ueneno corrupti, aut morfu tactuue uenenati animalis labefactati. Eadem certè in humoribus quoque est ratio.

Syncope enim eorum quantitatis è cum uel deficiunt, uel non suppeditato cibo arescunt extinguunturque uenæ cum calori naturali, aut certè nimia sui copia ipsum suffocant & obruunt calorem. Qualitatis uerò, cum à temperamento & mediocritate sua recedunt, ut cum crassiores fiunt & acriores.

Ex his ergo constat genera synopes esse sex, species uerò una & uiginti. Primi enim generis quod in membrorum quantitate situm est, tres sunt morbus chronicus, seu diuturnus, morbus acutus, & febris ardens. Secundi quod in eorundem qualitate

con.

cōstituimus, quatuor calefactio, desiccatio & eorum contraria. Tertiū quod fuit in spirituū quantitate tres, corruptio, uenenī sumptio & morsus, aut contagio uenenata. Quartū in eorūdem qualitate positi septem, instrumentorum spiritualium dissolutio, eorundem porosa laxatio, motus spirituales, dolor, uigilia, inedia & uacuatio immodica. Quinti duæ: copia humorum & eorundem inanitio. Sexti deniq; itidem duæ, humorum deprauata substantia in acriores & mordentiores, aut in crassiores lentiores, mutata. Idem Moyse.

Si uitare (inquit) syncopen uoles, in quolibet morbo, uidendum est, ut cerebrum cor & hepar, tres præcipuas corporis partes, itemq; uentriculos propter eius cum illis consensum, ab omni offensione prohibeas, nec id solum, sed etiam quantum potest, auxiliari. Id uerò facies medicamentis ipsorum naturæ, quàm maximè poterit fieri, simillimis cōquisitis atq; adhibitis, animali quidem parti, quæ

est cerebrum aromaticis & suauissimis ac flagrantissimis odoribus. Spirituali, quæ est cor, aëris iucunda & tranquilla ac serena leuitate. Naturali uerò, quæ est hepar meatuum reclusionem, purgationemque squallidarum partium, & medicamento: item abstergente & cordis sanguinem attenuante, cibisque optimum sanguinem facientibus & similibus. Ad uentriculum uerò adiumenta concoctionis admovebis, quò aptè & maturè fiat. Atque hæc si sic obseruaueris, nunquam fieri poterit ut in syncopem incidas.

8 Inanitionis corporis & lienis indurationis hæ causæ sunt, quòd hepatis imbecillitate concoctio in uenis non potest compleri, ex quo nulla ad cætera mēbra proferri possunt alimenta. Destituuntur igitur & inanitione attenuantur. Splen uerò, quia fecem sanguinis ex hepate ad sui alimoniam trahere, est natus imbecillo hepate fortius trahit, & ita indurationem incurrit. in 2. Hipp. de uentis.

9 Melancholicis corporibus, id est frigidi

frigidis & siccis inimicissima est Venus. Gignit enim in hypochondrijs, flatulantos, humores crassos, à quibus inflatum corpus uehementer affligitur. 3. in 6. Epid.

10 Attenuantur corpore quando facultas alteratrix infima est, aut uenæ & arteriæ corrupto sanguine replentur. Augentur uerò contrarijs id est, ualida uirtute alterandi, & uenis omni corrupto sanguine uacuis exstentibus. 3. in 7. Epid.

11 Dolores ex humoribus fiunt sex illis modis, plenitudine, crassitie, uiscositate, calore, frigore & mordacitate. in 1. Hipp. de humorib.

12 Ex humoribus mutantur qualitates, & uicissim ex qualitatibus humores, ut in bile cernitur. Vbi enim bilis est calidior gignitur iracundia, & ex iracundia rursus biliosi humores. 3. de humorib.

13 Prurigo seu ulcero sus affectus ex succis mordacibus & acriter pungentibus gignitur in partibus carnis exterioribus. Estq; motus propè si-

I 5

milis

milis titillationi alarū, uel pedis plantarum. 3. de ratione uictus.

Addit Moyses.

Mordaces tenuesq; succi per carnem & cæteras partes sensibiles effusi unum ex quatuor illis, quæ Galenus recensuit lib. de Plenitudine gignunt, id est, pruritum, ulcerosum sensum, horrorem aut rigorem. Nos huius Aphorismi etiā suprā meminim⁹ in significationibus morborum. Hic autem, de quo agitur tum opinio efficitur, cū humor mordax non est tenuis, nec pars omninō sensibilis, sed crassiusculus & in partem nō primō sentientem cadit, ut hoc tantū ab ulceroso illo differat. In summa, is est rigor quo partes uehementer quatiuntur de quo & similibus affectibus idem Gal. lib. de Symptomatum causis, sic ait. Vt prædictorum symptomatum causas accuratiū exponam, exigua quidem est tenuis, salsa & immota in Pruritu. Exigua tenuis erodens, immotaq; in lassitudine ulcerosa multa, salsa, crassa & immota in lepra

praeflorat. Pauca tenuis mordax ac breuem motum possidens in horrore. Vehementem autem & mordacior in rigore, & 2. de locis aff. ulcero sum dolorem seu pungentem non ad cutem solum, sed imas quoque partes, ut ossa extendi.

14 Rigor non solum ex atra aut flauabile (ut in tertianis & quartanis) sed ex pituita ultra modum frigida, quam uitream appellauit Praxagoras, fieri consuevit, idque in mulieribus magis, & qui in ocio uitam agunt, qui rigor tamen uehemens non est, & quiescentibus: nulloque modo mortis corporibus ipse etiam conquiescit. Huiusmodi affectui attenuantia adhibeo, Principio quidem medicamentum diatrion pipereum propinato, subinde uero nostro ex calamintha, deinde & ex succo cyrenaico composito, quod quartanae exacerbationibus maxime confert. Gal. de Rigore.

15 Sanguis niger crassus & multus, tribus praecipue de causis fieri solet, quae nonnunquam coeunt, saepius uero

uerò solæ accidunt. Prima est hepatis affectio, huiusmodi gignendo parata: altera ciborum crassi succi usus, id est, esus & potus. Tertia uerò splenis imbecillitas qua ex hepate uitiosiore succum ad se trahere non potest, effunditque sinit per omnes reliquas corporis partes. 2. ad Glauconem.

16 Humores uitiosi credendi uim habentes, aut medicamenta abstergentia, plus æquo ualentia, si carni accidunt ulcera, seu uulnera gignunt. Sin autem ossi fracturas & cariem. Galen. de causis morb.

17 Nonnullos uidimus ob frigidiora alimenta morbo attonito, aut epileptico correptos, aut alio quodam refrigeratos, id quod ex ebrietate, uel maxime accidere solet. Quanquam cum modice haustum, cum familiare alimētum sit, mirum calorem auget. In uniuersum autem omnes cibi optimi, qui animali plurimum nutrimenti adferunt, si supra modum sumantur frigidos morbos generant, sicuti & cæ-

& cætera, quæ natura sunt refrigera-
toria, cum similiter ingeruntur. Ibid.

18 Omne delirium deprauatum
est principis facultatis motus à pra-
uis succis, aut cerebri intemperie p-
fectus, qui Phrenitis dicitur si febris
adsit, si absq; febre, mania. Solæ autē
melancholicæ alienationes à frigidi-
ori succo produci solent. Nam Phre-
nitis non simpliciter ob calidos suc-
cos accidit, sed tum solum, cum phle-
gmonem, uel in cerebro, uel ipsius
membranis producant: & quæ deli-
ria in acutissimarum febrium uigore
oriuntur, mordacem calidumq; ua-
porem habent cerebrum occupan-
tem. Gal. 2. de sympt. causis.

19 In omnibus autem animi alie-
nationibus, si timor atq; tristitia diu
perseuerent, atram bilem in causa es-
se indicium est. Quod uerò rationali
animæ timorem inducat, nil mirum
est: cum sit ipsa tenebris simillimus
humor, quibus in exterius rebus, nil
nos magis perterrefacit. Quod in fla-
tulentio illo morbo, quem hypochon-
dria-

driacum uocant, uidere etiam indies licet. Ibid.

20 Differunt dolores, rei quæ ipsum efficit, aut multitudine, aut crassitudine, aut potentia, siue sit humor siue spiritus flatulentus. Paucus enim plurimò, tenuis crasso, permanēs motos & quod minùs refrigerat, eò qui uehementissimam refrigerandi uim habet, minorem excitat dolorem. 2. de locis affect.

21 Inter dolorũ differentias, punctorius dolor potissimum circa membranas consistit. Membranarum autem dolores in latitudinem protenduntur, uideturq; esse æquales quòd illarum corpus existit æquale. Semper tamen ubi intenta particula sensu acutiori est prædita, ibi uehementior infestat dolor, & paulò post. Quod autem membranam, quæ ossibus adiacent, dolores profundi sint, & ueluti dolentium ossium quandã imaginem referant, non mirandum est. Ibid.

22 Vbi ingens in hepate inflammatio

inatio oritur, aut ubi ipsum est induratum dolor, qui tunc iugulum in dextra parte infestat, cauae uenae magis quam membranarum tensionem sequitur. Ibid.

23 Crassi humores, qui in cerebri substantia abundant, interdum ei uelut instrumentali nocent, scilicet cum meatus obstruuntur, interdum uero ut similari, uidelicet cum alteratur temperamentum in quo est mens, uel anima. Proinde ab Hipp. dictum. Melancholici plurimum comitiali morbo, & contra epileptici, plurimum melancholici afficiuntur. Atque horum utrumlibet magis accidit, prout in hanc uel illam partem infirmitas cepit. Si enim in corpus ipsum, id est, si meatus obstruuntur epileptici. Si uero in mentem temperamentum melancholici. Cum autem non solum ab atra bile, sed a pituita etiam morbus comitialis oriatur, sciendum est solū eum qui ab atra bile ducit originem, in melancholiam transire posse. 3. de locis affectis, cum uidelicet crassi-

ORCO4

or copiosiorquē euaserit.

24 Durities accidit arteriarum tun-
nicis, aut congelationem, aut ob ten-
sionem, aut siccitatem congelationē
uehementes algores efficiunt: tensio-
nem inflammationes & duri tumo-
res, itemq; neruorum dispositio in-
flammationibus correspondens. Sic-
citatem uerō euacuationes diutur-
næ, & longi temporis fauces, & diu-
turnæ febres ardētis. In uniuersumq;
omnes affectiones solidas particu-
las uehementer exiccantes ut hec-
ticæ febres, &c. i. de dominis februm.

25 Qualis est in uentriculo expul-
tricis facultatis per uomitum actio,
talis est per tusses in pectore & pul-
mone, ad quas referuntur etiā ster-
nutamenta, quæ humores, qui in ar-
teria contumaciter hærent, & qui dif-
ficulter expectorantur magis quàm
tusses euellunt, utpote ualidiore spi-
ritus impetum habentia, quæ non so-
lū ob ea, quæ asperis arteriis, sed quæ
naribus molesta sunt, & præoribus
uentriculis cerebri sortiuntur. Maxi-
mum

num autem præsidium adferunt capiti repleto uaporibus, nisi ob destillationem accidant. 2. de symptom. causis.

26 Quod neruus quidem ad radicem dentis substratus aliquando doleat, imponat autem nobis ut credamus ipsum dentem dolore, rationi consentaneum est. Dente enim exempto remanet adhuc exigua portio doloris, qui ob nerui inflammationem contingit. Grauior siquidem erat antequam ob uiciniam duri dentis à quo tendebantur. Eo uero amoto liberius nunc perspirat & est leuior. 5. de cõp. med. secundum loca.

27 Forantur dentes ab humorum acrimia & erodentium influxu, sicut & cutis exuberatur, sed ossa rarius, & ægrius ob duritiem, quam cutis ipsa patiuntur.

Liuidi autem redduntur uitiis fori etiam influxu, unde similem curationem recipiunt. Vtrisque enim resiccatio uitiati humoris influentis medetur. Qui si paucus fuerit per localia

K

exie-

exiccantiaq; auxilia absumetur, si multus, uniuersi capitis procuratio habenda est. Exiccantia autem mediocriter intelligo non ut quidam uehemēter, qui uitis siccatione curandis, non nisi uehemētissima quæq; adhiberi uolunt. Ibid.

28 Neruosis partibus inflammatis prōptius, quā reliquis delirium superuenire solet, idēq; ascendente ad caput per continuas partes solo calore, interdum spiritu uaporofo, uel fumoso, uel fuliginoso. 3. de locis aff.

29 Tremor imbecillitate facultatis, quæ uehit atq; mouet corpus afficitur. Etenim animalium partes graues cum sint, deorsum quæ ferri natæ, ex se moueri nequeunt, sed facultas primū musculis per neruos delata, quasi uehiculum atq; ala, motus ipsarum est, quæ facultas si deficit omnino partes omni motu priuatæ, instar aut expilatæ ex aëre, concidunt. Sin exigua & debilis tamen fluat, ut corporis pondus uehere & librare, pro magnitudine nequeat, partē sic affectam

Etiam cum tremore dehiscere est ne-
cesse. Siquidem motus coacti uiolen-
tiꝝ qui vires debilium superant, fiūt
sanē tremuli ut constat in onera ge-
stantibus, & in timore correptis. Ti-
mor quippe facultatis robur nihilo-
minus (quā onus imminuitur po-
test) & in senibus, qui imbecillitatis
causa tremuli uadūt, & in quibus ob
ægritudinem lōgiorem, robur facul-
tatis minutum est. Galen. de tremore
palp. &c.

30 Spasmus seu neruorum cōuul-
sio ob inanitionem, uel plenitudinē
fieri solet, teste Hipp. Ex inanitione
& ariditate quidem si conuulsio sit,
uel à labore, uel à uigilijs, uel fame,
uel solitudine, uel arida æstuantīꝝ
febre, qualem est uidere in phreniti-
cis. Ex plenitudine uerò si tumulen-
to cuiuspiam & omninò pleno accidat.
Sic enim epilepsia est conuulsio non
ex ariditate, sed repletionē crassi hu-
moris uiscidiꝝ spiritus, meatum in
cerebri uentriculis obstruentis, ner-
uorum principio sese quatiente, quō
K 2 expel-

expellat à se id quod infestat. Nec perpetua ea est (ut in opisthotono, uel emprosthotono, uel tetauo contingit, id est, conuulsione partium anteriorum, uel posteriorum, uel utrumque) sed temporis interuallo accidit.
3. de locis affect.

3 1 Tremorem efficit etiam humorum copia solidis pertibus conclusorum, qui cum exire nitantur nec liber sit exitus ob massam corporum solidiorum, concutiunt ipsa ui, firèq; motus tremulus. Huius autem curatio ut ipsa causa, est simplex, nempe castoreum potum, uel superpositum. Calfacit enim hoc & desiccat precipue hanc ægritudinem, ex his uero constat frigidam esse tremoris causam. Galen de rig. trem. palp.

3 2 Non solum mordax causa, sed ea uehementer mota requiritur, si rigor fieri debeat, atq; hoc tam calidæ, quam frigidæ causæ est, commune quod utraq; corpus cum dolore commoueant. Idcirco per tertianas quartanasq; febres, quamuis à contrarijs orian-

riantur humoribus, rigor tamē inuadit. Etenim ut atrabilis est frigida, sic flaua calida existit. Mouentur autem hī, qui aut cruditate, aut malis succis repleti sunt, aut in sole æstiuo, uel balneo diu morati sunt, aut deniq; qui seipso exercuerint. Ibid.

33 In rigore flaua bilis non per uasa, sed per carnosas partes mouetur, in horrore uerò cutis tantum afficit, atq; hic idem motus est in cute, qui rigor in uniuerso corpore. Ibid. & 2. de febre. Sicut horror est minor & remissior rigore, ita rigor inualidior & frigore.

34 Tres sunt præcipuæ causæ cur in anguia, laborans inter spirandū, totum thoracem moueat ad iugulū ceruicem, & scapulas usq;. Vna est flā mea in pulmone & corde caliditas. Secunda in altero spiritalium instrumentorum, scilicet cord. & pulm. angustia. Tertia facultatis musculos mouentis imbecillitas. Quæ si simul omnes in ægro concurrant, moritur, uel certè difficillimè curatur, sin uni-

K 3

ca ui-

ca uitiata sit actio neruum solum, uel musculum læsum, idem pati contingit: idcirco peculiari opus est finitione, ut sciatur, seruabitur'ue æger, an morbo succumbet. 4. de locis affect.

35 Tussis diuturna nonnunquam ulcere in testiculis orto curata est. propter utriusque generis partium pectoris & procreationis consensum. In 2. Epid.

36 Bifariam accidere potest, ut uehementer tussiendo pauca quis expuat, nempe aut ob lentum crassum'ue humorem, aut ob impensè tenuem. Siquidem tenuis humor cū subleuatus est, inter tussendum à spiritu diuisus refluit: Lentus uerò aut omnino crassus difficulter effertur, utpote qui non tam facilè à corporib. quibus impactus est abstergi, neque à quo uis spiritu nisi à uehementi, & multo potest impelli. 4. de locis aff.

37 Qui uocem attollere cupit eū latissimè os aperire conuenit, ut amplior ingrediatur spiritus. Deinde & guttur ut altissima uox possit emit-
ti. Qui

ti. Qui igitur latissime aperire possunt, magna utuntur, qui uero minus, minori, quæ causa est uocis in mulieribus, pueris & eunuchis, acutioris. Gal. in Hipp. de somno & uigilia.

38 Vox impeditur, uitiaturque ferè ex humorum, crassorum, lentorumque copia pulmonis meatibus inherentium. 4. in 5. Epid.

39 Afficitur uentriculi uniuersa rapacitas similibus affectionibus. quibus & os illius, cæterum non perinde uehementibus. At quia cōcoctionis opus perficitur in partibus ori subditis, necessum est eas ipsas partes cum male dispositæ fuerint, cruditatis causam existere. Quippe ad propriam eius rationem pertinet tum fastidire, tum natantes cibos corrumpere. 5. de locis affect.

40 Hypochondriaci flatuosi que morbi causa est calor immoderatus uenarum mesaraicarum, earumque obstructio à crasso sanguine orta, ut ait Diocles. Videtur autem in ipso uentriculo per huiusmodi affectus inflamma

tio quædam consistere, sanguis autē in parte inflammata, contentus, & crassior esse, & atræ bili similior. quo exhalante ad cerebrum melancholica fiunt circa mentem symptomata. 3. de locis affect.

41 Pleuriticorum nonnulli iugulum dolent porrecta in hunc locum succingente costas membrana. Aliquando ad præcordia defendit dolor, præcepto ipsius sensu in septo transuerso utpote cui soli (cum radice doloris in latere consistente laborantes musculis, qui ibi sint, respirare non ausint) omne respirationis munus natura committit. Cum igitur in interioribus partibus lateris inflammatio oritur, septum transuersum imperius intentum dolet, cum uero in superius, tunc iugulum potius. 2. de locis aff.

42 Si ob frigoris uehementem intemperie cibis omnino crudus permanserit ita affecti, nec sitiunt, nec febrium, sed ciborum qualitatem percipiunt, siue ad ructum, siue ad uomitum prouocentur. Si uero calidiore intem

intemperie fuerit ut suapte natura flatum excitare possint uapore spiritu-
que uentriculum replent. 3. de sym-
ptom. causis.

43 In retentrice potētia triplex om-
nino reperitur symptoma, nam aut
nihil complectitur, uel retinet omni-
no, aut debiliter, aut deprauatē. Cū
nihil, uel debiliter tum inflationes, &
fluctuationes fiunt contra fit ubi cō-
plectitur. Ibid.

44 Quibus hepar imbecille est co-
lore sunt subpallido ob nimiam ipsi-
us sanguinis copiam effusam. At qui-
bus sple ipse est debilis, sunt potius
sub fusco, nimirum id causante melā-
cholico sanguine cum bono per cor-
pus diffuso. in 2. Epid.

45 Qui dyspnoa morbo affecti sūt,
inexplebili siti uexantur, cuius causa
est uentriculus, aut calida, aut sicca,
aut utraq; intemperie laborans, ma-
ximē uerō os ipsius, proximē uentri-
culo hepar, sed maximē pars eius
sima, simul inflāmatis mēstricis ue-
nis, & ieiuno, & uentriculo atq; cum

K 5 gula

gula pulmone, quarum partium incensum marcor ut plurimum committatur. 6. de locis aff.

46 Somnus humectat, uigiliæ exiccant. Ille uerò ex se, etsi neq; calfaciat, neq; refrigeret, tñ si calfactio prius ex frigidis humoribus corpori recidat, refrigerat, calorem tum febrilem illum, tum naturalem humectās. Sin biliosi illi sint humores, tum eos ui sua profundit, fuggillat ac minuit, unde etiam refrigerari corpus contingit. 4. in 6. Epid.

47 Primæ morborum causæ cum in corpora excrementis uacua incidunt, neq; hominem torquent, neq; diu persistunt, sed si in excrementosa, & uitiosis suctis plena cadant, non aliter sæuiunt, quàm flamma in siccissima ligna, oleoq; perfusa, aut quàm lychnus in sulphur uidetur. 6. in 6. Epid.

48 Pruritus fit ex humoribus acris, amaris, salis, erodentibus ac uasa foecantibus. Ibid.

49 Non mirum esse debet, si imbecilles

cilles fiant, qui nimia uenere utantur. Siquidem eorum uacuantur spiritus & humores ex titillatione, & uoluptate, quæ ut maxima est, ita spiritus plurimum exhaurit ac extinguunt. Id uerò uidere est in compluribus, qui in eo actu nimia delectatione capiti subito intereant Gal. de semine.

50 Expulsionis excrementorum impeditæ triplices causæ inueniuntur. Vna cum partes, quæ excrementa purgant sunt imbecillæ: altera uiarum angustia. Tertia excrementi malitia, imbecillitatum intemperies parit, angustiam obturatio, uel aliquis instrumentorum tumor: Tumor humorum affluxus: obturatione crassitudo & lentor humorum ac multitudo, quæ est eorundem malitia. 3. de sympt. causis.

51 Tunc immedicè mouet expellendi uis, ubi retentrix potentia grauat, uel ob excrementorum multitudinem, uel acrimoniam, uel ob propriam imbecillitatem. Tunc siquidē necesse est, ut cum eo quod redundat,

dat, simul etiam id quod utile est excrematur, ut in Lienteria, Dysenteria & cholera fieri contingit. Ibid.

52 Quæ uomitu excernuntur, eo excernuntur quia mole sua & quantitate uentriculum grauant, ut cum plurimum cibi est ingestum, interdum quod sua mordacitate contristent, ut si nutrimentum assumptum, uel acidum, uel nidorosum, uel amarum, uel acre ob uitium concoctionis euaserit. quod genere continentur etiam biliosa, & pituitosa, & serosa excrementa, uel inibi nata, uel ex uniuerso corpore eo confluxa. Ibid.

53 Refrigeratio exteriorum partium uentrem constringere, quemadmodum contra interiorum soluere & laxare easdem solet, ex quo plurimum fit hernia. 5. in 6. Epid.

54 Intestino colo repleto accidit simul uentriculum, & pungi & dolore, quod illud ex repletionem contentum, peritoneum quoque quod utrumque instrumentum complectitur & ambit, dolore pressum angat, & simul muscu-

musculum utriq; subtēsum, à quo potissimum illi dolor tensius accidit. in lib. de clysmis.

55 Qui renum morbo laborāt, sæpe pedum quoq; & dolorem, & stuporem sentiunt, propter partium consensum, quæ uenis duabus spinę dorsii innitentibus coniunguntur. Vena caua & magna arteria. i. in 6. Epid.

56 Exasperantur læuia, & læuigantur aspera (nam hæc ad formam uitiatam pertinent) Illa quidem ob acres humores, aut medicamina abstergētia, hæc uerò ob pinguitudinem succi uiscositatem uē. Cæterorum formæ uitiorum causę sunt, in utero quidem aut maxima materiæ colluies, aut qualitas incommoda ex impedito seminis motu. Extra uterum uerò, dum infans ab obstetricibus non recte excipitur (facile enim peruertuntur cum adhuc sint fluxiles & molles) aut ruditer inuoluuntur fasciis, aut lac tabefactum sugunt, aut inepta uictus ratione, aut intempestiuis exercitijs exercentur. Postquàm adoleuerunt

leuerunt etiam deformantur sæpe ob immodicam repletionem ut in elephantiasi, aut alimenti inopiam ut in tabe cernitur, aut ob resolutionē neruorum distensionem, inflammationem, scirrhum. Cavitatesq; in ijs pereunt ob constipationem, aut obstructionem, aut confractionem, aut in sese concidentiam, quæ ab immoderato motu retentricis facultatis rursus efficiuntur. Gal. de morb. causis.

57 Si humor albugineus seipso crassior sit redditus exactam cernendi aciem, multò obtusiorē reddit. Quòd si plurimum aucta sit crassitudo, uisum omninò prohibebit. At si non tantum foramen à contento ibi crasso corpore obtenebretur, sed relinquatur eius aliqua particula pura, uidere res externas nihilominus, q̃ anteà licebit, sed singulas per se solas. Item si in pupillæ centro exigua consistat suffusio, maneatq; partes, quæ in circuitu sunt puræ, quicquid sic affectionis cernitur, id ueluti fenestratum & perforatum uidetur. Vbi uerò

rd humor inter crystalloeidē, & rha-
goeidem medius proprium colorē
mutarit, siquidem ad fuscum decli-
net, arbitrabitur quis se per nebulam
uelox fumum etiam tueri. Sin alio
quouis colore inficiatur, huius quo-
que imaginem ea, quę spectantur, re-
ferant. Præterea si uapores à uentri-
culo sursum ferantur, acutissima e-
tiam uisus symptomata suffusioni si-
milis infestabunt. Sic spiritus ani-
malis copia, aut inopia uisum acutū,
aut debilem facit. 1. de sympt. causis.

58 Deprauata saporum dignotio,
ubi lingua alieno quopiam humore
fuerit imbuta euenire consueuit. Nā
quemadmodum per suffusiones, ui-
soria illa facultas foris uidetur cerne-
re, quę in oculo apparent: ita & gu-
standi uis internam linguę affectio-
nem rebus sensibilibus tribuit: quem-
admodum etiam aures ubi sonū per-
cipiunt nulla re extrinsecus obstre-
pente, sed ipsa circa membranas mo-
tione, phantasmata transmittente. I-
bidem.

59 Cur

59 Curtitillatione alarum, uel uolæ manum, uel plantæ pedum aut aspectu, uel auditu rerum ridiculorū ac facetarū moueatur homini risus, nulla reddi ratio certa potest. in lib. de Motibus necessarijs.

Addit Moyses.

Verū illud Galeni est. Siquidem risus homini speciei est proprium ac propriorum cuiuslibet speciei nulla certa ratio potest inueniri. Non igitur de ijs rebus magnopere esse solliciti debuerimus.

60 Animal à planta non differt nisi gradibus quinque nature, qui sunt sensus. Tact. uis. aud. Olf. & Gustus. De uisu autem, an in talpa perfectus sit nec ne cum formam habeat adhuc incertum est. 3. de semine.

61 Mirandum non est si ob oris uentriculi affectus animalia maximis, ijsdemq; uehementissimis affectibus affligantur: cum nimirū pars illa per nervos quidem cerebro, per arterias cordi sibi uicino suas offensiones communicet. Vnde & Cardilagiae

algia, quæ osculum uentriculi infe-
stat, à mordacibus ibi succis orta. i.
de sympt. causis.

DE CURANDIS MOR-

bis communi ratione.

Sectio VII.

i.



Orpora à malis humori-
bus tenuibusq; affecta,
multo cibo nutrienda
sunt, contraria uerò con-
trarijs sunt curanda. Si-

militer imbecilla, si sint nutriēda, nec
modus certus sciri possit conueni-
ens, tutius est pauciore, quàm mul-
to nutrire. Addere enim tutò licet si
deest, minuere sine periculo non li-
cet, si abundat. In 2. de morb. acut.

2 Concoctionem ac digestionem
humorum adiuuant præcipue, quæ
mediocriter califacere possunt: cuius-
modi nonnulla ciborum sunt gene-
ra, nonnulla etiam potionum, empla-
storum, catapotiorum, frictionū, bal-
neorum, &c. 2. in 1. Epid.

L

3 Hu

3 Humoris crudi duo sunt genera, unus serosior tenuiorque cernitur, alter crassior ac viscosior. Illum uacuum are antequam calore calefiat febris, conuenit, & ante quam acrior erosiorque euadat. Hunc uero ante quam liquefcat. in 1. de humorib.

4 Tria sunt tempora ægritudinis: Principium, augmentum & finis, quibus si tres morbos patiaturs æger, & ultimò moriatur, causa in eo solo & non in præoribus quærenda uenit. Gal. de temporib. morb. ubi habet.

Vno enim eodemque tempore duobus tribusue morbis homo infestari potest, quorum alius iam inclinet, alius principij tempus adhuc, uel augmenti præmordia occupet, tertius plurimum auctus sit. Deinde moritur homo non propter inclinantem, uel nunc incipientem, sed ob uehementer auctum.

5 Principio curationis tria facultatum corpus nostrum regentium principia summè considerabis, quo nam statu sint prædita, dico autem cerebrum

brum, cor, & hepar. Deinde alias particulas ex principijs ortas, nervos, uenas, arterias. Sic enim siue unus siue plures sint morbi, inuenies. Ibid.

6 Cuiuslibet morbi propria tempora ad præsidiolorum inuentionem sunt, necessaria inspicienda. Etenim circa initium & fines omnia leuiora sunt, & imbecilliora, in uigore fortiora, quæ intercedunt medio consistunt ordine. Sic in uigore mitigantibus, utendū in principio & fine uehementioribus, & morbo omninò contrarijs. Ibid.

7 Omnis in curando scopus sit, ut uirtutē iam ex longa agitatione morbi infirmatam, non magis minimas, aut lædas, quod in uictus ratione precipuè consistit. Quanquam illud quidem difficile & simul utrunq; seruare, ut morbo obsistas, ut uim conseruas. Est enim morbo coquendo idonea sic uictus ratio, uirtuti quoq; infirmandæ aptior erit, unde plus periculi, quam utilitatis accidit. Sin uirtuti iuuandę accommodabitur aliud periculum.

culum adfert morbi producēdi. Sed ubi hæc ita fuerint, obseruanda primum, quæ maximè sint necessaria. i. ad Glauco.

8 Generosi medici est munus futurum statum præcognoscere, & omnem uictus rationem ad ipsum instituire: quem si tamen nondum præderit, initio morbi non uerebitur uictum præscribere, cum nisi sustentauerit ægrum, in maximum eum adducturus sit periculum. i. de Crisib.

9 Aegritudo ex humorum putredorum corruptione, simul & uirtutum imbecillitate, uix unquam aut certè difficillimè & longo tempore curari potest. Prudens tamen medicus si accedat, non statim adhibitis medicamentis uacuabit, sed uirtutē ægri refoecillabit paulatim dū uigescat, ita. n. non nocebit euacuatio aut certè minimè. Tū uacuatione factam commodè ac curationem accedet. ii. Methodi.

10 Cū ars ipsa medica tota sit magna, non leuissima eius pars est scientia ordinandi uictus, quæ utique est

his

is maximè remedijs constituitur, ci-
o, potionè, sorbitione, perfusione,
ataplasmatis & clysterib. Ibid.

11 Cauendum medico est impris-
nis ne humores crassos ac uiscosos
medicamentis liquefacientibus de-
inuat aut resoluat. Nam ex huiusmo-
li liquefactis humoribus oriuntur
vapores, quidam fumosi, qui postea
uix possint resolui, nec discuti: Ac si
unicas intestinorum utraq; subeant
magis etiam sunt permitiosi. Propte-
rea his medicamentis discutientibus
& attenuantibus mediocriterq; cali-
dis curari oportet sanguine prius e-
misso, & uentre soluto aut uomitu,
aut balneis, aut frictionibus, aut in-
unctionibus calidis abstergentibus,
aut cibi deniq; abstinentia euacuato
corpore, ita ut res maximè quidq; ho-
rum postulabit. ultimò Methodi.

12 Vbi putridus humor corrupti-
one sæuire cœpit, antequam uires defi-
ciant, aut incalescentis calor ad par-
tes solidas præcipuasq; deuenierit, eu-
acuacione occurrendū erit. in 1. A-
phorif. L 3 13 Cor-

13 Corpora enim ualentia quamlibet subito perperatam uacuationē sustinere possunt. Imbecillium uerò, habenda est uirtutis ratio, ut si adhuc ferant uires, purgentur leuiter ac moderatè. Sin iam defecerint, cohibeatur statim, uacuatio etiam si superflui superfuerit aliquid. Ibid.

14 Morborum concoctio est humorum corruptorum ad integrorū naturam mutatio, quæ à solidis partibus si sint integræ efficit, si uerò sint lasæ, in dubio æger est donec illis uires restituantur. 2. in 1. Epid.

15 Humores in profundo herentes, elicere extra oportet, & qui in posterioribus sunt ad anteriores reuellerè, qui uerò ad dextrum procumbunt ad sinistrum, sicq; generaliter in contrarias partes reuulsionē utendum. in 1. de humorib.

16 Humores purgari tēpore paroxysmi per superiora conuenit, uomitu, aut narium effluxu conuenit. Extra paroxysmum uerò dum quietus est æger p inferiora, lotio egestionē, &c. Ibid.

17 Qui

17 Quidiuturnis morbis laborāt,
ueluti podagra, asthmate, epilepsia,
tumoribus lienis, & hepatis, &c. op-
tima illis uictus, id est, attenuans ra-
tio pro optimo est remedio. Multos
enim hac ratione & sola sanatos uidi-
mus. Ea autem cōsistunt omninō in
ciborum boni succi usu, uenæq; se-
ctione pro consuetudine repetita, ac
cōtrariorum abstinētia peponum,
cucurbitarum & huiusmodi uitiosi
succī ciborum. Gal. de atten. uict. ra-
tione.

18 Ego multos ægros post explo-
ratas eorum uires, diuturna cibi ab-
stinētia curauī solis medicamentis
concessis. Quosdam etiam ne ualidi
quidem roboris & syncope detētos
prohibitis cibis, fictione sola manu-
um, pedum, uertebrae: alijs uerō
prohibita abstinētia, datisq; cibis
succurri. in lib. de examinatione me-
dici.

19 Consuetudinem sanitate con-
ducere, in ario peripatetico uisum est
cū is natura gracilis & os uentricu-

L 4

lifrige

li frigidissimū natura sortitus, ita ut
 uel ex leuissima refrigeratione sin-
 gultu statim corripetur, ob idq̄ nū-
 quam antē ausus fuisset aquam gu-
 stare, tandem febris occupatus, à Me-
 dicisq̄ præter consuetudinem co-
 ctus potu frigidaē uti, subitò fuit qui-
 dem exanimatus. Alijs uerò nisi au-
 dacter potus is, contrā propine-
 tur, in periculum ueniunt, ne subi-
 tò extinguantur. Sunt enim quibus-
 dam aliqua peculiaria ex natura, quæ
 aliud alimentum corpori accommo-
 datum habēt. Gal. de consuetud.

20 Minimè à paruis incipiendum
 est auxilijs ubi maximum impendit
 periculum, ut in peripneumoniacis, at
 in leuioribus, licet quidem experiri
 remedia. 5. Methodi.

21 Conualescētiū uictus ratio,
 media inter ea constitui debet, quæ
 sanorum propria est, & quæ ægrorū.
 Domus temperata cibi proximī ijs
 quibus insueuit. Sciendum autem ui-
 gilijs uniuersum corporis habitum
 uehemēter siccare, ac proinde ijs qui
 ex

ex siccitate laborant. quod etiam reliquis est commune. 7. Methodi.

22 Modus aquæ frigide, quam sine periculo possit, qui febricitat, bibere cum maximè sitit, is esto quantum uno haustu possit capere. Sciendum autem uniuersas res frigidas cōcoctionem impedire. 1. de morb. acutis.

23 Alica facultate sua duplici, humectandi uidelicet, & abstergēdi spiritualia instrumenta purgat & uires roborat corporis, quæ facultates in nullo alio similiter reperiuntur. Propterea si æger hanc respuat, nil ei cōmodius dari potest, quàm saxatiles pisces ex aqua, anethe, oleo, sale & porri modico mediocriter temperati & cocti. Quod si non reperiant huiusmodi semper ijs proximi dabunt. Idq̃ antè cibum ex syrupis quibusdā acrioribus si modo corpora neruosa non sint laxa. Ibid.

24 Oxymeli quod ad meatuū absterisionem præparationemq̃ propriatur. Duabus antè horis quàm alica

L 5 præbea

præbeatur sumi oportet. Nam si simul sumantur, ex eorum dissidente qualitate motus fit in uentriculo inæqualis. 3. de morb. acut.

25 Qui opere multo defatigati a-
quam plurimam hauriunt, ac rursus
post cibum ad idem exercitium rede-
unt. Duplicem inde nanciscuntur in-
iuriam, ab exercitio quidem intem-
pestiuo cruditatem, à labore uerò ni-
mio biliosorum humorum repletio-
nem. 3. in 1. Epid.

26 Somnus ei qui humoribus fri-
gidis est plenus periculosus, si febris
paroxismo, aut in abscessu uentris ac-
cidat ob calorem, qui interiorē par-
tes cū sanguine subit continuo. At
cui humores crudi & pauci uirisq̃
imbecillæ fuerint, magis prodest. 1.
de humorib. & in 6. Epid. Somnus
quem abscessus initio febris sequit̃,
febrim ipsam auget.

27 Ira & tristitia morbi sunt animi
quorum altero, nempe ira calor na-
turalis diffunditur & dilatatur, atque
inde fit cholera uulgò dicta, altero ue-
rò re-

ro restringitur, ex quo phlegmata & frigidi humores oriuntur, quos si curare uelis, eum ipsum calorem motibus interius & exterius, id est, animi & corporis, ira & exultatione excitare: oportet quò sese attollant ac extra diffundantur, & sic euacuentur. 1. de humorib.

28 Cogitatione rerum iucundarū quemadmodū auditus, & aspectus animum latè diffundit & delibutum gaudio reddit, caloremq; naturalem seruat. Augit uerò contrarium. 2. de humorib.

29 Somnus omnibus ægritudinibus siccus ob humectationem conuenit, sed maximè hīs, quæ uentris siccitate & humorum arefactione accidunt. de Somno & uigilia.

30 Vinum aqua frigida temperatum curat eas, quæ ex magnis fiunt euacuationibus dissolutiones, ac tūc præsertim quando humores fluunt ad uentriculum. At si aliquod uiscus sit inflammatū, aut caput doleat uehementiūs, aut aliqua animi alienatio ada-

tio adfuerit, aut febris ardens in morbo crudo: magna & penè insanabilia ex potu uini huiuscemodi affectibus nocumenta proueniunt. 1. ad Glauc.

3 1 Si cum magno dolore fluxio ad genu feratur, sufficit uehementiā doloris lenire, cū aliquo ex ijs, quæ ex uino dulci, oleo rosaceo, & pauca cera in utroq; liquata cōstant. Oportet autem hæc lanis excipere pinguibus, quæ plurimum habeant œlypi, & æstate quidem frigida, hyeme autem tepida apponere. Sic etiam cataplasmata ex arnoglossō, lente, pane, & rosaceo oleo adhibere: paulò uerò supra patientes particulas admouere spongiam uino austero intinctam aut aqua frigida, cui mistum parum acetī fuerit. 2. ad Glauc.

3 2 Si plures affectus in unum coeant ad eū, qui magis urget dirigi, primum curantis consilium debet, ubi aliud efficiens, aliud quod efficitur ab eo ipsa causa spectanda. Sin autē curari hoc ante illud non licet ad id quod ordo dictat est respiciendum.
ut si

ut si in uentriculum defluat ex cerebro frigidus humor, qui ipsius uentriculi intemperiem causetur, aut uitioli succi in medijs similarium particularum spacijs occupationem, aut mordicationis sensum, ac pinde deliquium, sudores syncopes dissolutiones, &c. Primum erit occurrendum ei, quod uires dissoluit, ubi autem firmatae erunt, ad fluxionis causam conuertimus. Nullum enim affectum sanari posse manente ea, unde ortus est causa. 7. Methodi.

33 Hoc semper curatis animo habeat non omnem naturam eadem remedia, requirere, sed infirmiores mollioresque mitiora, ualidiores siccioresque ualentiora. Quare natura aegri uenit in primis consideranda. 3. Methodi.

34 Qui a solo spiritu flatuoso cruciantur, illico tum cucurbitula admoda, a dolore liberi, tum omnino sani redduntur in quacunque corporis parte dolor sit excitatus. Quibus uero non spiritus solum flatuosus, sed humor

mor aliquis unde is oritur, uētris dōd
lorem excitat ijs ad tempus illico do
lor sedatur, sed redit tamen sequente
nocte, aut postridie, aut tertio die.

Quare in his doloris accessio est cu
randa cucurbitula. Postea uerò ua
cuandus humor, infuso per sedem a
liquo calfaciente simul & attenuan
te medicamento, (ego oleo rutaceo,
id est, in quo ruta incocta sit uti so
leo) quo iniecto nōnulli uitreum hu
morem efficiunt, & ex hoc protinus
ab affectu simul & dolore liberantur

12. Methodi.

35 Cūm à locis circa stomachum,
aut alium, aut aliquod intestinū san
guis educitur medicamentorum ca
lidorum, & tenuium partium mixtu
ra non est opus, sicuti est ubi ex pul
mone, aut arteria, aut larynge reiecta
tur sanguis, quanquam intestissimū
his est illud, quod in tantum refrige
rat, ut affectuum stupefaciat, quæ ta
men miscantur medicamentis sangui
nem reiectantibus congruis, quum
altiore concilient & commodissi

ma

ma sint, n̄s qui tussi lancinantur, sistē
tia nimirum sanguinem, qui ad uas
affectum deferitur, idq̃ per suam fri-
giditatem. 7. de comp. med. secun-
dum loca.

36 Optimus compositionis medi-
camen. scopus tria sibi proponit, ni-
mirum ut & sensus stupefaciat, & nul-
lum in posterum circa particulā de-
trimentum remaneat, & ut affectio
ipsa amplius inde iuuetur. Ad hæc o-
mnia respiciens Philo antidotum ad
omnes graues dolores uulcerum ali-
aq̃ multa conuenientem composui-
sse uidetur, ex croci drach. 5. Pyre-
thri euphorbi, spicēnardi, sing. drac.
1. Piperis albi ex hyoscyami drach.
20. Opī drach. 10. Melle attico exci-
piendum, ex Opī quidem hyoscy-
amiq̃ mistura saporem sentitricisq̃
facultatis stuporem inducere uolēs,
reliqua calfacientia ad celerem distri-
butionem & partium generationē.
9. de compos. medic. secundū loca.

37 Quando symptomata cum fe-
bre grauiora incidunt, si ledant uires
aut

aut affectui noceant, quod solent uigilię, dolor, atq; uacuatio immodica, curandi ratione, quam ab initio instituimus, ad præsens mutata, non modo symptoma mouere ac sedare, sed uires etiā firmare, primūm cogimur, quo sublato ad prætorē causam morbi reuertimur. Nūquam autem id agamus ubi uiriū roboris fiducia est. Veluti profectō dysenterię ipsi morientibus maximē medicamētis, tum potissimum medemur, cū utiq; est grauissima. 12. Methodi.

38 Si dolor distensionis nec sanguinis missione, nec reuulsione sedat, pater profectō in ægrotante particula impactū esse quod contristat:quare & curationem ipsam per digerentia medicamina moliendā esse. Quomodo etiam curantur dolores à flatulento spiritu orti: magis tamē n̄ extenuantia medicamina desiderant. Ibid.

39 In ulceribus medicamētorum ope curādis, primūm hoc tenere medicum oportet, ut quod præter naturam

ram est, tū uacuet, tū digerat. Quod si per membri naturam aut etiam uitij rebellionem fieri non licet, ut id tum in pus uertat, tum putrefaciat. Hoc uerò secundo loco destinabit. Quippe ita in columellæ uitio facimus, primum, scilicet ad naturalem habitum reuocare tentantes, id si cōsequi non est, prorsus amputantes, idq; uel chirurgiæ opera, uel per caustica medicamenta ultimo Methodi.

40. Cū omne quod naturale est, ex commoda temperatura nascatur, utiq; id quod præter naturam existit, ex aliqua intemperie orietur. Atqui intemperies omnis morbus est: ergo liquido constabit, quatuor symptomatum differentias, quæ in corporis affectionibus consistunt, nempe uisus, ex color, ut in arcuatis, & carbunculis &c. Gustus ex deprauatis saporibus, odoratus ex respiratu, aut per spiratu graueolēte, & tactus ut si cutis quæ prius mollis, nunc dura rigidaq; sentiatur. Constabit inquam hæc à morbis communem cōtraxisse

M

se. de

se. de symptom. differentiis.

41 Humores singuli interdū sy-
ceri & puri, interdum inuicem mi-
solent in imbecilliolem partem cor-
fluere ob idq; partium tumores uari-
as. Cū enim quatuor sint faculta-
tes omnium tum animalis, tum pla-
te partium attractrix, retentrix
alteratrix & expultrix, excrementū
quē omne aut qualitate, aut quanti-
tate offendat, nec sit par robur om-
um particularum, semper quæ fort-
or est, excrementum ipsum ad imbe-
cilliolem propellit. omnium autē in-
becillissima est cutis, omnia corp. ex-
crementa recipiens. Gal. de morb-
causis.

42 Medicamina supra modum co-
lida, etiā uires ualidē afficiunt ac mi-
nuunt. Propterea discutiēdis humo-
ribus crassis ac lentis tutius est medi-
ocriter calida adhibere, siue illabibus
sint, siue potio. de sang. mis.

43 Imbecillitas partis omnino ab
intemperie nascuntur, non tamē ab
omni, sed ab excellentiori, quæ sano

pen

per contrariam est abigenda. Propterea in exulceratis partibus, si humor non uberior neque malignitate excellens fuerit, sisti tamen cōpescique medicamentis à astringentibus nequeat causam ipsam, si sit interperies, primum adiuues, non aliter planè nunc curata ipsa, quàm si incidisset citra ulcus, tum ad ulcus te conuerteres. Si uerò ab alia quauis particula, uel à toto corpore fluat uitiosus humor ad exulceratam, medendum imprimis est ipsius fluxionis radici. 4. Methodi.

44. Verùm tum reliquos mōrbos, tum phlegmonas, sicubi curas nullo euaporante auxilio prius fidēter uiteris, quàm totum corpus aut pars, quæ excrementum transmittit uacuetur, aut contrarijs qualitatibus alteretur. Si aliquam intemperatiam fortitur, quæ ipsius fluxionis existit causa. Sic enim diutinas oculorum fluxiones curamus, oculis ipsis dimissis atque ad capitis custodiam conuersi. 14. Methodi.

45. Sanè uacuamus totum corpus

M 2

etiam

etiam cum mediocritatem succorum
continet, si morbi magnitudo id su-
deat. Siquidem dolor & membri in-
flammati calor etiam si purum sit a
excrementis sic totum corpus, fluxu
nis causæ fiunt. Tunc tamen parci-
uacuare expedit, idq; habita ratione
ætatis, naturæ, anni, temporis, regio-
nis, ac deniq; consuetudinis ipsius
grotantis. 43. Methodi.

46 Si ualens aliquis morbus uir-
cum uirium robore affligat, uel si re-
duntandis sanguinis concursus non
ad sit, nemo est, qui non sanguinẽ do-
trahat, qui utiq; in artis operibus fue-
rit exercitatus. Quippe sanguinis re-
dundantia haudquaquam sanguinẽ
mittendum indicat, sed magnitudi-
morbi unà cum uirtute uegeta, exco-
ptis tamen à sermone pueris. Alij
autem etiamnum sanis, nec uehemẽ-
ter læsis, sufficit aut inædia, aut cib-
parcitas, aut soluta aluus, uel purga-
tio, uel frequentius balneum, uel ex-
ercitatio, uel multa frictio. 4. Meth.

47 Magnitudo autem morbi tri-
fariam

riam efficitur grauis' que & ualida.
 Nepe uel propter afflictæ partis præ
 antiam, ut uulnus quod in thoracē
 eritoneum' ue penetrat: uel propter
 effectus magnitudinem, ut quæ futu
 is uel ligaturis indigēt, uel quod sint
 acoëthæ, ut quæ in articulis accipi
 untur uulnera. Vbi enim tendones
 & nerui, & carne uacua osculentaq;
 unt loca, hic doloris, uigiliarū, con
 uulsionis, & delirij periculum instat.
 Ibid.

48 Fluxionem etiamnum irruentē
 post sanguinis missionem, reuellere
 ad contraria studebimus, utique si in
 superioribus consistat ulcus per in
 ferna purgantes, sin autem in inferio
 ribus, superiorem uentrem uacuan
 tes. At si iam resistit fluxio, inhæsitq;
 membro, deriuare per uicina magis
 expedit, cū & in propinquiora trans
 latio, & purganti medicamini tum
 accessus, tū attractus à uicino sit pro
 prior. Ibid. & de natura humana.

49 Vacuare, ex repletionē crasso
 rum lentorumq; humorum affectos.

M 3 aut

aut hypochondriorum distensione,
aut inflammatione cuiusdam partiū
uentriculi nullos per aluum licet, in
1. Aphorif.

Addit Moyses.

Vt in fastidio ciborum, ubi causan-
tes ipsum humores attenuatos, nec
vigere amplius affectum senseris. Si
tamen uacuationem res postulat, eti-
am, id facies adhibita cautione ne uē-
ter, uel hypochondria inflāmatione
laborent.

50 Cataplasma apponere, repleto
corpore nec uacuato nunquā oportet.
sic enim plus agra particula cor-
ruptae materiae allicitur, quā resolu-
tur. In 2. morb. acut.

51 Crudorum humorum purga-
tio, mors est, ut in inflammationibus,
quae sub aurē accidunt, quemadmo-
dum & digestorum neglecta solutio
uel uacuatio, iuxta aphorismū Hip-
pocratis. Concocta medicari, cruda
concoquere. 2. in 1. Epid.

52 Cucurbita citra scarificationē
adhibita omnino morbis prodest.
qui

huius ex uaporibus crassioribus flatu-
 rentis ac frigidis, itemque membris op-
 ilacis & succis in uase conclusis ac-
 xire nequeuntibus sunt contracti. 6.
 in 2. Epid.

53 Fluxiones ex capite ad fauces,
 uulvas, & palatum euocare per na-
 res medicamentis oportet. Si uero ad
 oculos fluant, purgare per os medi-
 camentis ad id ualentibus. 1. de hu-
 moribus.

54 Intensio uocis summa prodest
 naturali calori excitando pituitæ cras-
 sæ ac tenaci eruendæ, & meatibus a-
 periendis. Qua de causa refrigeratis
 corporibus cal fieri indigentibus com-
 moda est. Gracilibus tamen aut alio
 qui uentriculo affectis nocet huiusce
 modi exercitium, quod tenuem qui-
 dem illorum calorem in mouendo
 humori, breui consumunt, unde gra-
 uius postea ægrotant. de Somno &
 uigilia.

55 Vbi morbi existunt acuti cele-
 riterque ad statum perueniunt, etsi ual-
 de tenuem uictum exhibeas non læ-

M 4

des:

des: ubi uerò diuturniores nisi ab initio cibo uberiore reficias, hominem simul cum morbo perimes, sed oportet, tenuissimum cibum, qui in toto morbo exhibentur in statum reseruare. Eo enim accedente tenuiorem oportet exhibere quàm prius. Cæterū quantitas sit tanta ut bene coquere possint. i. ad Glau.

56 Semper oportet cōtrarias qualitates, illis quę inualuerint præter naturam, opponere, quum hoc multū plus iuuat, quàm quomodolibet uacuare. Sunt enim contraria contrarijs remedia, quę quod superfluum est remouunt, & quod deficit suppleant. Ibid.

57 Medicamētis fortiter resoluentibus semper miscenda sunt emollientia ne tumores scirrhosos degenerent.

58 Frictiones siccae dolores, certa periodo quibusdam partibus redeuntes sedant ac prohibent præcipuē si duas aut tres horas, antequam accessio nem adhibeantur. Firmantur enim ea par-

ex partes & consuetas fluxiones minus admittunt: atq; hæc omnibus ætatibus omnia existunt. 5. de sanit.

59 Intemperies calida uel frigida multò citius sanari potest quàm sicca: neq; enim hæc nisi diuturno tempore humectari potest, & si prorsus consummata sit, nullas omninò admittit curationes. Illa minimè. 1. Methodi.

60 Pernitioris siccitatis affectus extra omnē curationem positus est, cum solida similarium partium substantia humore exhausta est: ad quē affectum quò proprius accedunt corpora, eò diutius ægrotant, & ægrius curantur. 6. Methodi.

61 Gradus siccitatis sunt quatuor Consummata quidem ubi solida similarium partium cordis, hepatis, & cerebri substantia reddita est siccior. Altera cum ea quorum substantia ex humore concreto constat, sicut caro & adeps, est liquata. Tertia cum propria humiditas unde partes nutriuntur omninò est absorpta. Ea conti-

M 5 netur

netur in omnibus animalis partibus ceuros quidem per eas sparsus. Atque hanc sine nutrimento particulis inserere non est, ideoque difficillima est omnium eiusmodi affectuum curatio. Quarta quæ in proprijs cuiusque particulæ exilibus arterijs uenisque consistit, quæ & ex sanguinis penuria puenit. 7. Methodi.

62 Tempus quidem caloris frigorisque reparandi par quodammodo est, securitas tamen impar. Nam nisi cuncta quæ ei quod curatur, circumdata sunt corpora, plani ualida fuerint, metus est ne ab ijs, quæ refrigerant noxam contrahat non leuem. Ibid.

63 Vacuationes fiunt omnino uel per sanguinis missionem, uel clysteris usum, uel urinæ uias, uel eam quæ per cutim fit transpirationem, nempe sudorem, ac præterea per eam quæ fit ad partes oppositas attractionem, nempe reuulsionem atque ad alias propinquas deriuationem. Nam & ad hoc genus pertinet citare menstrua, hæmor-

hæmorrhoidesq; aperire ac denique
expurgare per palatum & nares. in
Artemed.

64 In curationibus hepatis, aliqua
ex astringentibus medicamentis sem-
per miscere oportet. Sed quoniam in
profundo admodum loco situm est,
ne astringentis medicaminis uis in
uia debilitetur, nisi aliqua altera sub-
tilium partium substantia: qualis aro-
matum est traducatur. Melius uerò
fuerit si & ipsum medicamen astring-
gens etiam aromaticum fuerit. Nam
si duas qualitates & potestates insi-
tas habeat, ualentius operabitur, ua-
cias quod præternaturam in ipsum
membrum confluxit, seruansq; hu-
morum modum naturæ conuenien-
tem. Ibid.

65 Præcipuè autem astringentib.
est utendum, ubi in iecur aut uentri-
culum superuacuū aliquid profluit:
quando & à primoribus admodum
hæ partes sunt, & ut munus suū ob-
eant, uel in ipsis morbis est necessari-
um, nam alimentum uniuerso corpo-
ri con-

ri conficiunt. Quare ciborum concoctio siue in uentriculo, siue in iecino-
re sit in prospera, febres intendit ac
succus uitio exacerbat. At uerò, nec in
colo laborante, nec intestinorū quo-
uis, nec musculis præcordiorum, nec
ipso peritoneo miscenda astringen-
tia sunt. Sed nec in uesica, nec uteri
affectibus, nisi excrementorum co-
pia sit in toto corpore. Renes autem
& pectus in media consistunt condi-
tione. 11. Methodi.

66 Polychresta siue multi usus me-
dicamenta apparantur, cū unum
habere uiginti affectionibus congru-
um malumus, quā tot numero alia-
quum tamē ad singulas affectiones
unum aliquod destinatum, eò quod
ad plures paratū est, melius existat,
& paulò pōst. Impossibile est ut inue-
niamus pharmacum unum ad affe-
ctiones multas optimum, multo quē
præstantius semper est, quod ad sin-
gulas earum cōponitur. 8. de comp.
secundū loca.

67 Cataplasmata humectantia in-
flam-

flammationibus biliosis optima, ex-
iccantia ijs, quæ ex seroso sanguine
superfluo fiunt. Temperata uerò, id
est, mediocriter calida & humida, ijs
quæ à crassis uiscosisq; excrementis.
in 2. acut. morb.

68 Diabetes certè quàm rarissimè
accidit, nec ego unquam præter duas
uidere adhuc potui. 6. de locis aff.

Addit Moyses.

Nec ego uidi in his occidentali-
bus partibus, neq; præceptorum ul-
lum uidisse audiui. In Aegypto autè
decem annis, quod ibi egimus plus
uiginti uidi, quod argumento est, eū
morbum in calidis regionibus sæpi-
us fieri, nisi forte Aegypto frequen-
tior est, ob aquas Nili saliores, qui-
bus uulgò utuntur ipsi.

69 Principium diei proportionē
temporis ueri respondet, & pars quæ
sequetur æstati: Medius autem au-
tumno, & ultima hora hyemi, quæ
causa est cur serò graues & uehemen-
tes magis urgeant. 2. de humorib.

70 Ventorum & aëris qualitarum
optima

optima est, quæ ab Oceano afflatur.
 Secunda quæ ex montibus: Tertia
 quæ à medijs locis & campestribus.
 Quarta & pessima quæ à cloacis, se-
 cessibus, paludibus & huiusmodi a-
 lijs locis humidioribus. 3. de humo-
 ribus.

71 In thoracis aliorumq; uniuer-
 sorum uiscerum inflammationibus,
 quæ in superficie apparent laxantia
 sufficiunt, intrinsecus autem sicut in
 costas succingente membrana, requi-
 runtur acriora. Quod si ipsis uisceri-
 bus medicamenta applicare posse-
 mus: tantò molliora oporteret esse,
 quantò ipsorum natura ut afficiatur
 est promptior. Quia uerò nō datur,
 ob id nimirū, quæ eduntur ac bibun-
 tur medicamēta uisceribus conferen-
 tia, multò potentiora & acriora esse
 conuenit, quæ affectui ipso medean-
 tur, ijs quæ parti ipsi affectæ conue-
 niant: exceptis tamen illis quæ uen-
 triculo stomachoq; auxiliantur. Hec
 enim sola talia exhibent, qualia affe-
 ctio postulat. 2. ad Glauc.

72 Quæ

72 Quæ facile sentiunt partes, ac-
cria medicamēta non tolerant sicuti,
neq; acres humores. Ob idq; os uen-
triculi atq; eo magis oculus infesta-
tur ab erodentibus medicamētis. At
quæ obtusum habent sensum, cata-
plasmata grauiā sustinent & morda-
cia medicamenta. Ibid.

Ex filio Zor.

73 Medicamen purgās & earum
siue apponatur corpori siue bibatur,
tepidum esse cōuenit. Astringens ue-
rò & repellens equè frigidum ac pu-
tei aqua. Digerens uerò paulò calidi-
us purgante, mitigans quoque tepi-
dum, sed in hoc se syncopen metuas,
aquam simul frigidā adhibere oport-
tebit.

Idem,

74 Quicquid (inquit) astringit
ac mordet, digestionis quoq; ac
solutionis particeps esse solet, excep-
tis myrti folijs, quæ sola ex causa acri-
or sunt, non astringunt. Reliqua ue-
rò repellendi ac retinendi uim etiam
cum acrimonia obtinent.

75 Medicamenta purgātia singu-
la inf-

la, initio familiarem humorē trahunt
 postea eum, qui sequendo aptior, at-
 que habilior fuerit, ut exēpli gratia,
 quod flava educenda est, primū in
 ipsam, deinde aquositatem, humidi-
 tatem, tertio pituitam, quarto atram
 bilem, postremo sanguinem. Gal. de
 purg. medic. facult.

74 Reperiuntur tamen aliqua,
 quæ statim ab initio sanguinem du-
 cant: sed nemo utetur quandoqui-
 dem hoc iugularæ esset hominem,
 non purgare. Siquidem purgantia
 dicuntur hoc nomine quod sangui-
 nem ab illis excrementis
 repurgent. Ibi-
 dem.

DE

DE CVRANDIS MOR-

bis particulari ratione.

SECTIO VIII.



Pilepsia quę ex crassis frigidis ac pituitosis succus accidit, curatur mutādo cuidam qualitatē in siccā. Quod fit ætatum successione, regionum mutatione: item aliorum exercitiorum, ac diætaram observatione & præterea medicamentis discutientibus adhibitis. In 2. Aphorism.

2 Secare in cubito uenā, si ex dextra mare prorumpant sanguis in brachio dextro expedit: sin ex altera in sinistra: minimē tamē usq; ad lapsum uirium trahendus. Simul autem quū agis artubus uincula inijcito, aut ex lana, aut canabe, hypochondrioq; directē supposito cucurbitulam admo- ueto: quandoquidē his remedijs semper sanguinē erumpentē compescui-

N mus,

mus, quum antea quæ inseruntur atque fronti illinuntur infirma omnia cōperiemus. Gal. de sanguinis mīss.

3 Cui cerebrum aurium fluxione purgari solitum est, si quādo ex eius suppressione oriatur, aut stupor, aut uertigo, medicamentis abstergentibus, ac discutientibus dimouere ac purgare conueniet, nam huiusmodi quidem statim sanari hoc modo uidimus. 2. in 6. Epid.

4 Hemycranicis & huiusmodi affectibus ex sanguine crasso gelidoque in interiori corpore ortis mirè prodest uini puri bonique ac tenuis potus in cibo, uel post cibum. Maxime uerò panis ipse madefactus, ex eo enim uapor quidam calidus ad partes affectas fertur, à quo ipsæ circūstantesque omnes calefiunt, aperiunturque pori, & condensati in his humores discutuntur. 2. in 6. Epid.

5 Fluxum sanguinis ē naribus si non sedat cucurbita hypochondrijs affixa, occipitio adhiberi oportet cū quibusdam medicamentis refrigerantibus.

rantibus. In 6. Epid.

6 Mucum narium crudiorē aquo-
siorēq; factum odoris cohi-
betur, uell liquoribus nari stillatis. i.
de humorib.

7 Grauedini quam *λερύνει* uocāt,
sternutatio est initio morbi ualde no-
xia ob cruditatem humorum morbu
efficientium, itemq; coitus, quod ex
motu uenereo capitis repletio auge-
atur, cum quiete & otio in ijs humo-
ribus digerendis natura multum e-
geat. Prodest autem sedatis fluxione
ad eorum resolutionem atq; euacua-
tionem. Ibid.

8 Suffusiones oculorū, ex humo-
ribus inter corneam & chrystalloei-
dem glaciei modo concretis oriunt,
& cum albugineo non solum colo-
re, sed natura etiam pugnantibus. I-
bidem.

9 Dolores capitis si sint ex humo-
ribus, qui calido temperamento in-
digeant constringentibus leniuntur
ac sedantur. Ibid.

10 Vigiliis curaturus ac prohibi-

N 2 turus

turus, pedes & manus constringito, qua hora dormire uellet æger, & agitatione perpetua caueto ne dormiat, ne ue oculos claudat. Vbi uero eum dormire uoles, solutis membris lucernaq; amota & facta quiete somno etiam alto ei indulgeto. 3. de humorib.

11 Fieri potest ut ijs, qui solent supini totas noctes dormire apoplexia contingat, huiusmodi decubitu causam dante. 6. de motib. necessarijs.

12 Medicamento confectio ex scilla post purgationem, quæ aduentante uere molienda est, utetur puer epilepticus singulis diebus antequam ad palestram accedat. Et sanè nisi ualde rebellis sit morbus spero 40. diebus, sola eius medicamenti ope solutum iri. Gal. consilio pueri Epilept.

13 Quando impediuntur sensuum actiones, nec ulla manifesta est inflammatio, intemperiem cerebri causam esse oportet, eamq; aut ipsius uentriculis, aut uenis & arterijs, aut humorib. in ipsum diffusis contineri. Quoniam

niām autem accuratē huiusmodi in-
temperies uix cognoscitur, adhibere
in ea quærenda medicinæ diligentia-
am debet priusquam medeatur. 3.
de locis aff.

14 Melancholia gignitur, aliquan-
do ex sanguine melancholico, per u-
niuersum corpus redundante, aliqua-
do in solo cerebro, aliās etiam in par-
te consensum habente. Si igitur ex
toto corpore fuerit, à uenæ sectione
ordienda curatio est. Si uerò in cere-
bro sit genita, æger tūc sanguinis de-
tractatione nō indiget, quamuis ob
aliam causam detrahi possit. Ibid.

15 In lethargia æquē ac Phreniti-
de incidenda uena est statim ab ini-
tio, si modo tam ualens uirtus sit, ut
sine noxa missionem sanguinis tole-
ret, neque officiat crudi humoris co-
pia, uel puerilis ætas, uel anni tēpus,
uel regio calidior ac siccior. Commu-
ne præterea est utiq; ut oxyrhodium
in principio ad noueas, nā repellen-
dus à capite est humor quisquis is fu-
erit. Sed in hoc sunt contraria, quod

N 3 in phre-

in phrenitide quæ cum uigilijs est, lenire eas oportet, in lethargia quæ cum immobilitate ac stupore accidit, excitare. 13. Methodi.

16 Si lethargiæ & phrenitidis malum trahat, cum ad statum propè fertur, castoreum & nonnunquam cucurbitam ad mouemus. Ibid.

17 In lethargicis nos incoquētes in aceto thymum & pulegium, & oryganum, aliâq; id genus ad mouemus, quò uapor ad cerebrum delatus crassitudinem humoris dissecat. Mox etiam postquam increuit palatum ualentibus, & acribus medicamentis ungimus. Ab his uerò, etiam sternutamētis utimur, tum ad caput similes præsidiorum facultates accommodamus, intenta semper eorū, etiā ad ipsum usq; synapi, uehementia, si diu uitium trahat. Ibid.

18 Lethargi principiū est functionis sensuum læsio, apoplexiæ uoluntariarum actionum, epilepsiæ mentis & sensuum. Detentionis uerò seu catochi, præcipuè sensuum. 2. de morb. causis.

19 Qui

19 Quibus ob potionem calidiorum uniorum caput repletum uaporibus aut humoribus calidis (qui etiā absq̃ uini potu solent ad caput attolli) dolore affligitur n̄s, uomitus si adhuc crudum in uentriculo uinum sit, hausta aqua tepida ciendus erit, sin post concoctionem doleant refrigerantibus ac repellentibus utendum, quale est Rosaceum per se, aut cum aceto, aut cum hedere, & brassicæ tremore Cæterum somni quietusq̃ cura habenda sic est, ut per totum diem quiescant tum ad uesperam loti, cibis boni succi nutriantur, non tamen calfacientibus. Quales sunt Prisanæ succus, sorbitio ex alica, panis ex aqua, & oua sorbilia absq̃ garo, quibus aromatū condimenti misceatur, quantum ad suauitatē saporis farciat. Refrigerāt etiam, Lactuca, Brassica, Lenticulæq̃ siccum. Potu uerò omnino aqua utendum est: at quæ nonnullis uenterculus subuertitur malum punicum ipsis superedendum est, aut solum, aut cum alica calida probeq̃

N 4

cocta.

cocta. 2. de comp. meden. secundum
loca.

20 In rassicæ folia calida macerata, capitibus circumposita ac obligata, naturaliter ebrietati resistunt. Ibid.

21 Causæ procatactice dolorem capitis inferentes sunt, ardor extrinsecus accidens, aut refrigeratio, aut ebrietas, aut ictus. Intrinsecus autem intemperies simplex citra humorum affluxum, aut in humorum qualitate, aut in eorundem multitudine, aut obturatione, aut denique imbecillitas naturalis ob quam spiritus flatuosus innascitur, quarum affectio singulorum propria existit. Ibid.

22 Vehementissimi capitis dolores fiunt iuxta caliditatem, & frigiditatem maxime cum inæquales fuerint; moderati autem iuxta siccitatem, ex humiditate autem nullus fit dolor. Is autem qui ex ardore caput dolent, cutis aridior ad primum contactum apparet, oculosque rubros habent, ac frigidis tum perfusionibus, tum illitionibus oblectantur. Repulsoria vero

ro curatione principio opus habent,
ex refrigerantibus & astringentibus
constante. Postea etiam mitigatorijs
repulsorijs mistis: deinde discutienti-
bus, paulatim detractis quæ repel-
lunt. Optima autem sunt, quæ sub-
stantia tenuium partium sunt prædi-
ta. Quale est rosaceum frigidissimū
quidē principio perfusum iuxta fron-
tem, & tempora, & occiput, non ta-
men longē inferiūs, ex oleo crudo
(quod onuphacium uocāt) citra salē
confectum, nempe rosis, quampluri-
mis ī eo maceratis ipsoq; anno, si po-
test cōfectum. Proximum à rosaceo
erit chamæmelinum, potissimum in
fœmininis eunuchis & pueris, quib.
non est inducenda uehementissima
frigiditas. Miscenda autem refrigerā-
tia hæc sunt, Semperuiū, Portula-
cæ, Lactuæ, Psylli, Polygonicæ suc-
cus, item Solani, Pampinorum uitis,
uuarum maturarum, sed paululū ho-
rum singulorum, sicut & mali puni-
ci, lydoni & mespili. Cucurbitæ eti-
am cremorem omphacio miscui, &

N 5 seri

seridis, mororumq; submaturorum
aptus erit. Ibid.

23 Doloris capitis à frigore indi-
cium est facies decolor, & non arefa-
cta tamen, non frigidis gaudere, &
curatio autem fiet, rutaceo oleo cali-
do syncipiti effuso : item euphorbij
& quibuslibet pharmacis expipere:
iungēda facies, aures, nares præcipue
irino, amaricino, nardino unguen-
tis, item foliatis spicatis que uocatis.
Samplicinum etiam, laurinum, & ser-
pyllinum commendo, uinum tenuiū
partium profundum, motusq; cor-
poris præcipiendus. Ibid.

24 Aurium meatus ab obstructio-
ne liberant omnia, quæ tenuium par-
tium substantium absq; mordacitate
sunt prædita. Cuius generis sunt cu-
cumeris syluestris radix: item Brya-
niæ ari, dracunculi, centauriæ, polij,
& omnino amarorum omnium.
Rursus. Moderatæ aurium inflam-
mationes & non pulsatiles, rosaceo
& aceto, simul tēperatis, tepesactisq;
atq; infusis curantur. Prodest etiam
mul-

multum, Pastillus ex Glaucio cum aqua pluuiali trito, in pastillum coacto, & exiccato, cui gummi decima quinta portio, ut melius compingatur addere est. 3. de comp. secundum loca.

25 Ulcera aurium recētia tū glaucium solum, cū aceto tantum curat, tum collyria ex eo omnia, sicut & quæ ex croco, & ex rosis fiunt: item Democratis collyriū ex Myrrha. Pastillus etiam mens ex charta combusta. Ibid.

26 Dolores aurium à frigore calfacientibus curatur. Euphorbio modico ad multum uetus oleum admixto, pipere exquisitissime trito, oleo amaricino infuso & optima nardos, rutaceo oleo tenuissimarū partiū, oui candido, quo etiam ad lippitudines utimur, lacte muliebri, adipe anserino, uulpinoq̃, quæ omnia aut singula, aut coniuncta quodam infundi debent mediocriter calida. Ibid.

27 Ad lippitudines oculorum & inflammationes adhibenda sunt, phar-
maca

maca repellentia, minimè tamen exasperantia, id est, non uehementem astrictionem sortita, ob sensus subtilitatem ac substantię raritatem, sed & lenitiui liquoris admistione moderatiora facta. Cuiusmodi sunt oui candidum, fœnigræci decoctum, magisque adhuc ipsum lac: item albumen oui cum collyrijs monhemeris, id est diarijs, Balneum sub uesperam, nardinum collyrium iuuentū die sequenti balneū, & deambulatiuncula paulò antè ipsum. Fouerì autem oculi debent ex meliloti & fœnigræci decocto semel quidē, aut bis in die si mediocris sit dolor, sæpius autem si uehemētior. 4. de comp. secundū loca.

28 Ego nullum pharmacum auribus dolore uexatis infundo, neque etiam per lanam instillo, nimirum experientia edoctus, quod præstet, neque omnino contingere doloris tempore auditorium meatum. At remisso dolore, per auriculare specillum, obuolutum lana, mollissima partem dolentem foueo, pharmacumq; in iñcio

cio modicè tepefactam in aurifusorio specillo. Postea uerò forinsecus tum orificio auditorij meatus, tum uniuerſæ auri mollem lauam impono. 3. eiusdem.

28 In sonitibus aurium, si ob flatulentum spiritum, cui non pateat exitus fiat, discutientibus, attenuantibus, ac differantibus utere, simul & apoplegmatismis. Si nil proderit, quia non ex flatu, sed exquisita audiendi facilitate procedat, præsertim si acuto sensu præditus æger appareat stupefacientium quippiam. Cuiusmodi est mandragoræ & papaueris succus, admiscito ad flatulentos igitur sonitus, acetum cum rosaceo instilla, aut cuminum & oleum crassitudine mellis, aut radicis syluestris cucumeris succum, aut reclinato ægro & nitro trito in aurem insperſo acre acetum infunde tepidum, ac postquam feruere desiit exterge lana & nucum amararum succum, infunde lanæq; obtura. Ad facilitatem uerò exquisitam audiendi castorium & cicuta semen cum

cum aceto trita instillato. Ibidem.

30 Cataplasmatum cura & ut nō nisi superuacuum magna ex parte partium uacuatis, & partium concoctis, & ieiuno ægro apponantur. 12. Methodi. & 5. de comp. med. secundum loca.

31 Ocularium pharmacorum unum genus in his tribus liquoribus lenitiuis consistit fœnigræci decocto lacte & ouī cādido, quæ omnimodæ acrimoniæ sunt expertes. Alterum in ijs quæ modicam mordacitatem sortiuntur ad mistamq; habent partim afflictionem, partim extergēdi facultatem, qualia sunt rosæ astringentes, thus extergēs, crocus & myrrha: Lycium & castorium, & mellodi decoctum, quod est concoctorium. Immiscetur etiam lapis hematiles, resiccās humores, ueluti & cadmia, & lapis schistus, Stibius bene lotū. Reliqua chalcitis usta, mysi, ærugo, gallæ sunt uehementiora, q̃ ocularib. conueniant. 5. de comp. secundum loca.

32 Ophthalmia calidis regionib. sæpius

saepius accidit, sed h̄isdem citius curatur quàm frigidis. Atq; eadem est in utraq; hyemis & æstatis ratio. 2. de med. simpl.

33 Angina hominem suffocat aliquid haurientem, quod fit ob crassos humores in faucium partibus hærentes. Estq; perniciosissima phlegmone, in qua nulla incensio appareat, q̄ in œsophago, aut gutture, aut eorū musculis soleat euenire. 2. in 2. Epid.

34 Id uerò phlegmonis genus, si urget non solum medicamētis intrinsecus iuuantibus, sed etiam emplastris, & calidæ perfusionibus ac balneis extrinsecus indiget, quod tamē ante declinationem fieri necesse non est. Cibi autem farinacei generis esse debent molles, ac medicamētarij omnes, quò partibus affectis emplastri uice intus secus subseruiant. Ibidem.

34 Sermo propriè est motus articularum seu spiritualium instrumentorū. Propterea si quis fluxu sanguinis laborat cohiberi eius, & pulmonem, & pe-

& pectus, & tracheam arteriam oportet, ne clamore uel spiratione nimia laedatur. Motus uero manuum & pedum concedendus mediocris, eate- nus tamen ne spiritum intus coactum commoueant. 1. de humorib.

36 Intemperiem musculi pectoris inaequalem lenis aliquando tussis sequitur, quæ ex eo fit quod musculus ab ipsa intemperie cōpunctus repellendi, ac dīciendi à se contraria sensu moueat. 5. de morb.

37 Ad omnem tussim confert medicamen, ex Anisi drach. duæ acet. costi obolis tribus, myrrhæ castorij, Chalbani, Piperis albi, sem. hyoscyarij, opij, succi glycyrrhizæ sing. drach. una, passo exceptis reductisq; in Catapotia, Ciceris magnitudine. 7. de comp. secundum loca.

38 In reiectione sanguinis curatio eius quidem, quæ ex reperatione osculi, cuiusdam uasis accidit per obturationem molienda, eius quæ ex ruptura, per conglutinationem, eius quæ ex erosionem, per erosorum renutritionem.

Obtu-

Obturantur autem oscula illa per astringentia. Conglutinantur per eadem & per resiccantia citra mordacitatem; & glutinosa, uelut est sanitas aster, & lemnia terra. Renutriuntur per cibos boni succi & pharmaca carnem gignētia: Immiscenda autē iuxta secundam rationem, in ijs quidem qui ex pulmone, aut thorace, aut arteria, aut larynge reiectant, calida & tenuium partium medicamēta, quæ præparant uiam astringentibus, at ijs qui ex locis circa uentriculum, aut stomachum, aut aliquod intestinum, huiusmodi mistura non est opus. Ibid.

39 Singultus, q̄ ex uī frigoris nervosa membra cogentis ac eorum superfluos humores dissoluentis fit, ut ait in 6. Aphor. uel ex plenitudine & euacuatione secundum Hipp. uel citra hac ex acribus, serosis, medicamentosisq̄ humoribus uentriculum mordicantibus, uel ex deuorato pharmaco diatrion pipereon, & uino superbibito, uel ex alimenti corruptione in uentre, uel ex partis frigiditate;
O quod

quod pueri maximè contingit, curatur si ex copia, aut mordicatione sit, uomitu, si ex frigiditate, calidis medicamentis, ruta cum uino, aut nitro cum aqua mulsa, aut opio, aut castorio, aut abrotono, aut aristolochia. Item Asclepiadis compositio, Spicænardii, costi, chrysobalanorum, rosarum uiridium, mastiches sing. drach. quatuor, aloës asari drachm. duas, apij drach. unam succo psyllij excipito, pastillos formato, & obolos tres dato. s. de com. secundum loca.

40 In affectibus uentriculi sicut & hepatis cibum ægro, certa definita quæ mensura præscribi oportet, quæ affectus particulas non magis grauetur. in 2. Epid.

41 Auxiliorum materia congruentium respirationis organis gulæ pharyngi, laryngi, & intern. & arteriæ, tum ab alijs, tum à balneis dulcium aquarum, cibis lenibus, & laxantibus petendum Quales sunt qui ex lacte, amylo, alica, ouis, & cibis dulciarijs constant; item pharmaca sub lingua

lingua tenēda Hypoglottides dicta,
ex uino hereo, gummi, tragacantha,
glycyrrhiza, conflant, quæ lenigant
asperitates, concoquunt & citò per-
sanant. Quibus qui utetur, patiens sic
oportet, ut ipsam linguæ suppositū
paulatim liquefscens, in laryngem ex-
cipiat, renitēs interim tussi si qua ex-
citari uideatur. 7. de comp. secūdum
loca.

42 Stupefacientia medicamenta
(quæ in tantum refrigerant, ut som-
nium inducant & affectum stupefa-
ciant) miscētur reiectioni sanguis cō-
gruentibus, quod altiorē somnum
concilient & commodissima sint ijs,
qui tussi lancinantur sistētia nimirū
sanguinem, qui ad uas affectum de-
fluit, idē ob suā frigiditatem. Ibid.

43 Dolores uētriculi syncope me-
diocriores facile uino paulū dilu-
to curantur, ex eo enim calefit uentrū
culus concoctioq; iuuatur, & frigidi
humores resoluuntur. Propterea eti-
am horri ex erodentibus & acrib.
humoribus nato adhibetur commo-

dē modò citra febrem, aut phlegmō-
nem fuerit. In 2. Epid.

44 Epilepsias ex fastidio & dolo-
re stomachi ob largiorem uehemen-
tioris uini potum, aut nimium uene-
ris usum, itemq; febres ex conuulsio-
ne ob iniquos uētriculi humores na-
tas sæpe uomitu uidimus sanatas. 5.
de locis aff.

45 Frequentissimè uidemus flaua
in uentriculo bile contenta caput do-
lore affici. Illa uerò eiectum per uo-
mitum ilicò dolorem compesci. Atq;
inter optimos medicos non solū hæc
accidentia, sed epilepsiam quoq; ca-
piti à uentriculo oriri. Ibid.

46 Melancholicos seu hypochon-
driaco morbo laborantes, nunquam
deserit timor. Nā omnes timent, mœ-
rent, uitam damnant, sed nō omnes
mori cupiunt. Sunt tamē qui & mor-
tem metuunt, & mortem sibi consci-
scant, quod fit ob atræ bilis colorem
mentis sedem occupantis. Quē mor-
bum minimè inueteratum frequen-
tibus balneis uictuq; humido & bo-
ni suc-

ni succi, nullo alio præsidio adhibito ipse aliàs curauit. Nam ubi diuturnus ipse morbus est factus, fortiora remedia postulat. 3. de locis affect.

47 Quibus uenterculus adeò imbecillus est, ut omnes cibos corrumpat, ijs prodest plurimum uomitus ante cibum uini dulcis usus, & alimētum concoctu facillimum. Item & medicamen discutiens abstergensq; ut hiera picra. Quæ uacuatio non est negligenda, alioqui morbus fit deterior, ideoq; curatu ægrior. 6. de sanit. tuend.

48 Intemperies calida exuperans cui adiūcta sit humiditas, mediocris minore metu, aqua frigida curabitur, quando ex ea minime lædantur, uicinæ partes ipsius uētriculi, ut quæ mediocriter habere debeāt. 7. Methodi.

49 Qui appetentia carent sic ut cibos auersentur (quemadmodum in diarrhœa accidit ex caliditate orta) his de medicamento, quod ex cotiniorū succo fit unū, aut duo cochlearia danda sunt, aut si huius copia nō
O 3 est,

est, eius quod ex carne eorum cōpo-
nitur. Si uerò ex ægro compereris nu-
trimentum corruptum in superiori-
bus partibus uentris pendere & gra-
uari, aliquid diatrion, pipereon da-
bis, non medicamento si illius, sed e-
ius quem in hīs, qui cruditate labora-
rēt lib. de Sanit. laudauimus. Si mo-
tum id notabiliter ad inferiora fue-
rit ad iuuandum aut glande subdita,
aut leui per inferiora infusione est,
utiq; si rosio simul adsit, hāc mitigan-
tibus, si flatus hunc comprimētibus,
si neutrum fuerit ex aqua, melle &
paulo olei id quod subter infunde-
tur facientibus. Vbi uerò uehemen-
tior rosio urgebit Sabinū oleum, in
quo aliquid sæui anserini sit liquatū
est utilius. Si uerò eius copia non est,
gallinacei sæui. Si nec huius facultas
est, caprini. Quod si huius quoq; pe-
nuria erit inñciendum oleo parum
ceræ est potissimum elotæ. Flatus ue-
rò sanādi sunt oleo in quo ruta, & se-
mina quæ flatus discutunt fuere in-
cocta, apij, cumini, marathri aliorum
quæ

quæ id genus. 8. Methodi.

50 Vacuata aluo in appetētia deiecta, nutriendum protinus, amotis ijs quæ astringant: ac siquidem, primo ad uesperam hæc egeris, aut etiā noctis qualibet hora, etiam secundo die similem adhibebis prouidentiam in quo etiam si planè desit febris, & appetentiæ deiectio, lauari hominē fines. Ac ubi in sequenti nocte quietus, citra offensam dormierit, sanum iam hominem prorsus existimabis. Si uerò sequenti nocte aut etiam tertia febrile quiddam paululum afferat ne id quidem formidandum, sed hunc quoque postridie lauabis, nutriesque ac reliqua ut ante definitum est exequeris. Ibid.

51 Quibus ex abundantia crudorum humorum syncope incidit, ijs crassa unia ceu noxia, aquosae parum efficacia sint fugienda. Deligenda uerò sunt media, quæque flaua sint & calida nisi fortè imbecillum illis caput est, quod facile calentibus uinis tentetur. Tum enim quæ minus ca-

O 4

leant

leant sunt potius offerenda. At qui-
bus ex bili affectus hic inciderit, si co-
gantur prorsus uino uti, fugere oportet
omnia tum austerum, tum nouum,
itemque crassum. Deligere uero aquosum
magisque si sint antiqua. Talia enim,
tametsi non ualenter excalfaciunt, ta-
men facile in omne corpus deducun-
tur. 2. Methodi.

52 Per uoluuolosas stomachi sub-
uersiones, aliquando stercus per uo-
mitum redditur, ubi scilicet partes af-
fectæ serosis medicatisque humoribus
magnopere affliguntur. Quod si im-
becilliores etiam sint geminatur ma-
lum, erit itaque in his curationis scopus
ut ad illas adorata admoueamus, ue-
luti anisum, appium, Glaucum, cumi-
num, seseli, &c. Nam quemadmodum
grauolentia omnia stomachum sub-
uertere solent, sic adorata corroborare.
8. de comp. secundum loca.

53 Scire quidem licet eas disposi-
tiones, quæ à prauis succis circa uen-
trem stomachumque oboriuntur ma-
ximè per medicamenta ex aloë iuuari,
mi-

¶ mirum autem in modum lædi ab
edulijis potionibus, & pharmacis a/
stringentibus. Contra uerò ubi hu-
mores nō qualitate, sed copia ob uen-
triculi affligunt utilissimus astringen-
tium est uis, languida tunc existen-
te particula affecta instar laxatorum
articulorum. quorū etiam per astringen-
tia affectio corrigitur. Ibid.

54 Deprauata potionis cupidi-
tas deprauatæ appetentiæ ciborum
proportionem respondet. Siquidem
immoderata potio appetitur quan-
do contenti in uentriculi tunicis ui-
tiosi humores, aut falsi sunt, aut bilio-
si, interdum etiam cū, ueluti feret in
eo natiua ipsius humiditas. At pra-
uas portiones nonnulli appetunt pro
uitiosi humoris, qui in ipsis uincit ra-
tione. 2. de sympt. causis.

55 Quibus os uentriculi imbecile
lum nauseosumq; est, sistitur autem
uenter, n̄s conuenit primo loco ole-
ra cum oleo & garo aliacq; quæ uen-
trem molliant sumere. Post iustum
autem cibi modum aliquid eorum,

O 5 quæ

quæ stomachum roborent, ea sunt
mâla, pîra, & pûnica. Ipse autem qui
affligitur omnibus seorsum explora-
tis quod minimè noxium, iucundis-
simumq; inuenerit eo in quantitate
mediocri utatur. 6. de sanit.

56 In febrî diariâ febrî ex diarrhœa,
cum os uentriculi imbecillus est,
cibumq; respuit periculo uiniri o-
portet calido & sicco, uel ex oleo in
quo absynthium incoctum sit, uel ex
nardino madenti ac plurimū expres-
so, abundeq; calenti cum primum
apponetur. Quippe quæ tepida sunt
omnia uentriculi firmitudinem dis-
soluunt. 8. Methodi.

57 Qui appetentiæ deiectione in
diarrhœa affligitur, fluente adhuc
aluo, si uenter intus uritur, ita
ut affectus quidam phlegmonæ si-
milis, in eo consistere uideatur, utili-
us est ceratū frigidum, quod ex meli
no conficitur. Omnino autem si ap-
petentia deiecta sit, uentre non am-
plius excernente, ex medicamento
quod succo, uel carne cotoneorū cō-
ficitur,

ficitur unum aut duo cochlearia exhibebis. Ibid.

58 Hyposarcam curamus adhibitis primum, quæ pituitam purgant solutione uentris, deinde quæ uomitu, postremo quæ apophlegmatismo. Purgat enim hoc præcipue capitis humores phlegmaticos. Quod si uniuersum corpus huiusmodi inuasit humiditas uniuerso etiam remedio utemur medicamentis, scilicet incedentibus, & excalfaciētib. & ictericisq. in 1. de humorib.

59 Qui in Regium morbum ex obstructione inciderunt, absq. febre permanent. Qui uero ex inflammatione omnino febricitant. Quod magno pere lædunt medicamentosa & facultate calida omnia. ut Gentiana Struthion, helenium, costus, aristolochia Polium, Centaurea. Conueniunt autem ictericis ex inflammatione hepatis quæ cunq. sanāt inflammationes, quemadmodum etiā ijs, qui ex obturatione omnia, quæ strenue extorgent, etiam si medicamentosam substantiam

stantiam calidamq; facultatem. Si uero obstructio simul & inflammatio coeant laxantibus simulq; extergentibus opus erit. 9. de comp. secundū loca.

60 Ictericos quacuncq; licet ratione purgare enitendum est, siue solutione uentris, siue momitu, siue sanguinis ē naribus effluxu, siue urinæ emissionē, dū purgetur, eodem pertinebit. 1. de humorib.

61 Qui pro ruente ad cutem bilioso humore icterici fiunt, balneis potabilium aquarum, & olei discussorij astrictu omnium rarefacientium cutem facile curantur. Huiusmodi sunt anethinum oleum, chamæmelinum, atq; cicinum. Posthec etiam unguenta Gleucinum comagenum uinum, atq; amaracinum. Alię confectiones priuatim ictericæ dictæ, ad eos qui obstructione uasorum iuxta hepar, aut inflammatione laborant, omnes pertinent. 9. de comp. secundū loca.

62 Omnis humor similibus sui sibi coloribus admotis facilius purgatur,

tur, ut icterus citrinis, quod bonum est. At reiectatio sanguinis purpureo colore magis mouetur, quod est perniciosum. 2. de humorib.

63 Hepatis scirrhum initio quidē sanauimus, inueteratum autem, neque ipse potui sanare, neq; alium uidi qui posset. Quippe omnibus ita affectis aqua inter cutē, denuò subsequitur, nec uerò fert hoc uiscus fortia medicamenta, ut splen. Quare si sit induratum augere oportet, ea quę ratione inflammationis illius apponuntur in mistura emollientium adhibita etiam congruente uictus ratione, unā cum potionibus dissipantibus & abstergentibus, eum qui in uiscere continetur humorem, & aliquid eorum quę urinam cieant. 2. ad Glau.

64 Ex splenis etiam scirrholo affectū proficisci potest hydrops, ex eo enim hepar, ex hepate reliqua inficiuntur. 6. de locis aff.

65 Emplastrum ad spleneticos, & hydropicos conueniens, quod etiam
Ischia

Ischiadicos liberauit conser. Gal. refert. Picis aridæ lib. iij. Cerae, resinæ pinus, ammoniaci thymiamatis, natri rubri, baccarum lauri aridarū sing. lib. ij. adipis laurini lib. i. iridos lib. ij. canchrios unc. xviij. farinae fœnigræcæ pollinis, radicis chamæleonis nigrae tenuissime tritæ sing. sextarium unum, cumini tenuissime triti sesquiseptarium, passi sextarium .i. confecto utitor. 9. de comp. secundum loca.

66 Si iecur obstructum sit succurrendum est ijs, quæ meatus eius aperiant, & in ujs hærentia expédiant, quæ etiam cōcoctionis tarditati conducunt, quorum optima sunt Opymeli, & diatrion pipereon, quod nihil non familiare receperit, adhæc extenuatorius uictus & deambulationum culæ. 6. de sanit.

67 Nos uel si minima suspicio sit iecur uētriculū ue phlegmone tentari absynthium protinus oleo incoquemus, ac eas particulas profundemus. In penuria uerò absynthij inter
initia

initia, uel melinum, uel mastichinū,
uel lentiscinum satisfecerit, quod si
exigua febris sit etiam unguentum
quod ex nardo componitur. 11. Me-
thodi.

68 At si iecur phlegmone infesta-
tur, exisitissimo uictu est opus. Aequē
profecto & si ueter sic laborat qui pa-
pe munus eorum toti animali est cō-
mune. Adhibenda igitur quæ culpa
uacent, ut in cibis præsana, quæ siue
rosione deterget, ut in pharmacis o-
xymeli aqua mixtum. Nam & punia
cum malum & cætera, quæ astringūt
dum bilis meatum arctant, ipsam bi-
lem excerni prohibent. 13. Methodi.

69 Vbi iecinoris cauum phlegmo-
ne affligitur, per aluum purgatur, u-
bi uerò gibba, per ea quæ modicè u-
rinas mouent, cuius generis est api-
um. Procedente uerò tempore, u-
bi phlegmone ipsa iam concoquitur
etiam ualentioribus uti licet, asaro &
celtica nardo, & phu, & petroselino,
& c. sery mio & mio: Sicut etiā per uē-
trē uacuare si cauum afficitur, enico
cibis

cibis admixto, & urticæ semine, & mercuriali, & epithymo, & filicula omnibus præterea, quæ alium den-
ciunt. Magisq; in remissionibus tum his ipsis utendum, tum uerò his quæ sunt ualentiora partim in ptissana in-
coctis, partim tunlis & in puluerem redactis. Exhibenda uerò hæc sunt ex ptissana, uel ex aqua. Ego namq; etiam filiculæ aliquid in ptissana, ali-
quando incoxi & nigri ueratri corti-
cem. Etiam clystere uacuare eos con-
ueniet inter initia, uel sale, uel intro,
uel aphronitro aque mulsæ admixto
contentis. Intermissionibus uerò po-
tissimū si quid scirrhum, ex phleg-
mone relictum est etiam ualentiora
nascentibus. Quippe hysopum eo
casu aquæ incoquimus & oryganū,
& colocyntida, & minus centauriū.
Ibid.

70 Hepatis imbecillitas medica-
mentis aperientibus, & mediocriter
extergentibus, qualis est therebinti-
na, quæ uenarum angustos meatus
extergit expurgatq; curanda est, ne ex-
obtu-

obturatione putrescāt. Hepatica autem nulla uehementer refrigerantia esse oportebit. 8. de comp. secundum loca.

71 Chicorium & seris inter genera ciborum ascribuntur. Facultas autem eorum est sub frigida & sub amara ac mediocriter astringēs, quarum qualitatū ratione, calidis hepatis intemperantijs summē conueniunt. Refrigerant enim moderatē & præterea firmitudinem adferunt uisceri, sed nec frigidam eius intemperiem magnoperē lādūt, quemadmodum, quæ frigida sola amaritudinis & astrictionis omnis expertē sunt prædicta. Quod si mellis aliquid admisceatur per urinas etiam humores aquosos probissime eliciunt. Ibid.

72 Miscenda sunt hisce affectibus cum discutientibus etiam mollientia pharmaca, quæ præparent indurata corpora aptaq; ijs excipiendis efficiant. Cum enim hepar sit corpus humidum natura, multo magis cæteris etiā partib. emolliētib. indiget. Ibid.

P

73 Se

73 Serum lactis cum sit amaritudo
dinis gratæ præ cæteris hepar exter-
gere, & aperire eius meatus potest
maximè siue calfactione, aut refrige-
ratione nimia. Ibid.

74 Medicamenta quæ mordent,
& erodunt phlegmonas, quæ in ca-
uo hepatis sunt, magis irritant. Quip-
pe hæc quæ in gibbis eius consistunt
mutata iam veniunt, ea quæ assump-
ta sunt, ita ut nec quæ astringentia
sunt similiter adhuc astringant, nec
quæ mordens est similiter adhuc mor-
deat, nec quod ob lentorem in angus-
tis uasis hærebat, similiter etiam nū-
quam maneat lentum. Propterea etiam il-
lis aromatica adiunguntur. 13. Me-
thodi.

75 In liene phlegmone affecto cu-
rando si uel æger ex his sit, qui atræ bi-
lis excrementum naturaliter conge-
rant, uel etiam eo tempore succus, is
in eo abundet necesse est astringentia
reliquis admisceas, quò uisceris ro-
bur custodias. Sin nullum omnino
sit atræ bilis excrementum, aut omni-
no a-

nō astringendo non, aut quā par-
cissimē. . . . eiusdem.

76 Si in liene scirrhusa duritie
phlegmone sit propter humoris quē
continet, uel crassitudinem, uel len-
torem, nulla magis cataplasmata, q̃
quæ ex oxymelite, & absynthio, &
cappari sūt, illi sunt idonea. Parcius
uero ad pectus, quā ad iecur ac uē-
triculum est astringentibus utendū.
Ibid.

77 Ad scirrhosos affectus lienis
nullum uehemēter excalfaciens sic-
cans ue medicamen est aptum, sed
ea tantum quæ cum molliendo dige-
rere etiam commodē possunt. Cuius-
modi sunt tum ceruina medulla, tum
uitulina, tum seuum hircinū, & tau-
rinum, & leoninum. ad hæc ammo-
niacum thymiana & Bdellium u-
trunq; ultimo Methodi.

78 Excremēta corrupta lienis nō
nisi per inferiora purgantur, neq; e-
nim ad renes ipsa transmittere po-
test ob imbecillitatem, propterea
cum phlegmone afficitur uentrem

P 2 solue

soluere solemus. 1 2. Methodi.

79 Pleuritides lateralesq̃ morbos
attenuantibus pharmacis & catapla-
smatis, & uentris solutione purga-
mus. Pustulam autem non damus
præsertim in uigore morbi ne forte,
crisis impediatur. 1. de morb. acut.

80 Cataplasmata laterib. lana mol-
li, seu linteolo complicato, aut quo-
piam alio similiter molli applicanda
sunt ne costas contactu lædant. 2. e-
iusdem.

81 Scirrhus affectui si ita durus
sit ut nil expuretur, conferet multum
suffumigatio cataplasmatum humidis.
Ibid.

81 Apostemata quocunq̃ ex hu-
more sint orta, siue ex bili, siue ex me-
lancholia, siue ex phlegmate non
sunt attenuantibus curanda, nec si ex
sanguine quidem in lateribus cōcre-
uerint, potissimum ubi calidior fue-
rit aëris tēpestas, aut ubi bilis in cor-
pore damnabitur. Sanguis enim in
bilem facilius tum mutatur. quod ex
eo uidere est, quod qui reiectant san-
guinem

guinem continuò cholericum quid
expuant. 2. de humorib.

83 Omnia quæ magnis pleuritidis
accidunt, respondent sympto-
matibus partis nervosæ septi transuer-
si, tum quòd succingens costas mem-
branæ multis nervis prædita sit, tum
quòd adhæreat septo transverso mē-
branisq; thoracem intersepiantibus
per quas ad quos continuatur. 4. de
præcog. expulsibus.

83 In ijs uerò abscessibus, qui in al-
ta corpore constiterunt ac potissimū
in uisceribus, medicamenta quæ ex
aromatis componuntur maximè sunt,
utilia utpote quorum uis collectum
humorem, tum in habitum resoluat,
tum digerat. Sunt profectò & alia e-
ius generis medicamenta quorum
laudatissima sunt, tū antidorus, quæ
ex uiperis componitur (theriacā uo-
cant) tum qua Athanasia uocatur, tū
Ambrosia: atq; hæc quidē sumptuo-
sa. Viliorum sanè optimum est no-
strum quod ex calamynthe cretica
est compositum. ultimo Methodi.

P 3 84 Coma

84 Commune quidem est abscessibus & pulmonis obstructionibus, ut absumatur redundantia humoris affectionē gignentis. Proprium uerò uiscidis quidem pulmonis humoribus obstruentibus, ut per attenuantia & extergentia pharmaca curētur, ac dissecentur. Tumoribus uerò ut per attenuantia, & siccantia conficiantur, quę curatio omnibus quidem abscessibus in alto consistentibus cōmunis est. Vini itaq; potus utrisque competit, sed parcius abscessibus, q̄ obstructionib. esse debet. 7. de cōp. med. secundū loca.

Addit Moyses.

Attenuantia quę calfaciunt siccantq; primo gradu (ut Galenus docet) sunt hæc Eupatorium, iuncus, rotundus, tamariscus, & pistacea. Secundo uerò hæc, cardamomus, balsam, aristolochia iris, cucumer, rhabarbarum, asphodelcis & mastiche. Tercio gentiana, ebulus, daucus, cinnamomum, hypericon, histopus, nux romana, ammoniacum, malua, sambucus,

bucus, pimpinella, serpyllum, mentha, ruta, cassia lignea, sagapenum, melanthium & dracuntium. Recentiores autem sæpius utuntur Serico Silphio & Calamintha. Atq; hæc sūt trigintaquinq; tenuiter siccantia & calfacientia medicamenta, quibus uel simplicibus, uel compositis, proportionē ulceris, cū opus fuerit, uti possis. Acetum inter attenuantia & siccantia numerantur, sed refrigerat simul cum calfactione, & adimatū quod medio criter in utroq; se habet.

85 Vulneribus intestinorum si abscessu careant facilē est ex astringentibus reperire remedium. Vbi uerō abscessus accesserit, aut hydrops, aut aliud difficillimē curantur, quod in dies maius malum fiat. In membrana autem hepar musculosq; lateris aurgente, si quibus alijs partibus sunt sanē hydropes frequentissimæ. in 6. Aphorif.

86 Et si altera ex duobus intestinorum operimentis peritoneo, uel epiplooo lēdatur, ac undiq; uulnere, si

P 4

modo

modo alterum sit integrum ab affe-
ctu liberari potest animal. 5. de usu
partium.

87 Emplastra & cataplasmata à ue-
teribus quidē medicis coeliacis cōpa-
rata, si sæpe usurpēt, cōferūt, sin si mel
aut iterum tantum, postea aliud exhi-
beatur: plus illa detrimenti quàm cō-
modi adferunt, si quidem nil aliud q̄
intestinatorum tensionem adauxerūt.
de Clysteribus.

88 Si dolor intestinatorum cum fe-
bri aliquando incidat, principio qui-
dem si ferat æger fomentum siccum
ex milio adhibendum est. Si ab hoc
non quiescant semen aliquod quod
flatus dissidet in oleo quod tenuium
sit partium coquere, mox per linteū,
quò purum sit oleum colare, dein an-
serinum, aut gallinaceum seuum, nec
salsum, nec admodum uetus in ipso
oleo liquare, & per sedem infundere
oportet. Ac si neq; ex hoc remittan-
tur dolores, secundo rursus inñcien-
dum est: adiecta etiamnum castorei,
& papaueris succi, utriusq; non am-
plius

plius fabæ magnitudine, olei uerò hemina. 1. 2. Methodi.

89 Lumbricorum tria sunt genera, ascarides breuesq; tenuesq; uermibus terræ similes in extremo longanone. Potissimum reperti, institæ longilatiq; semini cucurbitæ similes in maioribus intestinis nati, & tere-tes longitudine palmares, & plerun-que longiores, serpentibus similes in gracilibus plerunq; intestinis contē-ti. Omnes autem ad uentriculum ela-ti dolores incutiunt. qui curantur a-maris potissimum medicamentis, ut myrrha quæ etiam secūdo ordine cal-facit & exiccat. Brassicæ esculētæ se-men, potum, calamintha, & anchusæ quarta species, calida & amara, præ-cipue ad latos idonea est oxybaphi mensura cum nasturtio, & hyssopo epota. 1. in 2. Epid. & 6. de simpli-cibus.

90 Renes si uiribus suis constent, certum humorem pinguem in uenis en sanguine eliciunt, attrahunt & ad uesicam mittunt, à qua postea cum

P 5

urina

urina efficitur. Si uerò imbecilles sint ut attrahere nequeant, tum alterum horum necesse est, ut aut à uenis ad uentriculum, reijciatur, aut per totū corpus fundatur fiatq; hydrops. 2. de caus. symptomatum.

91 Retenta longo tempore urina, uel ob somnum diuturnum, uel ob negocia urgentia, ipsa uesica extenditur, atque urina suppremitur contractrice facultate propter tensionem lesa. Præterea ob sanguinis grunium, & pus crassiunculum interdum retinetur: in pueris etiā quos lapis in uesica cruciat, uidimus sæpenuerò eā supprimi. Eos itaq; resupino figurato corpore adeò cōcussimus ut à meatu lapidis dimoueretur. 6. de locis affectis.

92 Sedis uitia ob ipsius partis sensum exquisitissimum & ob crebrum per ipsam excrementorum decursum ægrè, curationem recipiunt. Aptissima autem ipsis sunt medicamenta, quæ absq; aspredine astringunt, qualia sunt maximè, quæ ex metallicis neq;

neq; acria, neq; acerba existunt, hæc
liquidem lota citra mordacitatem (id
quod requiritur) operatur. 9. de cōp.
secundum loca.

93 Ex melancholico sanguine qua-
tuor affectuum genera existunt, sca-
bies & lepra in cute. In carne uerò &
uenis cācer atq; elephas, ille quidem
ex ipsi⁹ sanguinis copia, istius hic ue-
rò ex eodem tēpore procedēte: quo
corpus grauiter olet, turpeq; atq; de-
formatum uidetur, interdumq; exul-
ceratum. Gal. de tumorib.

94 Iuncus seu pituita nonnunquā
tanta copia exuberat, ut cum urina
reddatur, ac sæpe ulcera in articulis
nascantur, ijs quibus hydropici affi-
ciunt. Similia ea uerò nonnullos me-
dicos in errorem aperiēdi ulceris in-
duxerunt, saniem subesse cogitātes,
quod tamen sola caro pituitosa non
esse, ita arguere poterat. 8. in 6. Epid.

95 Tabis species sunt tres, tabes
tabida, quæ & tabida febris, & sene-
cta ex morbo tabifica dicitur, tabes
torrida, & tabes syncopalis. quibus
coma

commune est, ut humectentur ob cō-
 munem siccitatem. Propriū uerò se-
 nectæ quidē ex morbo cal fieri, quæ
 febribus ob immodicam intempesti-
 uamq̃ refrigerationem, in eum affe-
 ctum transeuntibus cor frigidius fa-
 ctum est, quàm ratio naturę postulet.
 Torridæ uerò, refrigerari, ob habitū
 sicciorē à calore & ardentissimis fe-
 bribus effectum, & Syncopali, id est,
 deliquio animi coniuncta si etiam nū-
 fiat, ita ut humiditas solidis partibus
 absumatur miscellanea curatione cu-
 rari balneo tempestiuo, post conco-
 ctionem ministratio ex frigida pota,
 & uictu in mediocritate consistente.
 Tribus autem illis marcoribus con-
 uenit hæc alimentorum ratio, lac ex
 mamma muliebri exuctum, aut si ne-
 quit ex asina, uel dum adhuc calet ne
 aëri fuit expositum. Ptissana Alica, a-
 ceto tamen condita ut facilius distri-
 buantur. Mel autem & uinum torri-
 dis fugiendum. Syncope autem affe-
 ctus coctum mel uel solum, uel alijs
 intermistum cibis concedetur, senili
 tabi

tabi utrunq; erit optimum remediū.
Gal. de tabe.

96 Obesitatem quæ multum & actiones impedit & corpus deturpat corrigit, & extenuat attenuandi uictus ratio, quæ incidentibus & dissectantibus. omnis constat, aceto alijs, cepis, piscibus salis, carnibus subtilissimis, balneorum usu calidorum, item exercitijs fortibus, sitis, patientia diuturna & marina, atq; calidorum locorum conuersatione, sed maximè marina, est enim is aër acerrimus multumq; humores resoluens. Galen. de attenu. uict. ratione.

97 Medicamenta podagricis propinata, si humores qui dē fluere prohibeant, at partes affectas non purgant, sunt prorsus non solum inutilia, sed pernitiōsa, eo quod sanguinē retinent, à quo superioribus partibus collecto suffocationes fiunt, & graues conuulsiones, idē saepe experientia probatum est. Consulo igitur ut potius theriacā bibant à qua multos restitutos sanitati uidimus. de
The

Theriaca ad Pisonem.

98 Redundantes sanguinis copia partes, scopum curationis habent euacuationem, id est, detractionem, quandoquidem morbus est immodica repletio. Sed primum intendendum est ut retrocedat, à parte affecta humor qui fiet in primis uniuersi corporis euacuatione. deinde, eius quod influit ad contraria loca retractione. Quod si hac uia non retrocesserit sit humor effusus ad intermedia spacia & uacua uenarum per locum affectum uacuandus est, imponentibus nobis particulis superiacentibus ea, quæ repellendi uim habeant, maximè uerò ea quæ in spatijs delitescant scarificationum auxilia & medicamentorum discutientium uacuabis. At quæ descutientia omnia uires calidas habent, effectus autem huius temperaturæ est mordere ubi caliditatis modum excefferint, cauenda ex eis sunt uehementissimè calida ac tum præsertim cum patiens locus in superficie constiterit. Quod igitur mediocrem caliditatem obti-

net

net in hisce dolorem sedat, ac multò magis si humidum fuerit. Gal. in arte medica.

99 Si in his fluxionibus summæ partes omni noxa caruerint, id uerò quod euacuari oportet, in penitioribus partibus hæreat, intendendus atque augendus discutientis medicamenti calor, quum dubitandum sit ne priusquam profundas partis attigerit uires emittat. Hæc duo autem simul inuitabunt ad calidorum pariter atq; acrium usum summarum partium tolerantia, & profundarum necessitas. Ibid.

100 Herpetes exedentes quantū ad totius corporis uacuationem attinet, ut erysipela curare oportet, nē pe per uenæ sectionem considerata ætate, anni tempore, uiribus, & consuetudine. Non tamen ferunt ea medicamenta, quæ præter id quod refrigerant humectare sunt apta, sed sola refrigerantia, quæ maximè exiccare possunt. Quare superimponere ipsis oportet ab initio quidem ex uite capreolos

preolos & folia rubi, & rubi camini
& plantaginis. Posthæc lentem ad-
iungere, aliquando mel, aut hordea-
ceam farinam, aut cataplasma quod
influit, repellens, & quod continet
exiccans (omne enim ulcus exiccari
poscit) quod fiet ex corticibus puni-
corum malorum in uino decoctis &
esu & farina ordeï siue semper uiuo.
z. ad Glauc.

101 Herpetas uerò qui summam
rurem tantum exulcerat nisi diu per-
durauerint, nullo horum inungere o-
portet, quæ uehementer exiccant. Ve-
rùm his sufficiunt, quæ glaucij uim ha-
bent. Quæ quidem aqua diluenda er-
runt, uel aceto, si nil aqua profecerint.
Quod si etiam solani succo intinxe-
ris, uel arnoglossi plus etiam conferes.
Ibid.

102 In Alexandria Aegypti pluri-
mi ob crassam uictus rationem acre-
regionis feruorem elephantiasis corri-
piuntur. At in Germania & Mysia ra-
rissim⁹ hic morbus. Et apud Scythas
lactis potatores nunquam ferè appa-
ruit. Ibid.

103 Ele

103 Elephantiasim & ulcus melancholicum cancrum initio morbi sæpe curauimus medicamentis astram bilem educentibus & uictu optimè constituta ratione, succum pti sanæ, abundanter exhibentes & serū lactis, ex oleribus autem attriplicem maluam & blitum, itemq; cucurbitas si occasio feret, & pisces saxatiles auesq; omnis generis præter palustres. Ibid.

104 Qui uenere diu usi sunt & statim uti desinunt, ijs frigescere corpora solent & ad motum grauiora fieri. Vidimus etiam timidiores inde factos memoriaq; lapsos & pesti magis obnoxios, sicuti sunt melancholici. Quod ex spermatis recentis nidorofo uapore fieri credibile est. 6. de locis affect.

105 Condensaram cutem præcipuè aperit ac emollit anethinum oleum, quemadmodum lassitudines acriorum & mali punici oleum. 3. de sanit.

106 Palpitatio cordis, quanti humore
Q more

more cor ipsum mouetur, plurimis per integram ualitudinem accidere est uisa: quos omnes detractio sanguinis iuuat, una cum extenuante uictus & medicinæ ratione. Eorum tamen qui sic affecti sunt nullus ad se nequitiam peruenit. s. de locis aff.

107 Quæ extrinsecus profluente particulæ admouentur, tum adstringentia, tum citra astrictionem frigida, hæc ipse ut plerique medicorum non ubique probo. Sanguinem enim ita intro compelli, & uenam replere uideri contra atque decet. Siquidem uidimus quosdam eorum, qui sanguinem ex pulmonibus reijcerent ex thorace, refrigerando manifestè læsos: & qui sanguinem uomuerunt nonnullos postquam uenter foris est refrigeratus, infirmiores fuisse, & quibus enaribus sanguis profluxit ex refrigeratione capitis deterius habuisse. Ergo nec animo, nec sine discrimine, nec omni tempore loca circa particulam, unde sanguis profluit posita refrigeranda suaserim. Imò postquam

In alia prius auerteris, ut exempli gratia in naso, ut sanguis missione sis usus, uel artuum frictione deuinctio- neq, uel ad præcordia defixis cucur- bitis: ne sic quidem ad caput & fron- tē refrigerantibus utendum ilicō, sed prius est ad contraria reuellendum, utiq, affixa in summa ceruice cucur- bita. 5. Methodi.

108 Nerui contusi cataplasmate athletarum, quod ex oxymelite & fa- bacea farina conficitur, curatur. Idq, planē salutare est medicamētum. At si dolor unā cum contusione uexat, etiam picem liquidam immiscere ac bene coquere, tum calens medica- mentum imponere oportet. 6. Me- thodi.

109 Qui syncope ob spirituum re- dundantiam laborāt, quod corpori- bus consent laxioribus, cibis lentē aperientibus, quales sunt panis, far, fructusq, omnes astringentes, quiq, citō corrumpi non possint reficiun- tur. Item uitellj ouorum & testes gal- linacei. Omnium autem prima sit cu-

Q 2 re, ut

re, ut cutis densetur crassetur ac firme-
tur. 5. eiusdem.

110 Ulcere in carne iam facto, si
reliquum corpus sanum sit, mitigare
dolorem oportet tetrapharmaco in
lindeolo imposito (liquatur autem
id oleo potissimum rosaceo, uel si id
non sit relaxanti aliquo) toto uero
membro lapso lanæ ex calente oleo
imbuto circumdato. Sin plethoricū
sit corpus, uel malo succo redundet,
curatione per ea quæ colent fluxio-
nem ad membrum citante, nec alia
sanantur. Quare sanguinem mittere
necesse est, id quod aut uena incisa, aut
membris istis, quæ læsa non sunt scarifi-
catis. Manu enim laborante scarifi-
cabis crura, altero autem crurum ma-
le habente, reliquum. Sæpe tamē uel
ipso, qui curant segniore, uel eo qui
laborat præ mollitie uacuationē non
admittente glandularum phlegmo-
ne maior efficitur, sic ut ad suppura-
tionem perueniat. 3. Methodi.

111 Vbi ex animalis punctu mor-
sue dolor incidit duplex sanandi ra-
tio do-

tio doloris est, uel uirus ipsum uacuando, uel quod dolorem excitat alterando. Vacuabis quidem eorum medicaminum ope, quæ uehementer attrahunt. Alterabis autem ijs, quæ sunt contraria, id est uel qualitatibus, uel tota substantia. Item uacuabunt tum excafactoria omnia, tum quæ citra calfactionem uehementer trahunt, ueluti & cucurbitulæ, & cornua quædam quibus nonnulli cucurbitularum uice utuntur. Sunt autem & qui ore suo uirus extrahunt ægre, uidelicet particulæ admoti, ipsasque complexi. Ibid.

112 Intendonibus & ligamentis cum scirrhusa fuerint, satius est ei curationi quam per mollietia molimine, incidentium aliquid admiscere ex quorum numero acetum, uel imprimis est. Eius enim uis, modo eoque modicè & debito tempore utatur, salutaris est eiusmodi affectibus, ceu crassos humores diffecans ac resoluens. Sin uel immodicè, uel in tempore non idoneo, tenuiores partes

Q 3

uiolen-

violenter absumens, id quod reliquū est lapidescere sinit. Sed & si quis eo diutius utatur substantiam ipsam nervorum delibauerit. Ob id igitur nec sæpè, nec inter initia, nec longo tempore medicamentis, quæ ex aceto componuntur ad ligamenta & tendones utendum erit, ultimò Methodi.

113 Materiæ canceri copia ex ustis elotisque metallicis habebitur. Quippe quæ ex his componuntur, unà cū purgationibus ad sanandos incipientes cancrios magnam uim habent. maiores uerò sat fuerit si his prohibeantur augeri. Ibid.

114 Articularis morbi curatio ex ordienda est ab euacuatione affligentis humoris: siquidem ex æquo humores redundant, in corpore uenæ sectione omnium primo administrata. Deinde purgatione quibus accedit pharmacorum conueniens atque opportunus usus in pedibus quidem & manibus eorum, quæ repellendi ac reprimendi uim habent. In ischijs uerò, id est, coxendicibus non item reprimen-

primentibus, sed mitigantibus. nam cum ea iunctura in alto corpore consistat si reprimatur sanguis ex uicinis & circumpositis uasis à musculis ad illam truditur, repleturq; multò magis quam antè. Mitigantibus igitur in principio uti melius est, quæ nec refrigerent multum, nec exalfaciât uehemēter. Calore enim alliciuntur humores potiusquā retineantur. 10. de compos. secundum loca.

115 Ischiadicis auxiliantur uomitus magis, quàm uentris solutiones, ut qui humores inferius repentēs euellant. Quocirca mouendi uomitus principio ab accepto cibo: postea uerò etiam per medicamenta uomitoria, initio à mediocrioribus factò. In quibus autem uehemens humorum densatio, quæ ægrè dissolui possit, à medicis intēpestiuè acriora phar maca adhibentibus facta est: his affixa cucurbita ualdè auxiliabitur, & purgatio p clysmos efficaciores, qualis est, qui ex colocynthide constat. I. bidem.

Q 4

Ex

Ex Themivio in Isagoge.

116 Ischiada seu coxnndicem inue-
teratam sic curato, ℞. nucis Cupressi
drach. duas, foliorum cupressi drach.
unam, acatiæ recētis unc. duas, misce
cum pice liquata, & calida linteolo
inuoluta ieiuno ægro, ac prius laua-
to imposito. laceatq; supinus donec
siccatum sit emplastrum, & diebus
quadraginta sic ligetur, ac bibat quo-
tidie ex aqua myrrhi, & sacchari, nu-
cis cupressi, & eiusdem foliorum tri-
torum, illius quidem duas partes, hu-
ius uerò mediam utriusq; ad drach-
mas duas.

Ex eodem.

117 Apophlegmatismus seu gar-
garismus ex decocto frondium chry-
someti, maximè utilis amygdalæ, &
gutturis inflātionibus. Resoluit
liquidem quicquid ori carni dentiū,
uel gingiuis & uuulæ ex ijs affectib.
incommodatum est.

118 In fractis ossibus curandis,
principio quidem tenuissimè, ciban-
dum & uenam incidere. Interdū o-
porte

portet & per uentrem superuacua expellere. At quo tempore callus, gignitur nutriendum corpus est cibis optimi succi, & qui multum nutrant ex quibus provenire succus consuevit, non solum bonum, sed etiam tenax qualis desideratur ad calli generationem. Item medicamenta adhibenda, quæ collos moueant ac augeant qualia sunt, emplasticotera & modici ex calfacientia. 6. Methodi.

119 In particulis quæ circa artus sunt, cum in ijs phlegmone orietur, nempe pedibus & manibus sat fuerit etiam spongiam, uel ex frigida aqua, cui paulum aceti sit ad mixtum, uel aqua sola imponere sicut etiam ex uino aliquo austero. In iecinore uerò si phlegmone laborare cæperit, nemo compos rationis his utetur. Sed si mala præcipuè cotonea uino incoquens cataplasma ex eo præparaueris, ne id quidem admovebis frigidum, ueluti nec oleum, ut dictum est præparatum, uel oculis, uel oris partibus sicubi hæc phlegmone tentari cœperint

Q 5 rint

250 RABI MOYSIS

rint, auri uerò etiam si acetū cum ro-
faceo infundas, nil offendas. At non
est hoc oculis utilis. Ibid.

Moyſes.

120 Aristoteles sub finē 9. de par-
tibus animalium aphorismum quen-
dam maximē medicum edidit, cuius
tamen nusquam Galenum meminisse
scio. Propterea libuit huc subijcere.
Spasmus (inquit) etiam infantibus
accidit non ex uitio lactis, sed ex ni-
mia eius, potissimum si
si pinguis est,
copia.

DE

APHORISMI.
DE FEBRIBVS.
SECTIO IX.

254

I.



Iborum concoctio siue
ea in iecinore, siue in uē
triculo fiat improspere
febres extendit ac succi
uitio exacerbat. Quō
magis in omni febre, ciborum con
coctioni maximē prospicere oport
tet. 1. 1. Methodi.

2 In febris continentibus dili
genter discernendum, quantum &
quando frigida aqua sit exhibenda.
Incommoda enim hæc sequuntur si
intempestiue immodiceue fuerit ex
hibita, quōd lentos crassosq; humo
res, siue hi obstructiones, siue putre
dinem, siue phlegmonem, siue qua
lis erysipelas, aut scirrhus, aut œde
ma est affectum creauerint attenuari,
digeriq; prohibent. Sed cum conco
ctionis humorum in ijs, notas uide
ris. de quibus in lib. de crisibus dixi
mus: audacter frigidam dabis, maio
riq; cū fiducia si frigida æger assue
tus

tus fuit. Porro erysipelas quod uerū
erysipelas sit, non alio medicamento
sanatur. 9. Methodi.

3 Februm quas putredo accendit
eiusmodi sunt differentia: una ex eo
quod causę ipsius putredinis iam ad-
sunt, uel non adsunt. altera quod per
totum animal diffusa putredo sit, aut
eius aliquam partem occupet. Ter-
tia quatenus cū phlegmone est, aut
citra hanc. Causa putredinis quę est
transpirationis prohibitio, cum ua-
rijs generibus orta sit, nempe densa-
tis exiguis meatibus & constructis
corporibus, & humoribus tum abū-
dantia, tum crassitudine, tum lentitia
sua obstruentibus, singulas harum af-
fectionum per contraria curari opor-
tet. Densitatem per ea quę rarefaci-
unt. Constrictionem per ea quę fun-
dunt, abundantiam per ea quę uacu-
ant, crassitudo per ea dissecant lentor-
ijs, quę detergent. Ac si quidem to-
tum corpus dictorū iam singula oc-
cuparint, etiam toti per contraria suc-
currendum. 11. Methodi.

4 Si

4 Si certam febricitantium naturę
notitiam haberemus, non (arbitror)
dubitaremus eorum aliquos assidue
in aquis frigidis citra balneum laua-
re. Nam quod sint quidam, qui eam
desiderent, uel ex his, quos iuuat con-
stare potest, ut quibus frigida lauatio
haudquaquam cōtulisset, nisi eo tē-
pore opportuno ad eam affectum
habuissent. Verum quoniam exacta
nobis affectuum cognitio non est, ac
maxima ex errore impedit noxa, u-
tiq; eiusmodi pręsidia recusamus po-
tissimum in hecticis febribus. 10. Me-
thodi.

5 Si quando cataplasmate, uel em-
plastro dolorem mitigare febricitan-
tis, uel uenam secare, uel uacuare ne-
cesse est, nec aliter fieri possit, neque
ptisanam illi, neque aquam præbe-
bis antequam feceris, quę sunt ante
dicta. nempe ante uacuationem, &c.
In. 1. de morb. acutis.

6 Si corpus febricitantis iuuenili
adhuc robore & carnis firmitate con-
stiterit, nec sit uenter inflammatus, &
laua-

lauari aqua frigida, & mundari ac nātare concedimus, & consulimus. 10. Methodi.

7 Periodorum febrilium uarietatis causa est humoris quidem putridi qualitas, & uirtutis expultricis ac meatuum in quibus continetur affectus. Siquidem humor: crassus ac uiscidus lōgiori per se mora expellitur quā tenuis, & facultas imbecilla tardius mouet quā ualida, & contractio angustiaq; meatuum diutius retinet, quā amplitudo ac collatio.

Cū igitur hæ motus causæ coiuuerint crassitudo humoris, facultatis expultr. imbecillitas, & meatuum angustia, periodum morbi diuturniorē efficit necessariō. At contrariōrum contraria est ratio. 2. de febrib.

8 Vbi simul ipsa febre sentitur circa os uentriculi anxietas, morsus, & imbecillitas, prius sanē uacuandi humores non sunt, quā os ipsum uentriculi corroboretur, etiam si cruditate, aut cacochymia æger ipse laboret. Est autem consuetudo nō parui momenti

menti ad euacuationis indicationem. Quidam enim nunquam prius fuere uacuati, alij contra & multis cibis sunt assueti, & euacuati sæpe iam fuerunt: hos audacter uacuare oportebit si reliqua quidem persuaferint.

1. ad Glauco.

9 Febris putridæ generatio est humorum quorundam in uētriculo aut uenis corruptorum ad cordis concaua, cum uapore elatio. Ephimere uerò inguū inflammatio, & aliarum enim carnis partium circum corporales cæteris accendentium, minime tamen eoripsum subeuntium. 2. de febribus.

10 Extrema ut aures, pedes, manus, nares, frigida, sæpe in febre acuta euadunt. Quod ubi accidit, aut uiscera plegmone afficit, opoertet aut uentrem graui dolore premi, aut animo linqui & syncope teneri, aut calorem imminutum ac suffocatum nimia humorum repletionem. in 7. Aphorism.

12 Extrema illa initio paroxysmi
refri-

refrigerata, non significant mortem, sed calorem naturæ nitro compelli. In 2. Prognosticôn, aliquando eundem extingui si febris sit acuta. 3. Epid. Sudor aut frigidus in febre acuta mortem. In lib. de sig. mortis.

12 Putredo uel equaliter in omnibus subsistit uasis, maximeq; principalibus (ea porro sunt inter alas & inguina) uel una quapiam partícula, quæ uel phlegmonem in se habet, uel etiam citra phlegmonem, ueluti in foco quodam principium febris in se continet.

13 Febricitare autem incipiunt nonnulli ubi magnam crudorum succorum copiam, unâ cum oris uentriculi (quod stomachum uocant) offensione, uel ex cruditatibus, uel alia quapiam occasione cōgesserunt. His & præcordia inflata, & totum corpus ampliore mole, quâ pro naturæ modo cernitur. Tum color his ad albidius quàm pro naturali habitu, & aqua intercute laborantium magis simile est, mutatus nonnullis etiam ad nigri-

nigridius, aut liuidius, quos quidem
medici plumbei palloris appellant.
Omnes pulsus arterię minores sunt,
quàm caloris ratione. Pręterea obscu-
ri omninoq; inæquales sæpe ea inæ-
qualitate, quàm (Græci *ουσηματικη*)
uocant.) Semper uerò ea quę in uno
est ictu. Nulli talium sanguis mitti si-
ne maximo despendio potest. Cũ
tamen uacuationem desyderent, ue-
rũ nec sanguinis missionẽ, nec pur-
gationem sustinẽt, utpote quos sint
his syncope subito adoritur. Propte-
rea remedium magis idoneum aliud
non est, quàm membrorum frictio,
principio statim morbi tibiariũ à cru-
ribus supernẽ deorsum. Deinde bra-
chiorum ab humeris usq; atq; super-
ne deorsum donec ad lassitudinem
accesserit, eoq; solum tempore inter-
mittens, quo somnus hominem oc-
cupauerit ad alimentum & frictio u-
berior facit, Ergo inuicem mediocri-
ter adhibiti, iuuare se mutuo utiliter
poterunt. 1. 2. Methodi.

14 Febrium intermittentium tria
R sunt

sunt genera tertiana, quotidiana & quartana, quarū prima illa ex bili putrefacta nascitur. Quotidiana uerò ex pituita, quartana ex melancholicis humoribus. Intermittunt autem humoribus commotis, & per uniuersum corpus dilapsis ac sensili motu recurrentibus. 2. de febr. b.

15 Continue sunt quibus humor putrefactus delitescit atq; continet in uenis. Ex his autem quibusdam cum intermittentibus quædā est coniunctio, ijs quidē humor tertio quoque die recurrit, cum tertiana & dicuntur tertianæ continuæ, ijs uerò quæ die intermedia accessionem faciunt, nec intermittunt eum quotidiana, & dicuntur quotidianæ continuæ. Est & tertium genus earū quæ quartanæ accessionum similitudinem habent, & perrarò eueniunt, quartanæ continuæ dicuntur. 2. de febr. b.

16 Febris continua paroxysmo grauis & ad quadagesimum diem, producta inter acutas numeretur. 2. de Crisib.

17 Pu

17 Putridarum febrium maximū
indiciū est mordacitas, & acrimo-
nia caloris, quę proinde tactum, atq;
fumus, nares, & oculos rodere uide-
tur. Sed in principijs accessionū, quib;
calor adhuc intus superfluitates,
accendunt statim admota manu pe-
cipitur, sed per morā affertur ex per-
nitioribus & tunc sentitur. Comita-
tur etiam has febres pulsus initio par-
uus & uelox. Vbi uerò costiterunt,
uelox simul & magnus. i. de febrib.

18 Pro uarietate humorū in quos
conuertitur sanguis febres fiunt sola
bonitate, uel malicia differentes. Si
igitur calor & uapidos, & minus in-
suaui uideatur, à sanguine proficis-
citur. Qui uerò molesti rodentes at-
que mordaces tegenti existunt, con-
sequuntur utramque bilem atram &
flauam. At ubi in primo occurſu ali-
quid magis uaporosum, quā ac-
re repræſentat manui, sed morā pau-
latim crescit mordacitas, eaq; admo-
dum inæqualis perinde ac si per cri-
brū excolari uideatur ex pituita pu-

R 2 tredi

tredine oriri talem febrem ne dubites. 2. de febrib.

19 Numerus horarum periodicarum, qui inter duo initia accessionū est medius considerandus est, atq; est typus febrium metiendus. Sic enim dicimus quotidianum typum sortiri horas uigintiquatuor, tertium quadraginta octo, quartanum 72. quintanum nonaginta sex. Quo similiter pacto cæteri perficiuntur, ex horarū 24. multiplicatione. Quod si in quotidiana periodum 8. horarum esse cōtingat, Paroxysmus enim sex erit, & duabus, tres tum quotidianas esse dicēs, siquidem 8. horæ sunt tertia pars periodi phlegmatici. Sic quoq; si 16. horarum paroxysmus fuerit, tres tertianas in egro iudicabis. 16. enim tertia pars est, quadraginta octo horarū. Eodemq; modo si 18. fuerit quatuor quartanas, q̄ 18. sit quarta pars 72. numeri. Gal. de typis, siue circuitibus.

20 Nulla febris pulsum naturalē recipit quamdiu febris est, etiam si tēpore

pore intermissionis, tēpore diu quie-
uerit, atq; huiusmodi fiunt intertia-
na & quartana. In diaria autem ubi
paroxysmus quieuit, pulsus natura-
lis ad se redit. 1. ad Glauco.

21 Quantum in corpore ægrotā-
tium humores mutantur tantum eti-
am accessionum circuitus. Quæcun-
que autem circa uictus rationem er-
rata ab ægrotantibus fiunt ordinem
circuituum peruertunt. Sæpe uerò
ob complicationem circuituum, quæ
à medicis ignorat, id est, ob id quod
non uidetur certam constitutionem
habere febris, uidentur absq; ordine
accessiones ægrotantibus fieri. Ibid.

22 Paroxysmi horam statam an-
teuertentes anticipare dicunt, & ma-
gnitudinem morbū proficiant. Si ue-
rò accessionis initium tardet, omnia-
quæ minuentur symptomata, declina-
tionis morbi indicium erit certissimū
Porro an ipse morbus augeatur, non
ex eo tātum coniecturari licet, quod
accessiones statum tempus anteuer-
tant, sed quod longiores fiunt uehe-

R 3

men-

mentiores & maligniores, ac cū multis prauisq; symptomatis accidant. Item cū ipsum declinationis tempus erit breue, nec omninò facile, nec symptomatū accessionis expers. 1. de Crylib.

23 Signa tertianæ simplicis, quæ ex ægrotantis habitu cognoscuntur hæc sunt. 1. Rigor uehemens statim initio, quò ueluti aculeis pungi cutim sentit æger. 2. Sitis calorq; uehemens & breuis. 3. Pulsus item toto paroxysmo ingens. 4. Summus accessionis uigor, non ita multò post principium accedens. 5. Caloris æqualiter in uniuersum corpus dissipatio. 6. Caloris item uehementis initio manui tangenti, sub finē uerò sensim suppressi perceptio. 7. Vaporis calidi aqua pota ē corpore exhalatio. 8. Vomitus flauę bilis & fluxus uentris cholericus, urinaq; in qua bilis superet. Tria enim hæc plerunque simul fiunt. 9. Sudor uaporosus calidus & æqualis. 10. Accessionis longitudo productior. 12. horas non
exce

excedens. 11. Quies febris post sudorem. Ibid.

24 Quartanæ autem accessionis symptomata sunt. 1. Eximia quædam pulsum ad raritatem ac tarditatem conuersio. 2. Si fiat autumno, aut tempore frigidam & siccam inaequalemque temperaturam sortito.

3. Si regio talium febrium sit generatrix, aut ægrotantis natura atræ bilis obnoxia, talisque uictus ratio antecesserit, quæ humorem hunc aggregarit. 4. Si eo tempore quartanæ febres populariter fiant. 5. Si homo lienosus sit, uel febres erraticas passus.

6. Si augmentum & status plurimum contraria fuerint. 7. Tenuescque & albæ aquosæque urinæ reddantur. Ibid.

25 Sed quotidianæ sunt, non primo statim die cum rigore inuadere, sed progressu temporis, idque refrigerationes extremorum, magis quam rigores. 2. Inæqualis pulsus cum primū accessiones fiunt. 3. Non deuri, nec denu dare corpora & pallia iactare cogi. 4. Non multū ac fre-

R 4

quens

quenter respirare, ac ueluti flāma ex ore efflare frigidumq; potum expectere. 5. Minimē sitire. 6. Urinas in

primis diebus tales quales quartanis incipiētes mingere albas aquosasq;.

7. Non sudare primis diebus, sed progrediente tempore hoc accidere.

8. Natura humidior uitaq; ociosa & plena crapulis, qualis pueris assidue fit. 9. Oris uentriculi mala affectio

& simul hepatis. 10. Cruditates plurimæ antegressæ, coquendi mora & acidi ructus. 11. Præcordia præter

naturalem habitū, cum febrile incipiunt intimescentia. 12. Color cū

pallore albus. 13. Hybernū tempus. 14. Status temporis humidus.

15. Accessionum principium circa uesperam. Ibid.

26 Continua ardens exquisita omnia seruat eadem cum tertiana exquisita, præterquam quod non inuadit cum rigore, neq; ad infebricitationem desinit, & quotidiana ardens cū quotidiana exquisita, nisi quod ad infebricitationem, non desinit. Sic & quar

quartana continua cum quartana intermittente, nisi quod accedit quarto quoque die sine intermissione, nulla interpolita febris quiete, nec rigor in ea antecedit, nec sedit sudor. Ibid.

27 Cum ipse sanguis secundum naturam habens, trusus in locum fluxioni obnoxium putruerit: hic quidem affectus inflammatio est, si atræ quidem bili permistus dura, si amaræ erysipelatibus similis: si pituitæ, inflata. Simplex uero febris ex ipsa inflammatione accenditur, maximè ephemeris similis, quæ ex inflammationibus accidunt, nam & ipsa in generis inflammatio ex optimo sanguine fit. Liquet autem quod cum hic putrescere cœperit non amplius bonus, sed ad amaræ bilis naturam transit, unde illud triplex uniuersum simplicium febriū genus, biliosum, pituitosum, & melancholicum. eodem lib.

28 In tertianis cū apparuerint concoctionis signa de absynthio statim aliquid dabis: est enim medicamentum præ cæteris laudatum curandis

R 5 sto

stomachi ex eossione affectib. si præfertim, ex ipsius coma quantum sit satis melicrato intinxeris. i. ad Glauc.

29 Tertianæ cum uehementi, rigore accedit, quartanam uerò minimè uehementi uidimus. Torpet enim in ea rigendi uis, sed si diu teneat grauior molestiorq; efficit præter id quod nec statim ab initio hæc febris solet inuadere, sed alijs quæ antecesserint, subsequi, & maximè errabundis febrib. superuenire. Quotidiana uerò rarò absq; læsione oris uētriculi, sicuti rursus quartana absq; splenis & tertiana, absque iecinoris affectione. Ibid.

30 Tertianæ simplicis & exquisita indicatio ad maximum septem circuitibus completur, ex intermittentibus autem breuissima mitissimaq; est ipsa. Quod si sit spuria non item mitis erit, uidi enim hanc in puero quodam ab autumnino ad Ver productā. ad Glauc.

31 Rigoris ante statum non desinētis duplex est ratio, aut enim in accessio,

cessione febris cernitur, ut si paulò ante statum seu uigorē ipsius accessionis desierit. Cuiusmodi est, qui ex uitrea illa pituita frigida oritur: aut in morbo uniuerso, ut si non ante statū totius morbi desinat, cuiusmodi in quartana accidit. Eius enim summus uigor nō nisi cum diminui rigor cœperit agnoscit. In tertiana uerò principio quidem uehemens cū fuerit, tamen ante statum quiescit. i. in 6. Epid.

32 Simplicem singulorū morborum affectum non solum per se, sed etiam per ea quæ accidunt cognoscere expedit, ueluti in ea febre, quæ tertiana dicuntur, non hoc tantum aduertat si tertio quoq; die fiant accessiones in sanitatem, uel in febricitationem desinentes. Nam si duæ tertianæ sint, aut duæ quartanæ, tertianæq; quolibet die, quartanæ uerò tertio quoq; accendantur necesse sit, ita ut duas tertianas, unam quotidianam putes, & duas quartanas, unam tertianam existimes profectò in errorē maxi-

maximum laberis. Quamobrem etiam accessionum forme diligenter inspicienda erunt. 2. de Crisib.

33 Febres ardentes non ex sola bili retenta, sed ex incenso calore in uasis aëre etiam calido, cibis calidis, ex labore, uigilijs, ira, &c. gignitur. 1. in 1. Epid.

34 Naturam febris spectare oportet, ut crislum deprehendas, nam si sit uehementer calida, iudicabitur per fluxum: si debilis & flammæ extinctæ similis, longa futura est. Sæpe uerò etiam per egestionem licebit idem iudicare. 1. ad Glau.

35 In febre acuta & calida si calidus acrisq; humor ad uentriculū delapsus sit, non mouet periculosum est signum. Indicat enim facultatem sensibilem omnē propè iam absumptam esse. 1. in 1. Epid.

36 In febre calida uomitus quidē uarij significant, in intestinorum uenis, & concauo hepatis crudos inesse humores, urina uerò tenuis & aquosa in gibbo. 2. in 3. Epid.

37 Sym.

37 Symptomata febris calidæ duo sunt præcipua sitis perpetua, & calor uehementissimus, qui cùm tangitur ardere uideatur. 3. in 3. Epid.

38 Si in febre calida & ardenti uideris facultates omnes naturalem uitalem, & animalem uigore, & concoctionis signa appareat potes cum fiducia frigidam egro præbere, hoc uno seruato ne sit senex. 12. Methodi.

39 Febris calida fit ex putrefacta bili in uentriculo maxime, in stomacho aut concauo hepatis, nec usquã alibi. Præcipuumq; eius symptoma si crisis per fluxum e naribus fiat, qd accidit sanguine sursum elato uenatque erupente. in 1. Epid. & 3. morb. acut. aut ex flaua bili, aut ex pituita sasa fieri dicit.

40 Si æger aërem frigidum ob caloris interni uehementiam desyderare uideatur, & tamen operimenta ob externum frigus petat, signũ est mortis, maxime si post principium accessionis illud non accadat. 3. in 2. Epid.

41 Aëre frigido & si æger ardorẽ uehe-

uehementer sentiat spes certa nō est salutis: si uerò etiam nulla concoctio nis signa, & uires sint imbecillae nulla prorsus esse potest. 11. Methodi.

42 In febribus ardentibus nos calorem clystere ex oleo & aqua restinguere solemus, lib. de Clysterib.

43 In quotidianis causa rigoris alia est atq; febris. Hæc cum ex pituita putrida, rigor autē ex eo quod putrefactum non est accidit. In tertiana uerò bilis una utriusq; causa est. 2. de febrib.

44 Solent aut per circuitus quem admodum febres sic alij morbi partiales, ut lippitudines nonnulliq; aurium, capitis, oculorumque dolores, euenire quorum una causa est excrementorum aceruatio ob earū potentiarum, quæ in membris sunt, uel imbecillitatem uel robur, ob imbecillitatem quidem fortioribus à se plethoras & cacochymi pellētibus, suscipiētibus autem imbecillioribus. Veluti cerebrū & uniuersum caput, ad aures, oculos, tempora, labra, dentes
malas,

malas, palatum, gingiuas, gurgulio-
nem. Paristhmia atq; glandulas ex-
pellit. quod si hunc quoq; firmę sint,
ad pulmonem, fauces, pectus, uentri-
culum, gulam fluxio delabitur. Qua
ratione & inflammationes hepatis
per circuitum à vicinis partibus, uel
ex remotioribus una aliqua genera-
tur, augentur, ac per circuitū exaspe-
rantur, ob robur aut inutilis materia
à particulis attrahitur: Veluti in cali-
dis, etenim calor natura aptus est ad
conciliandas fluxiones. Proinde in
corporibus plenis magna portio ad
eas defluit partes, quæ uehementius
incaluerit. 2. de febr. b.

45 Febres quæ per circuitum non
fiunt, ut continua non ex unius mē-
bri affectu possunt oriri, nulla enim
pars in his est, quæ præcipuē sit offen-
sa, sed qui in uenis, & arteriis omni-
bus continentur humores præcipuē,
qui in maximis & plurimo calore a-
bundantibus delitescunt, aut ob aliam
quauis causam, quemadmodum in
ephemeris, aut ob putrefactionē fer-
uentes

uentes febrem accedunt synocham,
quæ à principio usq; ad finem nullā
habet intermissionem, at tam diu de-
iecerit hominem, donec humores e-
am gignentes consumantur, aut co-
quantur, aut utrunq; patiantur. Ibid.

46 Intermissionem uoco quando
febris in quietem desierit. Declina-
tionem uerò omnem eius partē quæ
uigorem ipsum subsequitur, usq; ad
secundæ accessionis principium. i. de
Crisib.

47 Quartanas ego theriaca propi-
nata curauì hoc modo. Primum ua-
cuabam quantū satis erat, deinde ab-
synthij succum offerebam. Postremò
electuarium theriacæ, quod bis uel
ter sumptum liberabat hominem. de
Theriaca ad Pisonem.

48 Cor primum si plus æquo inca-
lescat hecticam febrem generat, dein-
de iecur, sed non ex se ut cor, uerum
ob consortium cum corde, mox uen-
tricus, & post hunc quæcunq; alia
possunt consortij lege secum cor cal-
facere. Præter pulmonem, qui quia
humid-

humidus est & per respirationem assidue refrigeratur non potest. Cum igitur sola illa constiterit balneo ut caterræ siccitates curabitur. Enimvero commistus sit erysipelatosus affectus, prius cibo & potu, & ijs quæ apponuntur exterius refrigeranda, tum in uigore frigida confertim exhibenda, aqua tamen initio abstinendum erit, nisi sit ei assuetus æger nec sitim perferre possit. Refrigerantia autem si exterius nihil profecerint, intra corpus assumuntur, ut molles lactuce recentesque solummodo in frigidam aquam demersæ & ita assumptæ, uel si placet prius aceto diluto intinctæ, extrinsecus interim adhibito eiusdem succo, aut semperuiui, aut intybi, aut medicamine succo uuxæ acerbæ, & portulacæ cui parum farinae sit mistum confecto. Quod quidem duplici linteolo exceptum præcordiis prætendatur, donec repescere incipiat, deinde ipso ablato alterum admoueat: id enim omnium est præstantissimum. Gal. de marasmo.

S

49 Om

49 Omnibus hec̃ticis febrib. hoc proprium inseparabileq; adest indicium, quod allato cibo accendatur calor pulsusq; in magnitudinem, & uelocitate augeatur: lic ut uideatur oborta esse incompressa quædam accessio, id est, ab omni inæqualitate libera qualis alias febres sequit̃. In ijs enim tales insultus etiam absq; cibo solent accidere, in hec̃ticis autē nunquam accessio conspicitur, sed una febris perpetuò cōtinua est, ut illa que synochos dicitur. i. de febrib.

50 Febres hec̃ticæ ferē his de causis fiunt, cū pestiferus & malignus humor ad cor primū delapsus, tum ad hepar, & inde ad uentriculum ipsum penetrauerit: aut cum intemp̃rie calida & sicca uehementer laborānt pulmo, pectus, meseraicæ, aut cum ad intestina primū uel matricē ut renes defluerit materia, & inde ad cor ipsum perruperit. Quod uerò ad diaphragma attinet ubi semel ipsum subijt humor, necessariò moritur æger priusquam ad tabem perueniat,

niat, nec unquam curatum quenuā
hoc modo affectum meminī. 10. Me
thodī.

51 Optimum singulareq; in febrī
bus, quæ ex constipatione sūt reme
dium est uenæ sectio pro uiribus fa
cta, & obstructionis magnitudine:
iis uerò quæ est putredine, frigide po
tus post concoctionem. qua ratione
multos uidimus sanatos. 8. Meth.

52 Continentium febrium, id est,
synochorum una species est, quæ e
andem naturam cum diarijs sortita,
absq; humorum putredine in plures
dies extenditur: altera uerò contin
git ubi in omnibus uasis ac potissi
mum maximis æquabiliter succi pu
trescunt, quarum sanè febrium præ
sidium maximum si modo uires ua
lentes sint, sanguinis diminutio uel
usq; ad deliquium animi. Sin minus
ualida uirtus subest, aut ætas nō per
mittit tutius, quantum satis fuerit ui
sum principio detrahare quod defu
it iteratione supplere. Hoc uerò præ
sidio omisso in summum ægri disci

S 2 men

men ueniunt nisi eos, uel uirium robur, uel largum profluuium sanguinis, uel sudor copiosus ex manifesta pernicie eripiat. 9. Methodi.

53 Quibus febris accenditur propter mordentem acrimoniam ex calfacti attenuatiq; à sole, inedia, laboribus succi, maximum eius remedium est humidum nutrimentum, ediuerso ubi ob copiam humorum, uel obstructionem, uel phlegmonem, uel putredinem alicuius ex ijs humoribus. febris est orta, maximo malo est cibus. Quare hos quidē nec in febris inclinatione citra noxiā nutrias, ne dum accessione inuadente: Illos uerò, omni certē tempore, sed potissimum per inclinationem. Porro in omni ægro morbi summus uigor & ægrotantis uires erunt spectandi à quibus cibandi cōsilia petas. 10. Methodi.

54 In febribus quæ obstructione fiunt commodissima cibandi hora est postq̃ quieuit æger à dolore, & quæ sanus edere solebat. 11. Meth.

55 Vbi

55 Vbi ueliecur, uel uentriculum
præhendit perniciosissimum est an-
te accessionem cibare, ubi hæc abest,
quibus imbecilla uirtus est utilissi-
mum. Ibid.

56 Materiam febris putridæ su-
perfluam prouocatione urinae, uel so-
lutione uentris, uel sudore purgabis.
quod si in uentriculum defluxa, uo-
mitum elicientibus eliciatur. alioqui
non temerè in ijs proces-
seris. 1 2. eius-
dem.

S 3 DE



Minò quatuor sūt morbi tēpora, prīncipium, augmentū, summus uigor, uel status & inclinatio. Vix autem adhuc certo motum est, quod'nam ex ijs, morbi tempus debeat appellari. 1. de Crisib.

2. Sunt quidā morbi iijq̃ uehementiores quidem ut epilepsia, apoplexia, & huiusmodi quorum accessio, & inclinatio non longior est, quā capitis abscissio, ita ut tempora distinguere nequeas. Eiusmodi affirmant quidā symptomata esse ex alio morbo producta potius, quā morbos, sed eos unde profecta sunt quatuor temporibus contineri. de Temporibus morb.

3. Sepē quidem in morbis nullum reperitur sensibile ipsius uigoris tempus,

pus, sed quarta adhuc accessione indicia augmenti habere quinta superuenit accessio inclinationis adferens principia, quod idem & augmentis accidit. Nā sæpe prior accessio principium simul habet ascensum & uigorem, secunda enim manifeste uidetur statim inclinare. i. de Crisib.

4 Hydropilis nonnunquā ex durtie cōcaui hepatis ob ciborum corruptionem nobis, nec uidētibus, nec scientibus nata, cūm primum apparet principium sui facit ignotum, lib. de temporib.

5 Proprium cuiusq; morbi principium signis concoctionis definitur. Etenim eo usque principium morbi dum concoctionis signa appareant appellamus, cum autē apparuerint, augmentum uel accretionem. i. de Crisib.

6 Perfecte cōcoctionis signa sunt, quando in urinis subsederit aliquid album, læue, æquale & continuum. Debilis uerò quando ex aquosa mediocriter subpallida facta fuerit, aut

S 4

etiam

etiam turbulenta existens talis permaneat, Rufa etiam & tenuis ad idē genus pertinent. Itemq; quando ex crassa in tenuem mutabitur. Ac ubi quidem hæc fuerint nondū esse principij tempus absolutum significatur: Vbi uerò illa, principij finis erit. Ibid.

7 Principium etiam exactum significant in urina uel sola nebula alba, uel suspensio æqualis atque continua & alba. Præterea rubens nubecula & subsidentia talis, & absq; subsidentia probe colorata urina atq; crassitudine mediocris. Ibid.

8 Eas uerò quæ cum magno ac repentino certamine fiunt solutiones morborum (quæ præcipuè crises uocantur) febrium earum quæ ex calidis humorib. accenduntur proprias esse est putandum. Post hæc earum quæ cunq; membrorum sunt principatū habentium facile mobiles calidæq; dispositiones. 2. eiusdē.

9 Morbi leues & inualidi siue crisi ferè sanātur, at graues semper post crisim. Crisim autem nūquam quiescit, aut

ta, aut intermittente febre, sed in pa-
roxysmi motu percepimus, aut semel
quidem (ut memini) ad summum in
quiete. 3. de Crisib.

10 Concoctio perfecta nō nisi cit-
riter uigoris morbi tempora contin-
git, atq; hunc ut proximē quæq; cri-
sis attingit, ita laudabilis est: quan-
perfecta semel cōcoctione, crisis nul-
lo tempore mala esse potest. Ibid.

11 Primum & maximum instan-
tis bonæ crisis indicium sunt conco-
ctiones: secundum quod ab aliqua
decretoria prius indicetur, cui sanē
annexa est diei indicatoriæ potentia
& facultas: tertium quod subito fit:
quartum quod excretionis modus,
seu forma morbo respondeat ac con-
ueniat. Ibid.

12 Ex sudore optimē februm ma-
ximē calidarum crises fiunt, aposteri-
matum uerō, ex fluxu narium, eorū
quidem certē, quæ cæteris partibus
acciderint: at eorum quæ concavo he-
patis ex fluxu uentris cholerico, aut
ex sudore, aut ex uomitu, aliorum e-

S 5 tiam

tiam quę in pulmone pectore, aut hepatis gibbo fuerint, meliores exspu-
to crises, & morborum renum, uesi-
cæ, ac proximarum ipsarum partium exu-
rinis. Ibid.

13 Si febris exurēs sit, uel sanguis
ē naribus profluet, uel post uehemē-
tem rigore sudor multus & calidus
per totum corpus manabit, aut per
uomitum, aut per aluum biliosum a-
liquid excernetur, ita & tertiana uo-
mitibus & excrementis biliosis, & su-
doribus toto corpore fluentibus fini-
ri debet. Quotidianis plurimum pi-
tuitæ excernitur, & multi per totum
corpus sudores fiunt. Phrenitidem
finiit sudor multus præcipue si calidus
ē capite fluxerit iudate simul reliquo
corpore, interdum etiā sanguis ē na-
ribus fluēs: at lethargus & peripneu-
monia fluxum sanguinis non amāt.
Pleuritis uero medium obtinet locū.
Ibidem.

14 Sudores omnibus febribus pro-
prii sunt & præcipue exurentibus.
Finiūt autem quartanas febres, si a-
tra si-

tra simul cum eis atq; uaria excernan-
tur. Semitertianas uero si biliosa si-
mul & pituitosa, soluunt etiam paro-
tides, lethargos reliquosq; omnes af-
fectus capitis. Ibid.

15 Vbi quis subito liberat à mor-
bo omnino huic aliqua euacuatio ef-
fatu digna, aut abscessus contingit,
præcedente tamen insigni quadam
perturbatione, anxietate nimirum ui-
gilijs, graui somno, difficili respiratio-
ne, uertigine, doloribus capitis, colli,
stomachi. Aliorumque membrorum
nonnullis aurium sonitu, uanis ante
oculos imaginibus, lachrymis inuo-
luntarijs, labrorum agitatione tremu-
la, obliuione, præsentium ignoran-
tia, clamore assulta furenti & simili-
bus. Tumq; multo sudore erumpen-
te, aut uomitu non exiguo insequen-
te, aut uentre subito soluto, aut fluxu
sanguinis abundantí, aut simul his
omnibus contingentibus, hunc solu-
tionis modum uocamus Crisim: aliū
autem ubi non omnino absoluitur
æger, crisim imperfectā, & incertam
ubi

ubi scilicet, paulatim & citra illas perturbationes morbi solvuntur. Crilim per abusum. qui tres modi sunt, cum ægrotus est euasurus. 3. de Crisib.

16 Primum omnium dierum decretoriorum dicimus septimum esse, non numero aut ordine, sed dignitate ac potentia: omnes quippe decretoriorum notas sortitur. Nam plurimorum indicat & absolute, cum manifesta excretionem uel abscessu, & sine periculo uehementi. Estque ut plurimum quartus index illius. Nam si urinæ uel sputi, uel deiectionis, uel appetentiæ, uel cogitationis, uel sensus mutatio manifesta in quarto die contigerit, similis consequetur illam in septimo, bona uidelicet si ad salutem, mala si ad mortem. 1. de dieb. decretorijs.

17 Sextus dies est decretorius quidem, sed malus, quemadmodum septimus, bonus. Mihi quæuenit frequenter in mentem septimi naturam regi cuiuspiam benigno & clementi assimilare, sexti uero tyranno crudeli & immitti. Cæterum sexti diei ut septimi quartus

tus est iudex. At uerò naturam septimi maximū imitatur decimusquartus Proximi his sunt nonus, undecimus & uigessimus, propter hos uerò decimusseptimus & quintus, post hos quartus, hunc sequuntur tertius & decimusoctauus. Si quando autē in octauum, uel decimū subita morbi solutio incidat, similis ferè ei est, quæ sexto accidit. Ibid.

18 Dies omnes post quadragessimum prorsus languent, concoctione potius morbos & abscessibus, quàm crisi- bus terminantes. At usque ad quartumdecimum quidem magnæ sunt perturbationes in morbis, proximo loco sequuntur, quæ usque ad uigessimū habentur: quæ post hunc ad quadragessimum, paulatim uehementiā remittunt. Cæteros post illum contemnere uidetur Hippocrates, cū tamen sexagesimi, octogesimi, & centesimi rationem habeat. Ibid.

19 Tot indiciorum quot dierum decretoriorum differentiæ existunt. Cæterum in duodecimo & decimo-
sexto

sexto, nullum unquam indicatum uidi. In septimo uero ne numerare quidem adhuc possim. Ibid.

20 Dies inter uigesimum & quadragesimum decretorij sunt, hoc ordine boni 21. 28. 27. & 34. Reliqua multitudo prorsus facultatis decernendi est expers: ij sunt duodecim numero, nempe 22. 23. 25. 26. 29. 30. 32. 33. 35. 36. 38. ac 39. Ibid.

21 Ad distinguendum utriusnam sit indicium, si duos dies attingat, crisis dierum natura obseruatur, hoc pacto. Si ambigas utrum noni diei uel decimi sit indicium, si quidem salubre, perfectum, atque sine periculo sit, noni esse dicas si imperfectum, malum & periculosum, decimi Proportio actionem sic diei imparis magis est proprium indicium, si imparibus labore magis aeger, quemadmodum parisi si paribus quandoquidem in accessionibus indicia magis contingunt. Numerus sic. qui dies sibi tempora duo uedicauerit (Sunt enim tria, decretoria, accessionis initium, decretoria

torix motionis principiū & ipse indicij finis) magis sibi indicium assumet. Ibid.

22 Imperfecta indicatio est ubi ex morbo quippiam relinquitur, infida seu incerta, quàm morbi sequitur residua: Periculosa, quæ cum grauibus symptomatibus accidit: Obscura, quæ citra excretionem, uel euidentem abscessum euenit: Siue signis uerò euenire dicitur, quæ à nullo priore die indicata est: Mala, quæ in ægri perniciem desinit. Ibid.

23 Morbi tempora uel longa, uel breuia his foreprehenduntur, natura morbi, anni tempore, & excrementis. Ac natura quidem ueluti si ex cholera nigra fiat ut quartana, aut ex phlegmate, ut apoplexia, aut alioqui si sit longa, ut methridis, arthritides, ischiades, quæ & longum principium habent. At febris calida, pleuresis & peripneumonia, breue, statumque morbi proximū: adeò ut quāto cum acutioribus symptomatis dolor sit, eò breuius sit principium. Anni tempore

ni tempore uerò sic discernatur, si sit ægritudo orta æstate breuior status atq; principium, Hyeme uerò cōtra. Excrementis deniq; hoc modo, si statim cum ægritudine concoctionis signa sputo, urina, aut sudore appareant breue principium erit, sin tardius, longiora, reliqua cum expectanda. Ibid.

24 Vocetur iam peracutus morbus, qui ad septimum usq; diem extenditur, qui longius procedit simpliciter acutus. Et peracutorum quidam qui quartum diem attingit peracutus, qui uerò septimum, non exacte. Sic acutorum, qui ad 19. usq; porrigitur exacte acutus, qui uerò ad uigelimum, non exacte acutus. Ibid.

25 Crisis profectam fieri non potest, ubi multus humor ad minorem quandam partem corporis defluerit. Cum enim in eo capi non omnis possit, cogitur eò unde uenerat reuer ti, uel in partes solidas elabi, quod ubi accidit hominem mori contingit. 1. in 6. Epid.

26 Dies

26 Dies indicatorij per quaternarium ferè numerantur, ad uigesimū usq; suntq; his, 4. 7. 11. 14. & 20. à quo deinceps per septenarium, usque ad 40. ascendis, atq; inde rursus ad 120. per uigenarium supputans. Post 120. autem per circuitus mensium geminos, deinde per annos sitamdiu duret morbus. 6. in 2. Epid.

27 Post quadragesimum diē morbi crisis fieri non potest, neq; per sudorem, neq; per aliam euacuationis speciem, sed paulatim & cum tempore ex egestionibus, ac eiectionibus quæretur solutio. in 4. Aphorif.

28 In continuis febris ut fiat crisis numerandi sunt dies, numerādi sunt dies continuo pariter numero. In intermittentibus uerò per periodicos tantum paroxysmos. Veluti in continuis quidē quod indicat septimus, id in tertianis decimustertius, & in quartanis decimusnonus indicabit. in 3. Prognost.

29 Perfecta crisis etiam his sex signis agnoscetur, 1. Si purgatio sequatur

T

quatur

quatur coctionis signa. 2. Si sit cū
abscessu. 3. Si humores morbi cau-
sam purget. 4. Si ex latere ipso mor-
bis dolēte fluxus fiat ē directo. 5. Si
die critico. 6. Si cū lenitate & qui-
ete corporis non perturbatione. in 1.
Aphorif.

DE PURGANDI RATIO-
ne per sang. mētionem.

Sectio X I.



P Rincipes scopi mit-
tēdi sanguinis sunt
duo, nempe magni-
tudo morbi præsēn-
tis, uel imminētis &
uirium robur: qui-
bus si adiicias & florentem ætatem,
nil sermoni defuerit, modò sub ea p-
cedens sequensq; illam intelligant,
excipianturq; distincti one tātum se-
nilis atq; puerorum ætas. Gal. de ue-
na sect.

2 Quibus uoles ineunte uere san-
guinem

guinem detrahere si sit plenitudo, & potentioribus partibus ad infirmiores deriuare humores conabarís, ut inde sanguinem emittas, sin minus ex commodissimo quoq; membro. Ibid.

3 Quibus uenæ sunt amplæ ac refertæ si accidat & corporis macilentata affectio, & alius color ab albo, & caro rubricosa, ijs cum fiducia potes detrahre sanguinem. Quibus autē diuersa affectio est, non item. Ibid.

4 Vacuare puerum ante decimum quartum annum non est tutum quēadmodum nec senem post septuagesimum annum: nisi tamen in sene tā sanguinis copia est, ut uacuari sit necesse, & uires huiusmodi, qui non minus quàm in iuvene ferre possint. Tū enim non tam annorum, quàm uiriū & affectuum habenda ratio est. Minus uerò semper in sene, quàm iuvene trahendum est. Ibid.

5 In febribus, quæ cum accidente urgent uacuandi humores, non etiā nisi exigat morbus, ubi hæc aderūt,

T 2 quæ

quæ sequuntur, ubi scilicet simul cum febre sentitur circa os uentriculi anxietas morsus & imbecillitas, ubi distentione neruorum laborauerit, & uigiliae molestant, & uires egroti debilitantur. Item ubi uentris erit profluuiū, aëris ambientis exquisitè calida, aut sicca temperies, qualis est tempore medio inter canis & arcturi ortū, aut etiam ualdè frigida (ob hæc. n. in calidis locis aut frigidis admodū sanguinem mittere non audemus) ubi etiam regioni temporis huius status consentiet. Nam ubi non consentit uacuamus quidem, sed minus quàm si neutrum prohiberet) ubi natura ægri calidi sunt & sicci, ubi nunquam fiunt uacuati. Præterea & si diffusenti carnem molli & tenella constat corporis habitus (in ijs enim alijs uacuationibus, quàm sanguinis missione utēdum moderatè) eodem modo si supra modū crassi uel macilenti sunt, aut deniq; si seniores uel pueri. Hosce enim omnes integrè uacuare uerendum, neq; enim id sine noxa tolerant,

stant, sed paulatim, quoties dispositio
nes ita hortabuntur, inedijs, modera
tis frictionibus, clysteribus mollibus
contusionibus, atq; balneis. 1. ad Glau
con.

Hoc enim ex eo libro, de his maxi
mè, quæ ad deliquium animi & uiri
um exolutione pertinet collegimus.

6 Vbi corpus crudis humoribus
est refertum periculosa semper est ue
næ sectio. Corpus enim sic infirmius
redditur, maximè cum febris adest,
tum uix unquam ad se redire potest.
Gal. de uenæ sect.

7 In corpore lassitudine affecto, u
bi paululum uel circa sanguinem re
stitum, uel ultra processum est succis
audacter mittendus est sanguis: ubi
plus, considerantius agendum: ubi
plurimū in hoc omnino nullus mit
tendus. Inspicere & quantitatem cō
ueniet, ut uerbi gratia, si bonus san
guis exiguus sit, crudus uerò pluri
mus, in his abstinendum à detractio
ne sanguinis erit: Sin is quidem exi
guus, sanguis uerò copiosus auda

T 3 cter

Iter incidenda uena est: deinde alius
deijcere pro abundantis succi copia
& specie. Quod si quis detrahi sibi
sanguinem nolit deijcienda largius
est alius, aut si hoc illi sit quoque suspe-
ctum, alia ratione superuacuum est
uacuandum. 4. de sanit. tuen.

8 Si quis etiamnum sanus, nec ad-
huc quicquam latus sanguinis redun-
dantia grauetur, non statim huic mit-
ti sanguinem est necesse. Imò alij sa-
tisfacit inedia, alij cibi parcitas, alij so-
luta alius, uel purgatio, uel frequens
balneum, alij sola exercitatio, (ut pila
obequitatio &c.) uel multa frictio
abundè fuit. 4. Methodi.

9 Sanguinem missurum diligen-
ter antè omnia metiri oportet labo-
rantis statum. Cui enim exiguus est
in corpore sanguis, in hoc prius me-
dicamentis ad id comparatis corru-
ptos humores ad mediocritatem re-
ducere oportebit, tum uenam secare
deinde uictum idoneum præscribe-
re. Post hæc rursus uenam, si robustus
est æger, secare. Id uerò maximè fieri
debe-

Debebit, ubi crassus lentusq; sanguis erit. 5. Methodi. De hemoptoicis, hoc est, sanguinem expuentibus. Vbi (inquit) ex casu uel præualida acutaq; uoce uas aliquod in pulmone rumpitur, multisq; sanguis statim cū tussi expiatur, iniūgendum laboranti ut silentium agat, nec respiret uehementer præterea uena cubiti interna protinus incidēda à qua his terq; postea sanguis est derrahendus auertendi gratia, tum posca diluta bis tertius ternis horis potui danda, & emplasticum aliquod aut astringens medicamentum, ex posca diluta primū, aut malorum myrtorum uel decocto. Postero autem die (modo æger si robustus) ab ancipi iam uena parum detrahere, uictuq; & medicamentis eodē modo uti oportebit.

10 Si forte sectionis tēpore aut uenarum ora aperiantur, aut menstrui profluuium fiat, aut aliquid molle egeratur, intermissa sectione, excrementorum eiectorum uim omnem, & quantitatem spectare conueniet,

T 4

quæ

quæ si satis morbo fecerit, naturæ cōcedes totum opus : sin minus, quod supererit sectione perficies. 9. Meth.

11 Si quis sanguinis missione egere uidebitur cui interim uētriculi deiectionio contigerit phlebotomiam differes quoad cibus fuerit concoctus, & superflua uacuata sint. Sin alio q̄ sanguinis missione sint opus non differes etiam accidēte deiectione. Ibid.

12 Corpore humoridus æqualiter ualentibus repleto, purgari oportet phlebotomia si potest uel alia quolibet ratione idonea, ut mēstruis purgationibus, hæmorrhoidibus, exercitijs, frictionibus balneis uictuq̄ conuenienti. in 4. Aphorif.

13 Sanguinis missionem differre nunquam oportet, siue dies sit, siue nox, ubi in corpore sanguis feruere cœperit, sed eo magis acceleranda ne partes solidas prius inuadat. Gal. de uenę sectione.

14 Cū subito sanguinis fluxu quicquā parti acciderit noxiū, ueluti cerebro apoplexia. Ea enim ex pleno

pleno subitoq; sanguinis in cerebrū incubitu oritur. Tum exploratis uiribus, ætate consuetudine, & plenitudinis quantitate celeriter quoq; uacuabis, priusquam aliquam perniciē illa concilient. Ibid.

15 Memini in febre ex sanguinis feruentis copia, contracta, secūdo etiā tertio & quarto die, ad libras quinque detraxisse. Ibid.

16 Vbi uires infirmæ sunt tutius semper est, non quantum conuenit primum trahere, sed sæpius iterare, manu perpetuò pulsui admota, ut uirium robur cum satis minutum erit, sentiarur.

17 Hoc summum bonū est in sanguinis missione, quod potes sistere uacuationem dum opportunum uidetur, ac rursus, si quando animis sit sinere ut fluat, quousq; uidebitur tibi rectē se habere negotium, id quod non licet in purgantis pharmaci exhibitione. Nam quod semel in uentrem deuoratū est medicamen, quominus omne sit deuoratum fieri non

T 5 po

potest, neq; oblatis partem auferri ubi plus quam conueniat purgetur homo. de uenæ sectione.

18 Sanguinē detracturo in phlegmone hæc erunt expendenda, plenitudinis tum quantitas, tum qualitas, uirium robur & infirmitas, naturalis totius corporis habitus, tēpus, regio, antea acta uita, cibi potusq; copia quibus sit usus, consuetudo, res præter consuetudinem actæ, excretiones, præterea num crassior, aut gracilior sit factus. Plenitudo quidem quoad uires tanto creuisse cognoscitur, quanto grauior homo sibi uidebitur: altera, quæ quoad uasa uocatur, tanto, quantum auctus tensionis fuerit sensus. Virium robur ex partiū functionibus cognoscitur & ex pulsu. Si igitur tensiua sit affectio magisq; si phlegmonodis incidas uenam nil distinguens: at si degrauians sit, quoad uires non semper molienda est detractio, fieri enim potest ut sit talis affectio ab humoribus crudis per corpus collectis. Que succum frictioni-

ctionibus unctionibusque modice cal-
facientibus & potionibus cibisque
crassitudinem humoris incidētibus,
magis quam sanguinis missione ua-
cuare expedit. Ibid.

19 Vbi uehemens morbus & uiri-
bus æger, ualet profectō prudēs me-
dicus, nunquam prohibebit uenę se-
ctionem etiam si an ex redundantia
sit morbus ignoret. Quod si ex alio
quā sanguine esse certis signis cog-
nouerit, & fluat uenter, uomitusque se-
quantur, non iam secare, sed corrup-
tos humores corrigere prius oportea-
bit. 4. Methodi.

20 In febribus continētibus, quæ
ex styphone meatum accenduntur,
quoniam ualida plerumque uirtus est,
citra periculum uacuatione utendū,
in alijs morbis, potissimum ex corru-
ptis humoribus productis. 9. Me-
thodi.

21 Ego uenā in his affectibus nū-
quā dubitavi, secare podagra, arthri-
tide, epilepsia, melancholia. Reiectio-
ne sanguinis iam habitu quodā inue-
terata,

terata in angina, peripneumonia,
pleuresi, phlegmone, hepatitis, ophtal-
mia, fluxu sanguinis, tam ex uenis q̃
à naribus, & uteri suffocatione. In his
enim uenæ sectio certissimum est re-
medium, si uires & ætas supeditet.
de uenæ sectione.

22 Aestimare diligēter debet, qui
in ulcerosis ex lassitudine affectibus
sanguinem mittere instituerit sit ne
in thorace, an in lumbis, uel in capite
potius & collo tensio pulsansq̃ do-
lor. Sanguinem enim nō parum, sed
nisi quid obstat ad animi usque deli-
quium trahere potest, n̄s quidem qui
bus in capite dolor est ab humerali,
alijs uerò ab interna. Si uerò omninò
æqualiter ægritudo occupat corpus
ab ambarum media. 4. de sanit.

23 In transuerso nerui uulnere, de-
trahere largiùs sanguinem ac tenui
uti uictu, tum in quiete omninò ac
lectulo molli hominem continere o-
portet, tum oleo calenti ubertim in
axillis, collo, tendonibus, ligamentis
& capite uti. 6. Methodi.

24 Poterit sanē quis cōmodē sanguinē mittere, uel quacunq; diei noctisq; hora, si in febrētibus quidem inclinationem circuitus expectabit, & cibi uentriculi concoctionem. In alijs uerō sine febre affectibus ueluti lippitudine & similibus idem poteris. Si magnitudinē aut doloris, aut phlegmones, aut totius affectus expectaris. Quod si doloris nil sit eiusmodi quod urgeat, aut prohibeat, & tamen uenam iecare uelis, præstabit manē post circiter horam. de uenę sectione.

25 In mittendo sanguine obseruandum erit, ut quibus partes collo inferiores patiuntur, interior uena (quæ iecoraria & axillaris, & lienaris, & basilica dicitur.) in ijs uerō quibus partes supra collū ut facies, caput, &c. laborant, exterior, id est humeralis, seu cephalica: at ubi uena parti patienti propria obscurior fuerit media, quā & medianam, funem brachij nigram & matrem uocant, incidatur. 3. anatom. adm.

26 Par

26 Partibus proximè hepate superioribus affectis cubiti uena secatur, inferioribus uerò, poplitum malleolum. in 6. Epid.

27 Dolor oculorum, laterum, pulmonis septi transuersi, lienis, iecoris, & uentriculi secta uena, axillari leniatur, aut certè etiam medicamina. Coxendix uerò uterus & uesica per poplitum, & malleolorum uenas curantur. Renum aliquando ex cubito si recens sit phlegmone, & communitur sanguinis copia, sin sit inueterata ex poplite. Sic uteri inflammationes multo quàm magis quàm renum. de uenæ sectione.

28 Ischiades si causa est sanguinis plenitudo, primùm omnium sanguinis missione sunt curandæ, nequid tantum ex uenis pedum, sed ex cubito fieri oportet. 10. de comp. secundùm loca, & de uenæ sectione.

29 Ischiades, ubi non à frigore, sed ob impletas sanguine, quæ in coxa sunt uenas proueniunt, secta in poplite uena curabis. Scarificatio autem

tem nil prospicue eis prodest.

30 Fluxum sanguinis ex ore uenarum reſerato reprimere oportet, uenis cubiti ſectis, trahere uero, poplitum aut malieorum. Quod idem etiam obſeruari debet in cohibendis cingendisq; menſtruis. de uenæ ſect.

31 Vbi iecur aut pulmo phlegmonem contraxiſſe cœperint erit pariter, tum euellendus, tum educendus, qui eò confluit ſanguis, interna in dextro cubito ſecta uena, propterea quod e regione & ampla uia cū uena, quæ caua dicitur ſacietatem habet. Hac uero non comparente media ſecanda eſt. Quod ſi nec ea ſe oſtenderit, reliqua ac tertia eſt incidenda. Pariq; modo ubi caput fauces, palatū, os, aut linguam phlegmone tentare cœperit, incidere humeralem cubiti ſi ea non cernitur, mediam, ſi ne media quidem, internam. 13. Meth.

32 Liene affecto, perinde iuuerit uena ſiniſtro brachio ſecta iuxta digitum annularem, atque ſi internam ſecueris. de uenæ ſectione.

33 At

33 At partib. quæ in occipite sunt phlegmone afflictis, etiam eam quæ in cubito est uenam, nec non eam, quæ habetur in frõte incidere oportebit. Renibus uerò & uesica, & pudendo, & utero sic habentibus eas, quæ in curribus sunt sitæ, ac potissimū, quæ citra poplitem: Sin minus eas, quæ iuxta malleolum. 13. Meth.

34 Perpetuo in omnibus secanda quæ & directo est, ut si iecur phlegmone inuadit, sin lienem, quæ in sinistram. Ibid.

35 Sanguinis fluxum è naribus si uena secta, & cucurbita iecori appositæ non sedaris, frigefaciendum non est cerebrum, sed occipiti cucurbita affixa in aduersam partem reuellendus sanguis. 5. Methodi.

36 Secare arterias quæ in temporibus, & quæ secus aures consistunt: illas quidem, infestantibus oculos fluxionibus tum calidis, tum spirituosiss. Has uerò quæ secundum aures sunt, in uertiginosis maximè & his, qui calidis, & diuturnis spirituosissq; capit

tis doloribus, in medici consuerunt. Verum quia uulnerata arteria agra suppressi possunt, ob id eas incidere metuunt. Quamquam etiam magna absque aneurismate ad cicatricem perducere est facile totam transversum dissectam. de uena sect.

37 In melancholia & eius similibus morbis, si signa sanguinem uenarum esse melancholicum ostendant mediana uacuare, quantum conueniet oportebit. At si iam apta uena non esse melancholicum iuxta signa uideris cohibito sanguine uenam occludes. qui certissimus secundus est canon. 3. de locis affect.

38 In quartana, neque principio sunt adhibenda ualida medicamenta, neque alio modo uacuenda corpora nisi redundare sanguis uideatur, quod ubi acciderit & secta uena rubrum ac tenuem sanguinem compereris statim uenam esse crabis. 1. ad Glauco.

39 Hydropisim quoque in mulieribus ex menstruorum suppressione, aut sanguinis fluxu in naribus, aut uenis

V. retentis

retento, principio statū uenæ sectione curare oportet, antequā facultas defecerit. 7. in 6. Epid.

40 Quemadmodum fluxionē ad oculos cucurbita occipiti affixa cum tam reuulsione, ita cerebri fluxionē uenę frontis sectionem me, eademq̃ ratione. 1. de humorib.

41 Vbi iam melancholicus factus est humor crassus atq̃ plenus, sanguinem detrahare primū, deinde purgare. Si uerō adhuc crudius erit, prius purgabitur idq̃ summa cautione, ne in morbum incidat æger, nam si iam inciderit, purgandus non erit. de uenæ sectione.

42 In scirrhusa splenis affectio, p̃seuerante post adhibita medicamenta malo cucurbitas cum scarificatione affigito, aut uenam retro sinistra aurem secato, & detractō sanguine lenē partes cōfricato. 9. comp. secundū loca.

43 Cucurbita in ipsa parte, quæ phlegmone urgetur affigenda inter initia non est, sed ubi totum corpus uacua-

Uacuaueris. 11. Methodi.

DE CVRANDI RATIO.

ne per medicamenta soluentia.

SECTIO XII.

I.



Medicamenta purgantia uentrem omnia praesertim uero stomachum, quod sensibilis & nervosus maximè existat, laedunt & affligunt. Ob eamque causam eorum, quae boni sunt odoris id est, aromatum mixtio inuenta est, ne sola synceraque purgantium uirtus os ipsum uentriculi offenderet. 2. in lib. de uictus ratione.

2. Medicamenta mixta uel composita ex pharmacis diuersis, quorum unum protinus, alterum longo postsumptionem tempore mouere natum sit, omnino sunt purgando inepta. lae bide.

Addit Moyses.

Subito mouentia & lacticia & scammonia, per moram uero ut opo

V 2

panas

panacum, galbātum, serapium, succus cyrenaicus, & ammoniacum.

3 Aromatica semina medicamentis admixta, eorum maliciam corrigunt, & obtundunt, operationemque iuuant. Incidunt, attenuant quasi que uehiculū uias aperiēdo, cetera per meatus trāsuehūt. Qua ratione & ptisanā sumpto medicamento sorbere prodest, quod deorsum trahere id quod uia ex medicamento adhæsit, & qualitatem ipsius, seu saporem in gutture & stomacho manentem, tum mutare, tum temperare possit. Ibid.

Addit Moyses.

Si quis hodie ptisanum (ut ait) a sumpto medicamento lauando gutturi & ori præbeat, profectò totum statim medicamentum uomitu eliciat. Nec adhuc ualde usurpatum uidi, abhorrent enim ægri, si quis propinet. Quamobrem melius hodie receptum est, ut parum aquæ cum radice althææ, & eius semine, anisoque ebullitæ, deinde per saccharum colata detur, eluendis illis uiscosis aromatici-

maticis, saporosisq; qualitatibus. cui si addatur semen myrthi, nil magis aromaticum cum uiscoso cogere potest. Vbi autem hæc purgata sunt, iusculum gallinaceum dari commodè potest, & si sitim patiatur, æger pro myrthi semine in aqua miscetur psillium.

4 Medicamenta soluentia omnia attenuandi ui prædita esse oportet. Ea q; non nisi necessario adhibenda, atq; id non repente, sed si per uomitum purgandum est, prius eo sæpe excitato: sin per uentrem, eo emollito. 2. & 4. Aphoris.

5 Crudi omnino lentè mouentur ob crassitudinem & frigidam qualitatem. Si igitur medicamento pallantur, continuo meatus obstipabunt, quò melius ac consultius semper est concocta medicari. 4. de sanit.

6 Flauam bilem purgare non est difficile, sed atram & pituitam crassam lentemq; difficillimum, ultimo Aphorism. Quare uehementioribus in hac, quàm illa utendum medica-

V 3 men-

mentis .4. eiusdem.

7 Plenitudo humorum malignorum, quæ quò ad vires dicitur, soluentibus curanda medicamentis, multorum uerò quæ repletio quoad uasa. uenæ sectione. 6. de sanit.

8 Qui ex erosione uitiosi succi phlegmonem, in pulmone patiunt, si tussiant nec sanguinem reñciant, & ex fluxione capitis afficiatur, purgamenti præsidio quod diuersas facultates habeat, curantur. Cuius generis sunt nostræ pilulæ, ex aloë, scammonia, colocynthide, agarico, Bdelio, & gummi arabico, ad plures uidelicet, excrementorum purgandas species. Postea uerò etiã si res postulat, his quæ nigram bilē expurgent, utare capiti prouidebitur, ex cerati ufu quod fit ex rhapsia. 5. Meth.

9 In immodicis purgationib. semper humor naturæ molestissimus, in quem pharmacum exhibitum agit, primus uacuatur: deinde reliquorum quodq; pro tenuitate substantiæ sequitur. Qui uerò naturæ familiarissimus

mus est, ut sanguis postremus, ut si quod pituitam educit exhibitum medicamentum fuerit, prima quidem omnem ipsa uacuabitur, deinde flaua bilis, postquam atra bilis. Postremo uerò loco sanguis. Sic si quod flauā bilem educat detur, pituita sequetur, tum atra bilis, postremus sanguis erit. 3. de simpl.

10 Corpus medicamenti portionem sumpturum tribus antè continuis diebus lauare, & ita parari oportet, ut humores crassiores emolliant, & si quæ pars intensior sit relaxetur. 5. in 6. Epid.

11 Tumores biliosi & phlegmatici una plerunque, aut altera portione soluuntur ac curantur. Melancholici uerò ut cæcer, lepra, gangrina, &c. etiam quarta & quinta, uix curantur. in 1. Aphorif.

12 Melancholiam purgare sepius & mediocriter, & accommodatè nō solum ægris, sed sanis etiam prodest plurimum. 3. in 2. Epid.

13 Intemperantes & uinolentes

V 4

ueni

uentricus & gulæ deditos, nec purgatione, nec missione sanguinis magis opere iuueris; nam per uitæ intemperantiam rursus crudorum humorum, quàm ocysimè colligunt. quare ne is quidem manum admoueas. Eis uerò qui præceptis salutaribus obsequetur plurimū proderis, si principio ueris primū quidem uacua ueris. Dein ad exercitia salubremq; uictus rationem perduxeris. de uenæ sectione.

14 Fluxum uentris oportet quiete prius ad certam horam factā continere, tum pro qualitate & quantitate contentorum soluere, i. in 6. Epid.

15 Medicamentū p̄fuisse ex qualitate excrementorum sic agnoscetur, si mutata materia fuerit, nec ex intestinorum substantia corrasa ramenta habeat, si non sit sanguis purus si nil foetidum. Quod enim purū efficitur ex caloris uehementia procedit, quod foetidum ex putrefactione, quod melancholicum ex adustione. Ibid.

16 Sunt qui statim accepto medicamen-

ramento purgentur, alij nō nisi ægrē possunt, his quidē ualidiora, illis uerō ubi præsertim febris adest, remissiora omnia danda sunt. in 2. de morb. acut.

17 Medicamenta uirtutem minorem ac imbecilliores reddūt, ut nec cibi totum coquere, nec alterare possint quantum ante portionem. Propterea, post purgationem & minuentur cibis erit, & exhibendus, qui cōfacillimē concoquatur. Ibid.

18 Fluxum materię uel sanguinis non incommodē accidentem, neque cibis astringentibus, neq; similibus alijs cōuenit retinere. Retenta enim huiusmodi sursumq; relata febrē & hepatis inflammationes plerunq; attulerunt. 2. in 6. Epid.

19 Medicamentum propinaturum prouidendum est, ne quid accessionum uigore, aut criticis diebus præbeat. Omnino enim illis uis prodit atque corrumpitur, si humoribus ad contrarium uacuationi partem nempe ad superiora uergentibus detur.

V 5

2. in

2. in 6. Epidom.

20 Infantes purgaturi medicamē
nutricibus propinare solemus, ut ex
acte medicamen uirtutem sorbeant,
id uerò in cæteris quoq; animantib.
compertum est. Siquidē multi sunt
quibus solutus uenter est ex lactis ca
prini potu, credo ob scammonia &
lacticinia, uim quib. quorum ramis
uti solent caprae, alijs uerò membrorū
tensione capti sunt ex coturnicum e
su, quæ helleborum depasta erant. 5.
in 6. Epid.

21 Clystere uacuare ubi uires ad
huc ualidae, Glandibus uerò (uulgò
suppositoris) ubi sunt infirmæ. 3.
morb. acut. & 6. in 6. Epid. Clyste
ris ratio pro humorum qualitate ha
benda est, si enim in intestinis sint a
cres, rodentesq; humores ex abster
gentibus fieri clysmos oportet, qua
lia sunt mulsa & ptissana. Sin iam con
cocta uacuentur ex mitigantibus &
firmantibus. 6. in 6. Epid.

22 Dolorem colico sic curari qui
dam præceperunt, supposito lapillo
salis,

salis aut nitri, habere enim salem extrahendi facultatē, Tob. de colico dolore & 1. de humorib. Clysterem ex aqua salis ei conficimus, cui intestina vulnere putrefacto affecta sint, ut sic abluantur & putredo extrahatur.

22 Quibus corpus læue rarumq; est, & quibus obelum, aut macilentū nullum medicamentum est tutum. quare eos purgari convenit potissimum temperata uictus ratione, dein defuſione, leuibus, clysteribus, distillationibus, emplastris, glandibus, balneis & huiusmodi leuioribus curationibus. 1. ad Glauc.

24 Matricibus exulceratis & hemorrhoidibus, & ano clyster aptissimus est, ex lacte cui lapis uel ferrum sit extinctum. 10. de simpl. med.

25 Ego nō, quib. in diuturnis morbis uenter sistitur. (contingit enim id post longum morbum in conualescentia) aluum ducere soleo, non acris per inferna infusis, sed tantum oleo, id quod sauis similiter utile, 5. de sanitate.

26 Fe.

26. Febrem hecticam ex putredine, & obstipatione conflatam solutione ventris primum aggredi oportebit. Re uerò non succedente, infuso clystere ex oleo, aqua & melle.
10. Methodi.

27. Ulceribus intestinorum clysmi aptissimi sunt, qui ex simplicibus abstergentibus incidentibus, uel soporiferis & emollientibus, ac leuientibus ex parte compositi sunt uel omnino, id quod pro magnitudine, uel leuitate morbi. Miscenda autem his ptisfana & uinum aliquod astringens. 9. de comp. secundum loca.

Addit Moyses ex Ebilule filio Zor, ad Maraney filium suum prescribente med. soluentium rationem.

Obserua (inquit) medicamentis propinandis, ne quid temere agas. Vbi autem res postularet, concoctionem humorum preparato, & meatuum reclusionem, uiamque excrementis facilem. Tum prudenter quoque ad uacuationem accedito: Si enim frigus erit miscendum aliquid ex liquefacientibus.

bus, quale sal omnis generis & piper. Sin sit æstus, nil aliud præter ea, quæ uenter & stomachum cōfirmare possunt. Vt mastichen, anisum, absynthium, quæ utrique etiam tempore cōueniunt. addes præterea aliquid quod iecur & intestina à medicamento uolentia uindictet, ut sunt ficus, amygdalæ, oleum ex ficub. &c.

Ex eodem.

Medicamenta diuretica & cathartica, id est, urinam & uentrem subducentia, neq; cum uino fieri, neq; sumi debent: tantum enim abest, ut membra corrigant, aut emendant, ut eorum uitium augeant. Præterea solidarum partium ea natura est, ut uehementia medicamenta nulla ferre citra noxam possint.

Addit Moyses ex se.

Verum illud est, si uacuantia medicamenta ex uenenosis, & toxiferis qualitatibus constent, cuiusmodi sunt colocynthis, & turpetum, & catapodia. Sin nullo ueneno constent, sed sint pura & leuia, ut agaricum cum uino sumpta

sumpta multo plus conferunt, id quē
sum expertus in capitis dolorib. fœ-
licissimē. Colocynthis autem para-
tur ex nucleis ficuum, & amygdala-
rum. Electuarium uerò ex floribus
nymphæ, uulgò nenuphar, & ex o-
leo amygdalino si melius habere
uelis.

Ex Theminio.

Ad dolores ex medicamentis sub-
ortos. R. semen. nasturtij, quantum
conueniet, & lacti ebullienti impo-
ne atq; incoquito, tum tepidum for-
bitioni dato. Influit enim per uentri-
culum lac & intestina, repurgatq; ip-
sa à medicamenti malicia.

Addit Moy'es.

Verum est si modo lac sit caprinū.
At si (ut hoc ex corollario addatur) si-
tiant fortē uehementius æger, qui me-
dicamentum sumpserit, & calidiorē
uentriculum queratur, tum psyllium
cum aqua & serapio rosaceo exhibē-
dum erit.

Rursus ex Theminio in Isagoge.

Cepe contusum naribusq; apposi-
tum

tum nauseam ex assumpto medicamento cohibet, & uomitum.

DE PURGATIONE

per uomitum, Sectio XIII.

1.



Vllam bilis portione in uentriculum immisit natura, ne ipsum exactiori sensu, quam ieiunum præditū, si quando ipsa influat, cogeret alimentum, priusquam cōcoctus esset detrudere. Et paulò post.

Quamobrem rectè præcipiebant ueteres medici, uomitus à cibis in singulos menses repeti, alij quidem semel, alij bis. Omnes ñ qualitates in eum usum comedendorum acres & absterforias deligere consuluerunt, ut pituita omnis à corpore purgaretur. Nam quæ mordent & abstergūt cribaria biliosa sunt, & cancochyma omnia. 5. de us. partium.

2 In lassitudinibus cruditati copulatis uomitu minimè utēdum ne succres

ci reuellantur, intrò mordaces, qui uel
 delictet carni cutiq; inhærent, sed de-
 uitanda, q̃ refrigerant astringuntq;
 cutim omnia, ne à cute ipsa motum
 humorum ad interna concitent, quē
 admodum uitantur exercitatio, fri-
 ctio, fomentatio, balneum, unctio-
 nes, iracundia, & quæ humores ab al-
 to euocare possunt, ubi circa hepar
 cruditate coaluerint. Nam nec qui
 extrà sunt, rectè intrò reuocantur, nec
 qui intus, foràs. Imò qui foris sunt le-
 uiter per habitum educendi erunt. 4.
 de sanis.

3 Humorem melancholicum per
 inferiora semper, nunquam per uo-
 mitum purgari oportet. in 4. Apho-
 rism. Et paulò post. Humor
 acris tenuisq; sursum petens hyemis
 tempore non est purgandus, sed con-
 sumendus.

4 Syncopen ex humoribus acriter
 stomachum rodentibus calida aqua
 sola, uel oleo mixta per uomitum cu-
 rare oportet, qui si tardius sequatur
 pectore & plantis manuum ac pedū
 calida

calida aqua lotis accelerandus erit. Si
uerò ne tunc quidem moueatur, ole-
um quàm poteris optimum calefa-
ctum præbere. Etiam si enim uomitū
non accit, plerunq; tamen materiam
egestionis emollit. 1. ad Glauc.

5 Quibus lenta pituita infixæ est
uentriculo, si ad uomendum apti sint,
non inutile fuerit per radiculam ex
oxymelite uomere. Sin uerò nec len-
tus humor sit, nec crassus, utiq; abun-
dè fuerit à ptisanæ solius cremore uo-
muisse, item à mulsæ. Quo casu sumē-
dum utriusuis plus est, quàm uel nu-
trimenti, uel etiam deiectionis causa
sumeretur. 7. Methodi.

6 Narcissi radix uim maximam e-
trocandi & uomitum ciendi habet.
Qui mobrem & hīs quibus humorē
cibi superfluum purgari opus est, uel
tres ante cibum præbère soleo. in 6.
Epid.

7 Qui ad uomendum sunt faciles,
hīs purgando phlegmate corpori an-
te cibum optimus est uomitus. Qui
uerò difficiles & inepti, hīs melius est

X

post

post cibum uomere. de morb acut.

8 Sæpe iam repetit Hipp. uomitum ad purgationem crassiorum & lentorum simul humorum in uentriculum confluentium, facere plurimū. Iam nemini uomere quotidie assuefacto uomitus prohibetur. Illis uerò, qui rarò, non cōceditur. in Hipp. de natura humana.

9 Motus post potum uehementior, uomitum mouet ex humorum ad superiora elatione, quod in nauigantibus cernitur. 4 Aphorif.

10 Quæ ad uomendum exhibentur, lente sumi debent, ut per otium liceat hīs, quæ in uentriculo sunt crassiora incidere atq; attenuare. in Hipp. de natura humana.

11 In hīs qui temperamēto sunt bilioso, si bilis uentrem superiorem peccat, per uomitum expellēda est, post exercitationes aqua propinata, nam uino tunc utēdum non est, nisi difficulter uomāt ex aqua. Quippe eiusmodi quædam naturæ sunt, quibus uinum dulce, ubi aquā præbiberint, est

est concedendum. Præterea etiã magis ubi temperamentum eorum ab initio, calidius siccius q̃ fuit, uomitio petenda est. Quin & exercitari his utiliùs, non acutis exercitationibus & præuegetis, sed potiùs tardis & mollibus. 6. de sanit.

12 Cerebrum omne cibus pituitosior crassiorisq̃e succi. Eccitat uerò nausẽã omninoq̃ uomitioni est accommodatius, si concinnatum cum incidentibus. & calefacientibus fuerit, ueluti oleo liberalius coctum & post cibum datum. 3. de alimentis.

X 2

DE

324 RABI MOYSIS
DE CVRANDI RATIO/
ne per chirurgiam,
SECTIO XIII.



Vtrida ulcera quum
ambientes partes de
pascunt, nomas pro-
priè appellant. Qui
affectus uehemētis-
simis medicamentis
indigent, ut sæpe etiam in ijs, can-
terijs utamur. 5. de comp. secundum
loca.

2 Carbunculus ulcus est crustam
citò cum ualida phlegmone circum-
stantium particularum excitās, adeò
ut febres uehementes & extrema pe-
ricula inferat. Quare ipsi particulæ la-
borati quod ad inflammationem at-
tinet, imponi cataplasma oportet q̃
ex plantagine cōficitur, aut quod ex
discocta lente, scilicet miscendo his
micam panis, qui furno sit coctus. Su-
per ipsum uerò ulcus ualēs aliquod
medicamentum cuiusmodi est An-
dronis, &c. Liquariq̃ cum uino dul-
ci ad

ci ad sordium crassitudinem dedebit. Scarificari etiam post sanguinis missionem alienum non est, sed incisiones altiores mediocribus propter infestantis humoris crassitudinem esse debent, & inflammatione cessante ad cicatricē similiter reliquis perduci. Ibid. & 14. Methodi.

3 Sinus liquidioribus: Caua uerò in superficie corporis ulcera phar-
macis crassioribus indigent. Quare merito id genus uitij, ceratū ualde abstergentibus admiscemus in sinibus oleum uel rosacei plurimū. 2. de cōp: secundū genera.

4 Quibus inter pulmonem & thoracem iucceuerunt puris sordes, hi nunquam nisi multitudine empyematis præmente (quod ex spūto ceratur) cauterio sunt curandi. in 6. Aphorism.

Addit Moyfes.

Non contradicit ijs, quæ secundo de simpl. dixit, nisi enim summa sit necessitas, non præcipit cauterium.

5 Cauterium neq; ferro, neq; me-
X 3 dica

dicamentis, urentibus adhibendum, nisi quando ingens morborum vis fuerit, & humorum magna corruptio, quale quiddam accidit ulceribus ægrè sanabilibus, & malignis. 6. in 6. Epid.

6. Hydropicum refecare ventrem non est tutum, nisi si quādo tanta humoris putrefacti copia est, ut uirtutē prorsus obruat. Pulmonis autem ulcus maturē aperiendum antequam putrefiat. 7. in 6. Epid.

7. Postquam ulcus secueris & pus uacuaueris cauendum est, deinceps ne oleū aut aquam imponas. Quod si quando uulnus abluere oporteat melicrato, uel oxycrato, & uino, & mulso est utendum. 2. ad Glau.

8. Ulcera maligna, acriora medicamina postulant, & quæ igneas uires possideant, quale est misch Chalcidis, Arsenicum calx, atq; sandaratha. Sæpe uerò ubi ista cesserit admouemus ignem. Ibid.

9. Putredini apta medicamenta sunt, oxymel, farina, orobilolū, uerū itē faba-

fabacea, sal Trochisci Andr. Polyidæ
Passionis, &c. Ex quibus diligendū
cuiq; parti maximē congrua. Ibid.

10. Cancrī morbum per sui initia
sæpe sanauimus medicamentis, quæ
atram bilē educerent, ubi uerò in mo-
lem insignē attollitur curari sine chi-
rurgia nō potest. Nempe toto quod
uiciatum est exciso. Non caret tamen
id periculo profluuij sang. ob uasorū
magnitudinem præsertim si fuerint
arteriæ. Quod si laqueo excipias, per
consensum afficiuntur continuæ par-
ticulæ. Sin radices exurere uelis, non
deest & principibus partibus per-
iculum. Ibid.

11. Incisæ post aures arteriæ graui-
oribus capitis affectibus multū pro-
sunt. cuiusmodi sunt hemicrania, uer-
tigo, caros, &c. At si quando uapo-
res noxij sursum ad reiformem plex-
um ferantur, tum nō ita fortasse po-
test hæc incisio conferre. . . de locis
affect.

12. Vbi neruus punctus est, dolo-
rem qui ex necessitate incidere huic

X 4

quām

quàm reliquis partibus maior solet
 exsentiendi quod obtinet acumine,
 imprimis mitigare commodum est,
 & cutis uulnus apertum inglutina-
 tumq; custodire, quò per id ex neruo
 uulnerato sanies effluat, totumq; cor-
 pus superuacuis humoribus libere-
 tur, & phlegmones generatio prohi-
 beatur. Tertius uerò etiam fuerit si
 quis cutem latius incidat ac totū cor-
 pus sanguinis missione inaniat, utiq;
 si fortis sit uirtus. Si uerò uitiosis suc-
 cis repletum sit corpus protinus pur-
 gare medicamentis humori dominan-
 ti commodis. Aqua uerò calida non
 ut ne humida iam ex se substantia in-
 terum excoacta, & humectata solu-
 uatur ac putrescat, sed potius oleo ca-
 lente fovere, ut omnis sic materia di-
 geretur. 6. Methodi.

13 In Cancro, ubi totum quod uis-
 tiosum est excideris, sic ut nulla su-
 perlit radix, sines effluere sanguinē,
 nec properē eum inhibebis, sed pri-
 mendo potius uicinas partes, ex pre-
 mes ex ijs succum crassiolem, mox a-
 lijs si

his similiter ulceribus curabis, ultimo Methodi.

14 Strumæ, glandulis in scirrhum affectum mutatis factæ, his maxime, quæ uel salinam, uel lac, uel genitale semen, uel pituitosum quendam humorē in mesenterio, faucibus uel larynge generant, curandæ similiter alijs partibus ad quas tum uenæ, tum arteriæ perueniunt. Ut reliquarum, quæ quod in medio uasorum in diuerſas partes diductorum habent, implent pro cuius diductionis firmamento sunt, earum inquam alia curationis est indicatio, qua simul cum uitio pars ipsa tollitur. Quod fit dupliciter, nempe uel totum quod uitiatum est excidentib, nobis ueluti in Cancro, uel putrescere id medicamento cogentibus. Ibid.

15 Abscessum exteriorum, quæ Atheromata, Steotomata, & meliceres à similitudine contentorum dicuntur, curationis indicationes sunt communes, id uidelicet quod continetur, uel digerere, uel putre reddere, uel

X 5 exci

excidere. Meliceris igitur à contento humore mellis simili sic dicta, triplicem illam admittit curationem, Atheroma uero duplicem quippe, quod tum excidere, tum putrefacere tantum licet, Steatoma unicam manuum operationem, excisionem cum nec putrefieri possit nec digerit. Ibid.

16 Amouendarum cicatricum pterygiorum, & similium per chirurgiam ratio, tripliciter indicatur. Prima est ut quod maxime tempestive potest cures. Secunda ut citra dolorem. Tertia ut tuto & certo. In quo postremo tria sunt propria quibus intentus sis oportet. Vnum primumque ut omnino absolutionem operis consequaris. Alterum ut certe non ledas, si non assequaris finem propositum. Tertiū ut uitiū ne ut aduertatur prohibeas. quibus consideratis cognosces chirurgiæ potissimum, aut quando medicamentorum ope sit curandum. Ibid.

17 In excisione, plerumque cum affectu ipso etiam pars affecta exciditur, ut

tur, ut in herniosis aliquid peritandi
in testiculis & cruribus, una cum uari-
cibus ipsæ uenæ. Sic in naso tunica
cum polypo, & foratus dens cum fo-
ramine. Ibid.

18 Pierygij sanatio dum paruum
adhuc est & molle, per ea quæ deter-
gent perficitur ut sunt trachomatia.
ubi magnum durumq; euasit, chirur-
giam postulat. Ibid.

19 Vbi multum puris erit in oculo,
uacuabimus diuisa tunica, q̄ cor-
nu est specie, paulò supra locum quo
cōmittūtur uniuersæ tunice (quæ vo-
cant irim seu coronam) aut per medi-
camenta, quæ paulatim expellāt, aut
cōcussione ut ab eo loco defluat hu-
mor. Ibid.

20 Medicamenta detergentia si-
mul & excalfacientia laxatis inferius
columellis, nec tamen inflammatis
mirè conferunt. Eas autem excisione
curare consueuimus, quando præser-
tim albiiores & sanguinis inanes fue-
rint. 6 de comp. secundum loca.

21 Oculus quādo acerrimè est sen-
sus,

sus, si quando sit læsus mitiora medicamenta infundi sibi postulat' quale est oui humidum ophthalmicis mixtum, superiorem genam, primum leuissimè attollendo, nullaq; cōcussione quemadmodū in capite, facta. 13. Methodi.

22 Oculus totus cōtrahitur, & intrò pellitur ex cōuulsione excisæ corneæ tunicæ, effluitq; humidum aliquid tenue album & liquidū, ea parte, qua acum affixerit chirurgus, qui est humor noxius. 10. de us. part.

23 Conuulsioni nerui conferunt, quæ ab alto saniem educunt omnia, sed commodissima sunt, quæ cū mediocri calore exiccāt. 3. de comp. per genera.

24 Conuulsioni nerui conducit sulphur, quod ignem expertum non sit, quodq; lapidosum non est, sed omninò tenuium partium, si tantum eius tenui oleo mixtum sit, dū quod ex utrisq; mixtum erat, sordium balnei habeat similitudinem. Item Terebinthina resina per se quidem in pueris, &

is, & mulieribus, & ijs generaliter, qui non
 noli sunt carne. Cum Euphorbio
 uero in ijs, qui dura non secus autem
 & propoli non per se modo, uerum
 etiam cum Euphorbio mollita. Quod
 si durior esset, cum tenui quopiam o-
 leo, quin & sagapeno in duris corpo-
 ribus sit usus utique cum oleo & tere-
 binthina id miscendo, sed & opopa-
 nace ad eundem modum, quo & sa-
 gapeno. Et lota calcem oleo similiter
 admixta, & applicata. Maxime si ma-
 ri per æstatem sub æstu caniculæ lota
 sit. 6. Methodi.

25 Si multum cutis est adaper-
 tum & nervus per directum diuisus appa-
 reat, non iam Euphorbio & similiter
 acribus, quæ emplastri modo appli-
 cantur uteris, sed calce optimæ elo-
 ta, in multo oleo soluta, & calida ap-
 plicata, aut pompholyge similiter lo-
 to, & largo rosaceo liquato siue sale,
 tamen applicato. Ibid.

26 Humoris, qui in hydrocelis ui-
 situr, sicut & aquæ in ascitis conten-
 ta uacuationem, uel medicamentis,
 quæ

que digerant molimur, uel chirurgia
in hydrocele quidem immisso sypho-
næ, in ascite uero adhibita punctio-
ne (quam paracentesin uocant) exci-
sa quadam parte peritoneo. In colu-
mellas uero non erit properandum,
ad eas excidendas, sed quando exiles
erunt, & ad loci tenuitatem redactæ.
ultimo Methodi.

27 In uulneribus uētris principio
id agendum ut recondantur, si quan-
do intestina exciderint: ne in tumo-
rem surgant, & per angustum fora-
men immitti nequeant. Secundo ut
sumat. Tercio medicamentum impo-
natur. Quarto ne qua præstantior
pars inde simul afficiatur. 6. Meth.

28 In uulneribus uentris situs la-
boranti appositus fuerit, cum in infe-
riore parte factum uulnus est, si sur-
sum uergat, cum uero in superiorib.
si deorsum. Ex qua ratione conueni-
et, si in dextris sit uulnus corpus in
contrariam partem inclinetur. Si ue-
rò in sinistris, in dexteram, sicut quæ
uulnerata pars est semper altiore
locum

docum occupet. Ibidem.

29. Omni recens facto uulnere, nisi in uentre sit expedit ex ipso statim, sanguinis plus minusue effluere, quippe phlegmone minus tentabitur, tunc ulcus ipsum, tum quæ illi sunt circumposita loca. 4. Meth. ex Hippoc.

30. Sanguinis eruptionem ex uulnere putrefacto sistendum est, uel crustificis medicamentis, uel ignitis feramentis, uel certe pro incrustantibus medicamentis, uti pharmacis astringentibus. melius erit, qualia sunt, Chalcitis misceatur, atramentum, hæcque siue uistis, siue crustis. At si ex uasis effluat sanguis, prohibendus est, aut ad contraria reuellendo, aut ad uicinas partes deriuando, aut totum corpus refrigerando. Præcipue uero partem afflictam, frigida pota, uel infusa, aut pusca & uino acerbo, quod *στυφνόν* uocant, aut alio quodam astringente medicamento refrigerandi uim habente. 5. eiuidem.

31. Cui sanguis ex alto uulnere profluit, si uena sit unde profluitur citra uin-

uinculum medicamentis suppressendi sanguinis uin habentibus res tenenda est, qualia sunt emplastica ex frixa resina, & farinae triticae tenuissimo polline & gypso, & alijs id genus confecta Sin sit arteria duorum alterum aut uinculo amplexi, aut tota praecidere utique transversam. quod praecipue in his sit, quae ex profundo loco assurgunt commodè praesertimque per angustas, uel principes particulas. Quippe ita retrahitur utraque pars ad se relaturque ac integitur superiacentibus corporibus uulnus: tutius tamen est utrumque facere, & uinculum uasis radici inijcere, & quod deinceps habetur praecidere. *Ibid.*

32 Ulcera inueterata per sanguinis missionem crebro curamus. Quod si pars affecta uel luore nigrescit, uel rubra iam conspicitur sanificationem addimus. Exin spongia sicca magis quam humida detergemus, tum & medicamenta exiccantia apponemus, uenamque postea iterum si sit apud secantes. 4. Methodi.

33 Vlcera labra si sint dura, callosa, liuida & nigra, excidere ad uinū non est dubitandum. Sin diuturnum sit, lentē uacuandum. Ibid.

34 Fistulam à medico aperiri, non nisi post diuturnū fluxum suppressam tutō licet. 2. in 6. Epid.

35 Vlcera maligna etiam clystere ex mulsā & cineris aqua purgare licet. Minus autem mulsæ ubi infirmior ægritudo est requiritur. Item ex uino & mulsā, sed mulsā melius deterget. Vbi autem his ritē purgatus est locus affectus ex solo uino, bonū est clysmo uti, deinde unguentum proprium apponere, quod spōgia uino madefacta ulceri alligetur. Ligandi autem modus esto, ab inferioribus ad os usq; ulceris stricto emplastro. Idq; ternis quibusq; diebus soluto, & renouato unguento. Quod si forte inferius dolor iaceat, labrum uerō ulceris superius, ita ut commodē dolori applicari medicamen nō possit, excisione inferius ad dolorem facta uacuandum erit. 2. in 6. Epid.

Y

36 Affe-

36 Affectus unde primum maximumque imminet periculum, primus curari atque etiam interdum solus debet, ut cum ex uena arteriaue sanguis immodice profluit, si totum uas pertransuersum praecideris, ulcus quidem eius postea sanare non poteris, periculum tamen quod ex sanguinis profluvio impendebat, sustuleris. Sic nervum punctum saepe cogimur transuersi praecidere quoties uel conuulsiones, uel deliria, uel ambo magna aegreque sanabilia, superuenire uulnerationi cernimus. Similiter ubi luxatio cum ulcere, in aliquo maiorum articulorum incidit, ulcus prius sanamus, luxationem insanatam relinquimus. 3. Methodi.

37 Partium quae cum aliquo praeter naturam tumore exulceratae sunt, earum prius sanandus est tumor. Vbi autem labra tantum ulceris decolorata duraue plusculum fuerint, excidenda ea sunt ad sanam usque carnem. Sed si altius serpiunt deliberatione est opus excidendum ne, quod praeter

ter naturam cernitur, an temporis
spacio curandum, & consulendus æ-
ger. Ibid.

38 Optimum omnium quæ noui
medicamentorum, quo etiam ad ce-
rebri membranarum, & sphagitidū
uenarum hæmorrhagias tutissimè u-
temur, est quod subiiciā. Recip. Thu-
ris partem, aut eius mannæ, i. Aloës
partem s. misceantur ita, cum oui can-
dido, ut perueniāt ad crassitudinem
mellis, postea leporis mollissimis pi-
lis excepta, tam uasi, quàm uniuerso
ulceri liberaliter admoueantur, alli-
genturq; forinsecus fascia ex tenui
linteo, cuius fasciæ primi quatuor
quinque uel amplexus, ipsi profluen-
ti uasi inijciēti ducenturq; mox uer-
sus eius radicem, nisi quibus partib.
id non licet, ut in cerebri inuolucris.
His factis ubi tertio die solueris si tur-
to adhuc medicamen ulceri adheret,
aliud rursus sup impones deligabis-
que ut antea. Si uerò prius linamētū
deciderit, impones alterū, ac sic quo-
ad carne muniatur curandum uas e-

Y a rit,

rit, particula uulnerata à principio fur-
pina mediocriter seruata. 5. Meth.

39 Quæ de profundo erumpunt,
nec uinculo, nec deligatura, nec cau-
terio, sed reuulsior & ad uicinia loca
declinatione, nec non cibo & potio-
ne emplasticis, refrigerantibus, & a-
stringentibus curanda. Ibid.

40 Varijs autem instrumētis, pro
partium proprietate id fiet ueluti, in
intestina per clysterē, in uterum per
metrenchytas, in uesicam per cathe-
teras medicamenta, immittuntur. I-
bidem.

41 Phlegmone suppurans nō est
incidenda protinus, sed digerēda me-
dicamentis ad id ualentibus. Quod
si quando puris copia medicamen-
torum uim superet secare abscessum
oportet, eò potissimum loco, quo est
editissimus. Post sectionem medica-
men quod sine morsu siccet impone-
re. Si uerò computruisse aliqua por-
tio uidebitur excidi etiam eā necesse
est, sectione myrthi folij, figura non
planē magna longitudineq; maiori,
quā

quàm latitudine, in inguine per trāfuerſum ducta: non autem per rectitudinem membri. Nam ſic cutis, dum membrum flectitur melius ſibi applicatur, & tandem manna affectam partem implere. 13. Methodi.

42 Si ab humida ſubſtantia aut lēta, & craſſa ſimilarium corporum, aliquando membrum offendatur (nam intermedia illorū ſpacīa, ut plus uel minus, huius uel illius humoris continent, ſic membrum oſtendunt) purgare ipſum oportet incifione, uel medicamen abſtergente. Primū, tum humiditatem ipſam medicamentis membro appoſitis repellere. Gal. in arte medicinali.

43 Si eas quæ ex fluxionibus ſiūt inflammationes ſcarificaueris magnum adferes malum, ac per initia præſertim. Quæ autem iam in ueterate exiſtunt, & poſt totius corporis uacuationem, quaſdam durities atque nigrities retinent, ab his per ſcarificationem auferre ſanguinem nil prohibet. 2. ad Glauc.

44 Inflammationem curaturum principio uacuare totum corpus oportet. Deinde inflammata particulam profundere & linire, ijs quæ repellendi quod influit uim habeant. Vbi uerò non amplius humores influunt, sed quod prius fluxerat hæret iam membro impactum, scarificare. Ibid.

45 In quibus difficulter tumor ad suppurationem peruenit, nec facile discuti potest, sed suspicio est humores crassiores, & tenaciores ibi impactos esse, in ijs tamen conueniet, ea quæ fit per profundiores scarificationes curatio. Cōuenit etiam id quod ex caricis pinguibus, dulcibusq; & decoctis conficitur cataplasma. Cuius præparatio est hæc. Decocto caricarum adijce aliquando farinā hordeaceam, aliquādo panem syncomistum. Hoc est, miscellaneum, qui ex generoso confectus sit tritico. Ibid.

46 Quoniam in ipsa ulceris primæ carnis generatione duplex excrementum oritur: alterum quidem tenuius,

nuius (quod in ulcere sanies dicitur)
alterum uerò crassius, quod nuncu-
patur sordes. Atq; ex tenui quidem,
humidū ulcus redditur, ex crasso au-
tem sordidum: Duplicibus sanē me-
dicamentis est opus, siccantibus pro-
pter humiditatem, & expurgantibus
propter sordes. Qualia sunt, thus hor-
deacea, fabacea & carni farina, irides
radix aristolochia, panax (quæ cæte-
ris plus siccant) Cadmia atque pom-
pholix, ex his pro corporis natura &
ulceris erunt quæq; deligenda. In hu-
midiori ulcere illud, quod magis sic-
cet, in humidior corporis natura, q̃
minus. Siquidem quatenus natura
naturæ interest, ex ulcerib. æquē hu-
midis, quod in sicciori temperamen-
to consistit, utiq; magis siccari postu-
lat, quod uerò in humidiori, minus.
3. Methodi.

47 Glutinatorium medicamentū
nec deterget, nec expurgat, sed pror-
sus substantiam omnem in idem co-
git, quare plus siccet, oportet quàm
quod carnem producit. Huiusmodi

Y 4

autem

autem sunt austera & astringentia, ut galla immatura, malicorium, & Aegyptiæ spinæ fructus. Quemadmodum multò siccior quod cicatricem inducet, quàm quod agglutinabit esse medicamen oportet, cuiusmodi Chalcitis, æs ustum, squama æris, mī, quod cæteris ualentius existit. ibidem.

48 Sternutamenta iuuant præcipue illos, q̄ capitis grauedine, ob cerebrum crassis uaporibus oppletum tenentur. Atq̄ inde obtusius olfaciunt: qualia ex nigella oleo intrita inspirantibus ægris, & capite resupino instillare naribus soleo, idq̄ prius ore aqua repleto, Gal. de instrum. olfactus.

49 Recitauit mihi quidam, cū inueteratū ulcus in coxa habuisset, doctum quēdam medicum consuluisse, qui uena in brachio. primū ternis diebus incisa, tum medicamentis purgantibus adhibitis, & ulcere postremū curato sanitati sic restituit, Gal. de atra bile.

50 Timidum incisuro morbum at-
trectare, & partes affectas tangere le-
niter fingendum, ut facilius dolorē
fallat. Antidoto 3.

51 Ossa iuuenum fracta glutinari
prius, quàm puerorum dixit Ascle-
pius. Quia pueris opus sit cibis etiā
id quod solutum est reficientibus ac
cōplentibus, non medicamentis tan-
tum. in 1. Hipp. de reductione ossiū.

52 Post quatrimum, os luxatum
ad situm naturalem reducendum nō
est, alioqui plurimum lēditur æger,
ut periculū sit maioris morbi. Ascle-
pius in 3. de reductione ossium.

53 Galenus uerē, coalescere (inquit)
nequeunt ossa iuuenum adolescen-
tum, nec non senum, ob eorum maxi-
mam siccitatem duritiemq̃, at quæ
abundē sunt mollia qualia in pueru-
lis cernuntur, ea sola unionem reci-
piunt. 3. Methodi.

54 Certissima transpositionis fra-
ctorum ossium indicatio ab integro-
rum exemplari sumenda est. Ibid.

55 Quæ per transversum fracta
Y 5 sunt

sunt in directum, & cōtrarium agen-
da, quę retrorsum ea prorsum magis
impellenda, altera fracti ossis ad con-
trarium etiam ducta. Quę uerò prorsum,
hęc retrorsum reliqua parte si-
militer sensim prorsum ducta: sicq̃
de cæteris differentijs adhibita cauti-
one in contrario illo motu, ne extan-
tiæ fractorum ossium frangantur. I-
bid.

§ 5 Commisssorum ossium deliga-
turam non admodum arctare oportet,
ut comprimat fracturam, nec re-
mittere ita ut sit laxa. Sed pectori qui-
dem latissima fascia, artubus & iugu-
lo angusta congruit, uersutum tamē
numero amplior illa esse debet. Ad
hęc eius principium super fracturā
inijciendum bisq̃ ter uē circumdu-
cendum, tum ad membrum reliquū
dispensandum. Splenia etiam cum fa-
scijs exterioribus adhibenda, tertio
uerò die soluenda ne dolor aut pru-
ritus creetur. Reponere autem figu-
ra à dolore omninò imuni, in brachio
quidem angulosa, in crura uerò quę
pau-

aulò minus porrecta sit, &c. Ibid.

DE MORBIS

mulierum.

SECTIO XV.



Non deprehenditur morbus ex menstrui sanguinis suppressione ortus, ne secundo quidē mense, nisi admodum obscure. Tertio uerò ubi matrix iam plena est, nec capere ampli⁹ potest, fursum regurgitare quod denuò fluit cogit, ita morbus suffocationis cernit. Gal. in Hipp. de morb. mul.

2 Quæ ex cruribus fiunt euacuationes, menses promouent, si tribus quatuorue diebus ante tempus consueti mulieri circuitus administrent, idq; aut uena incisa, aut scarificatis u-nius cruris talis, atque inde exiguo sanguinis euacuato. quod & postero ac similiter faciendum erit, sic tamen ut quibus diebus uacuas, atque quatuor, aut quinque potius ante illos mulie-

mulieri extenuantem uictum institui
as. Menses etiam abunde prouocant
nepita, pulegiumq; in pollinem reda-
cta & melicrato cocta, maximè à bal-
neo etiamq; linteo inuolutis propi-
nata. Sed ualentiora sunt, fauina &
dictamnium, ususq; eorum illis simi-
lis: hoc tempore uerò hiera picra da-
tur, illa potissimum in cuius composi-
tione, centum aloës drachmis, aliorū
medicamen senæ tantum miscentur,
cum cinnamomo. Galen. de uenæ.
sect.

3 Sanguinis retenti causa est, uel
uirtutis attrahentis imbecillitas, uel
uenarum matricis obstructio, uel e-
iusdem contractio. Gal. in Hipp. de
morb. mul.

Addit Moyses.

Hæ causæ (Lector) sumptæ sunt ex
ratione continentis cū etiam fluit
sanguis, non ex contenti ratione ubi
iam defecit, siccatusq; est.

4 Menstrua nullo in mammis ap-
parente lacte suppressa his notis indi-
cantur. Grauitas enim totum corpus
infe-

manifestat & fastidium atq; horror inæ-
qualis. Item lumborū & colli ac syn-
cipitis dolor, qui ad oculorum usque
radices extenditur præterea febres
ardentes nigricantes urinæ, cum ru-
bra quadā sanie, proinde ac si aquæ
in qua nuper macinata carnes ablute-
runt fuliginem quis miscuisset. Qui-
busdam urina supprimitur aut diffi-
culter redditur. Si autem per alium
corpus corporis locū effluerit san-
guis, aut inflammatio, uel erysipelas
excitetur, an menstrua purgentur in-
terrogabis. Siquidem nil horum acci-
dere solet ijs, quæ integræ sint repur-
gata. 6. de locis aff.

5 Quemadmodum uirorum qui-
dam effœminata carne, id est, mollē
delicataq; & minimis etiā noxis ob-
uia sunt, sic mulierum quædam robu-
sto ualidoq; corpore cōstant non cui-
us periculo, obnoxio. His sanē medi-
camenta menses euocātia minus pro-
fuerint. 2. in 6. Epid.

6 Nonnūquam ex ocio & nimia
quiete coalescūt humores superflui
in ue-

in uenis matrici coniunctis, quos ipsa matrix attrahit, inde uerò & uteri dolor esse potest. Gal. in Hippoc. de morb. mul.

7 Omnia quæ genitales partes cōstituunt uasa testes nutrientia, principia uasorum, & in masculo & foemina eadem uidentur, ac omninò & numero, & substantia conuenientia, sed positione magnitudine eo differentia, quòd foeminae intus, masculi foras existunt. 2. de semine.

8 Quibus uterus aut sursum, aut ad latus reuellitur inguinibus, & coxis cucurbitulas applicamus: naribus quidem ea quæ foetidissimum habent odorem, matricibus autem odorata & ea quæ laxare calfacereq; possunt. Quod si sequatur animi deliquium ob uentriculi imbecillitatem, ea quæ roborandi uim habent oportet emplastra adhibere, quale & quod fit ex palmulis, uino, farina ordei, croco, aloë & mastiche, plurimum uerò iuuat sic affectos extremorum frictio, &c. 1. ad Glauc.

9 Vre-

9 Vteri inflammationes magis, q̄
renum à uenis in cruribus sectis iuuat
tur: quæ enim ex cubito fiunt euacu-
ationes, purgationes menstruas re-
primunt, sanguinemq̄ retrahunt ad
supernas corporis partes, atq̄ uentri-
culo sic nocent. Gal. de uenæ sect.

10 Mulier quieta, si menstrua faci-
le emittit, minus coitū appetit, quia
humores superflui à quib. irritari ma-
trix solet toto corpore affluerūt Ga-
len. in Hipp. de morb. mul.

11 Conuellitur matrix, quemad-
modū musculi & spina, & ossa, quan-
do nimio sanguinis effluxu siccata il-
la manent: at suffocatur cum ex sup-
presso sanguine completa, undique
natar, uasq̄ omnia (quib. plurimis
abundat) tendonesq̄ & ligamēta ple-
nitudine tendunt ac sursum trahunt,
quò motu & uētriculus, & diaphra-
gma ita uexantur, ut nec spiritus mīt-
tere diaphragma possit, nec uentricu-
lum officium suū facere. ita in morb.
mul.

Sed in 6. de locis aff. q̄ est ultimus.

Agita-

Agitationis uteri(inquit) quam mulieres percipiunt, non est causa ascensus eius usq; ad regionē diaphragmatis, ut nonnulli putant, sed uteri ipsius tensiones, potius: qui tangentibus obstetricibus modo sursum, modo in lacus retrahi uidetur. Et paulò post.

12 Quæ citra peruersionem aut retentionem mēstruorum uiduas molestant noxæ, hæc ob retentum semen euenire putantur. Pro multitudinis autem qualitatis'ue ratione ipsorū menstrui & sanguinis, aliàs aliæ accidentiū species oriri solent &c. de hoc multa in eo libro.

13 Nuper quidem uidi uiduā mulierem, cui cum uitiatum semen ex retentione cōputruisset, matrix, uti obstetrix referebat, sursum contracta atque suffocata erat. Huic igitur medicamēta consueta, nempe aromatica, et calefaciētia manu immitti iussi, ex quibus statim leuem spasmum, ueluti in coitu passa, mox eiectionis crassioribus, qui in ea constiterant humoribus

bus conualuit. 6. de locis affect.

14 Profluuium sanguinis in grauida muliere, ab eruptione uenarum in ceruice matricis positarum, nō ab ijs, quibus in interiore utero annexę sunt, secundę semper est. Gal. in lib. de morb. mul. & in 6. de locis aff.

15 Mulierum corpus si pauco tēpore multum augetur, aut si singulis mensibus plurimū sanguinis excernat, signum est maximi cum humiditate caloris iuncti. de morb. mul.

16 Venter, utraq; uesica, & uteri, ubi uel multitudine eorum, qui continent grauantur, uel qualitate mordentur quod offendit abijcere properant. Quorum utrunq; aliquādo uio lenter incidit, eoq; casu prouocatur abortus, qui uel medicamen eū prouocātia, uel tensionem uteri semper sequitur, sicut partus motiones uehementissimas fœtus. 3. de nat. facult.

17 Prauas qualitates appetunt iij, quibus uentriculi tunicę sunt, prauo aliquo excremento imbutę, ueluti mulieres prauis succis refertę potissimum

Z

mum

mum ubi uterum gerunt & acris, amara, carbones, lutum & similia appetunt, qui affectus citra seu pica dicitur, duratque quibusdam ad tertium mensem alijs ad quantum usque, dum foetus nutrirī cœperit, & illa uel uomitu eiecta sint, uel ui uentriculi concoquantur. Cibos autem non capiunt, unde & marcescunt. 2. de sympt. causis.

18 Mares dextris, foeminae sinistris uteri partibus magis continentur, atque raro aliter accidit. 6. de locis affect.

19 Similiter propriè conceperit, secundo autem aut tertio, aut quarto mense foetum eiecerit, circa uteri acetabula humorē pituitosum abundat, atque ideo uasorum ora eius loci debiliora, quàm ut foetū ferre queant. Ibid.

20 Pregnantium pulsus, maiores, crebriores & celeriores sunt, cætera uerò tuentur. In eis siquidem præter usum, priorum mutatum est nihil. In crescit autē his & augetur, quòd mulier

lier non sibi iam respiret ac pulset, sed
foetui etiam. quare celeriores, maio-
res & crebriores fiunt pulsus. 3. de
caus.

21 Formatur foetus in utero 35.
aut quadraginta, aut certè 45. dieb.
Mouetur eodem numero geminato:
nascitur aut hoc ipso triplicato. Gal.
in 4. de uict. ratione.

22 Foetus membra interdum con-
tingit phlegmone tētari, quod fit po-
tissimum in difficili partu, sanguinis
menstrui suppressione, partim ex co-
natu & uehementi mulieris agitatio-
ne. 2. in 2. Epid.

23 Superfluous & inutilis crassus q̄
sanguis post partū ad matricem cogi-
tur aut hæret, lenitutibus & inciden-
tibus cibus est prouocandus, ueluti
ptisana & similibus. 6. in 2. Epid.

24 Nutricis lac si sistitur aut si defi-
cit ægritudo est. Sin abundat, robur
& mammillarum integritas. Gal. de
morb. mulierum.

25 Mulier concipiens si lac emi-
serit, foetus infirmus erit, utpote a mā

Z 2 mil-

millis attrahere sanguinem non satis ualens, at si firmum durumq; continetur, ualidum fore signum est. 6. in 2. Epid.

26 Matres lactare infantes suos omnes decet, siquidem earum lac cū eiusdem, cum sanguine & natura infantis substantiæ sit, multò melius ceteris semper erit. Quod si non potest ipsa, aut si ipsum in ea sit corruptum ex quàm simillimo nutriri oportet. in lib. de uictus ratione.

27 Concretio & coactio sanguinis in mammillis signum est futuræ in muliere mania. in 2. Epid.

28 Cū Boëthi uxor laboret muliebri profluuiō cui superuenit, postea grandis in uentre tumor tractareturq; ab obstetricibus, proinde ac si prægnaſset contigit, ut in prima balnei domo grauissimus dolor eam inuaderet. Ab eo uerò aquosæ humiditatis, adeò grandem excreuit ut animo protinus linqueretur. Igitur clamore muliercularum audito, insilio actutum, eamq; in ulnas excipiens

piens nardino unguento os uentris
perfricui, iussiq; astātibus ut pertitis
officijs hæc manus concalfaceret, il-
la pedes, aliæ bene olentia naribus
admouerēt. ita sanè quàm celerrimè
illam restitui. Gal. de Præcog.

Idem paulò pòst.

Ea quibus profricabatur uentris
regio, erant mollissima & præhumi-
da. Humiditas autem illa, quæ erat
affecta per siccantia simul & calfaci-
entia ex communi medicorum, qui
confluxerant cōsilio curata, hoc mo-
do. In maris arena & quidem excal-
facta eam reclinauimus. Dein talem
hunc uictum institui, ut quam mini-
mo potu uteretur, frictiones & un-
ctiones uniuerso admoueret corpo-
ri, q̄ solo melle cōstarēt: primū qd̄ e-
lixato q̄ optimè, dein instar fontanæ
per æstatem aquæ refrigerato. Non
solū autem per cutim illas superflu-
itates humidas digerendas indicaui,
sed etiam per uesicam urinis, & per
alium medicamentis soluentibus.

Idq; diebus septem ab illa magna ua-

Z 3 cuatio=

uatione factum est, tum diebus binis sequentibus medicamento aqua ducente curavi, & simul asari apud decoctum propinaui. Quo facto cum nil iam profluuij appareret, rursus tertia modicum quiddam ex medicamento aluum purgante exhibui. Posthuc singulis diebus melle illeui corpusque perfricui mollissimo primum linteo, postmodum asperrimo. Victu interim uel ex carnibus montanarum auium, uel ex saxatilibus fuscib. praescripto. Quibus per quindecim dies peractis, ne minima quid affectus nota extitit, & bene colorata reddita est, Mense demum exacto Boë-

thius 400. aureos dono
mihi dedit.

DE

DE SANITATE TVENDA.

sectio XVI.



AD sanitatem tuendam nil ocio & gente diuturna peius, neq; exercitio moderato melius: adhibita tamen cautione, ut ante cibū fiat. nam qualiscunq; post cibum motus, alimentum ex uētre, crudum in diuersas corporis partes distribuit. Gal. de Euch. & cacoch.

2 Hippocrates in 6. Epid. Diuturna (inquit) sanitas est saturitarem & ociū fugere. ubi Gal. Omnibus (ait) cuiuscunque affectionis hominibus semper profuit post cibum largiorē abstinētia.

3 Motus sit non omninō nullus, ut eorū qui dies noctesq; totas chartis inuigilant, sed mediocris & æqualis, id est, ita compositus, ut quælibet pars suo ordine & pondere iusto mo

Z 4

uea-

ueatur, non externæ tantum, sed etiam internæ, neruus, musculus, caro, uenæ, arteriæ, &c. Gal. de somno & uigilia.

4 Duplicem scopum esse rationis uictus oportet unū, ut quod exhaustum est similibus naturæ partibus instauretur: alterum, ut quæ relicta sunt excrementa expellātur. His enim duobus facile tertium remoraberis quod est senectus. i. de sanit.

5 Calor naturalis curæ in primis esse debet, quare danda opera est, ut hunc q̄ maximè & foueas, & iuues exercitijs non solum corporis, sed etiam animi. Ibid.

6 Exercitatio, cibus, potus, somnus, uenus omnia mediocria, eiusq̄ ordinis, quo hæc uerba sunt posita, fieri debent. 6. in 6. Epid.

7 Veneris scopus sit corporis alacritas, non dissolutio: accedaturq̄ ad eam corpore non calido, neq̄ supra modum frigido, non uacuo, neq̄ repleto, non humido neq̄ sicco, sed temperato. Quod si in alterutrā partem pecca-

peccatum sit, in humidum & calidū
potius sit uitium quā cōtraria. Ga-
len. in arte medicinali.

8 Venus ei, cui ex intemperie cali-
da fuliginosus humor in corpore cre-
uit pro optimo semp habetur reme-
dio: siccatur enim & refrigeratur ex illa,
qua laborat intemperie corpus. 5. in
6. Epid.

9 Capiendo cibo non post balne-
um aut aliud uehementius exercitiū
omninō hęc cautio esse debet, ut nō
ante quā flatus & anhelitus resede-
rint, capiatur. Alioqui enim in stoma-
cho crudus natat, calore nimirum à
quo oportebat concoqui per exteri-
ores corporis partes latē sparso, & ca-
put grauatur, & membra nutrimen-
to suo fraudantur. 3. de ratione uict.
in morb. acutis.

10 Status eorum pessimus est, qui
genitale semen copiosum calidumq;
gignunt. nam siue Venere eijciatur
ad quam procitat, siue retineatur u-
troq; modo obest. Illo enim uentris
os resoluitur, & ipsi toto corpore im-

Z 5 becile

becilli, & sicci graciles, pallidi, cauiſ-
 quē oculis ſunt. Hoc uerò non mo-
 do capitis moleſtiam, ſed ſtomachi
 offenſionem ſaſtidiāq; ſentiunt, nec
 ex continentia magnopere iuuātur.
 Sumere igitur n̄ debēt non cibos mo-
 do, uerum etiam medicamenta, quæ
 ſemen extinguant, & exercitationi-
 bus uti, quæ ſupernas tantum partes
 exerceant, ut ludo pilę, iactu lapidis,
 frictione & unctione lumborū à bal-
 neo oleo potiffimum omphacino, &
 roſaceo, & melino, quæ refrigerant.
 Tum ſi urgeat dolor. Cibis etiam bo-
 ni ſucci modicē repletos in cœna, cō-
 cubere dormientes, & poſtero die
 cum ſatis dormierint ac ſurrexerint
 iubendum eſt, linteo fricari quod ro-
 bur per cutem appareat, mox aliqua
 ex oleo frictione, uti, tum exiguo in-
 terpoſito tempore panis aliquid fer-
 mentati, & in clibano cocti, & puri
 ex uino mixto illis guſtandum porri-
 gendum, atq; ita ad cōſuetum dimit-
 tendum, magnam enim hinc utilita-
 tem experiuntur. 6. de ſanit. tuenda.

11 Cibis mali succi, quantum potest abstineri uolo, etiam si facile concoqui possint; neque enim fieri potest, quin huius uitij aliquid in uenis hæreat, quod ex succo in corpus distributo prouenit. 2. de alimentis.

12 Optimę constitutionis homo, si statim ubi editus est in lucē, arti sanitatis tuendę tradatur erit fortunatissimus. Sic namque ad animi quoque affectus non nihil lucrifaciet: ipsa nimirum recta uictus ratione mores quoque probos agente. 1. de sanitat. tuend.

13 Optima corporis constitutio, quę temperatissima est meatus per quos humor fertur patentiores habet, quā quidem talem, conseruat ante cibos exercitium mediocre. Galen. de Euch. & cacoeh.

14 Multum ad sanitatem facit statim capiendo cibo tēporis obseruatio, & uentris quoties insistit solutio. 6. de sanit.

15 Probare suum quisque cibum debet, priusquam utatur, neque statim quod

quod arridet palato sequi more brutorum. Itemq; Venerem, quo minime tempore ab ea lædat, &c. de cæteris eodem modo. Sic enim ratione bene constituta in cōtrarios sibi aut cibos, aut libidines nunquam cadet. Ibid.

16 Optima uictus ratio est ei, quæ reficere ex gracilitate oportet, ut mane liquidioribus cibis utatur, qualis est ptisana: serò uerò duriusculis ut pane aut carnibus, aut frugibus, quæ sunt species duriorum ciborum. i. de alimentis.

17 Ptisana probè cocta & ex optimo hordeo confecta inter cibaria omnia prorsus omni noxa caret, nutrit tamen quam panis minus, sed & si eam ad sanitatem sumptis nō idcirco boni succi generationem impedias. Gal. de Euch. & cacoeh.

18 Consuetudo in uictus ratione magni est momenti, atq; adeò ubiq; tutior, quàm immutatio quælibet etiam in melius facta sit. Gal. de consuetudine.

19 Ego

19 Ego plerosque etiam nulla uictus ratione constituta, uidi sanos tamen uiuere & bene habere, cum acetosco scillitico & eiusdem herbae serapio frequentius uterentur, tanti est morbi attenuans illa & salubris uictus ratio. Gal. de atten. uict. ratione.

20 Inter pisces, alimentum corpori saluberrimum praebent saxatiles, quod non modo concoctu est facile, sed sanguinem etiam medium consistentia generat. 3. de Alimentis.

21 Seruator quidque ipsidem plane generibus quibus corrumpitur, ut animi mores corrumpuntur praua consuetudine cibi potus, exercitationis, uidendi, audiendi ac totius denique musices. Quarum rerum peritum medicum esse oportet, qui sanitatis tuendae curam suscipiet. 1. de sanit. tuend.

22 Vinum puero sanitatis regula educato ne gustare quidem quam diutissime suaserim, quod humectet nimis & calfaciat corpus caputque halitu repleat. Sed ne adulto quidem nisi modice sumptum concesserim, quod uidelicet

uidelicet, ad iram & libidinem præcipites facit, & partem animæ rationalem hebetem atq; turbidam reddit. Ibid. Quod modicè dico: quæ ad bilis excrementa mitiganda uel expellenda, & ad siccitates ex immodico labore, aut propriè temperamēto in solidis partibus prouenientes nō minimum esse utile potest.

23 Optima uictus ratio est senibus, si mane ex oleo friscēt post somnum, deinde in ambulatione gestationeq; pro suis uiribus utantur. Postea dulci balneo lauentur saepe si assueti sint, & uinum bibant s. aue, deniq; alimentis humidis simul & calidis, quàm maximè possunt nutriantur. s. de sanis.

24 Sciendum est uinum ut pueris aduersissimum sic senibus amicissimum esse. Hoc enim maximum illis commodum ex eo accedere, quod omnia eorum membra calfacit alterum, quod per urinas secum sanguinis purgat. Quæ omnia præstat tenue simul & flauum, cū calidissima sint,

sint, si colorem spectes, flaua, minime calide, alba: media prout alteri accedunt, ita uim habeant. Ibid.

25 Lactis commoda sunt, uentris moderata delectio succi bonitas & nutritio. Non tamen omnibus est senibus exhibendum, sed is qui id probe concoquant, nec ullum ex eo symptoma in dextra praecordiorum parte sentiant. Ibid.

26 Senibus, ficis etiam & prunis alijsq; id genus, quae aestate autumnoque uigent soluenda aluus & uirina mouenda. Hyeme uero caricis, prunisq; Damascenis aut elixis, aut in mulso cui plusculum insit, Attici mellis maceratis. Ibid.

27 Pituita & obstructions hume-
ctanti uictu in senibus curanda nempe alica ex melle, cui aceti aliquid mistum sit, aut ex mulso uinoq; falerno exhibenda, aut lacte utendū, aut ptisana bene cocta, quae piperis pollinē acceperit, aut maturis ficis aestate, sicut hyeme caricis. Ibid.

28 Carnes senibus & atrophialaboran-

borantibus uno ante die quam sinuant, parantur: ut refrigerentur, tum bene coctæ ex uisculis, aut huiusmodi cibarijs apponuntur. At iuuenib. & robustis recentes siue assæ, siue elixæ meliores. Gal. in 4. de uictus ratione.

29 Ex tribus senum generibus *πρᾶξιμας* seu iā iam senescentibus, senibus & decrepitis ultimi soli sunt, qui balneū non ferant, quod ut nunquam ferē acres calidosq; humores congerunt, sic minimis cruditatibus grauantur. 1. de sanit.

30 Senium uitari quidem non potest, sed produci potest uictus ratione bene cōstituta, humidorum ciborum usu lauatiōnū, mollis lecti, &c. omniumq; contrariorum, id est eorum, quæ siccent ac refrigerent abstinentia. Gal. de tabe.

31 Vacuationes non debētur corporibus ob consuetudinem aliquā, sed ob causam, quæ illas postulat ueluti ob uitiosorum humorum aggregationem ex malo uictu, aut praua corporis

Corporis affectione. In his si quod re-
dundat, antequam in morbum inci-
dat corpus, detractum sit toties, quo-
ties morbum, aut praesentem, aut ad-
uentantē senserit homo, non ob con-
suetudinem fiet talis medendi ratio,
etiamsi in eam uersa uideatur. Gal.
de consuet.

32 Aloēn senibus ad deijciendam
aluum haudquaquam sumi suaserim
nisi maior aliqua necessitas urgeat.
Nam etsi biduo astrictus uenter, ter-
tio non soluitur, sat tamen est mercu-
rialem herbam, & marinam brassicā,
& enicum in ptisana dedisse. Sic & re-
binthi, resinam nucis ponticae ma-
gnitudine, aliquando duarum trium
ūe, quae non modo aluum, sed etiam
uiscera, iecur, linē, renes, pulmones
quae abstergere citra noxam potest.
Exhiberi tamen eorum nullum co-
piose oportet. 5. de sanit.

33 Qui temperamento sunt cali-
do & sicco, similiter educandi sunt ijs,
qui optimae sunt naturae, ad aetatem
usq; adolescentiae dum bilis pallida,

Aa

& fla-

& flaua, quæ in ijs abundat temperetur. Quod si uentrē ipsum superiore petat, per uomitum expellenda est, post exercitationes aqua tepida propinata: nam uino tunc utendum non est, nisi difficulter uomāt ex aqua. Si uerò exercitari non debeant, ut sunt qui hoc statu sunt, graciliores leuis inambulatio, balneum, & mollis frictio ex oleo adhibeatur. Sed si præterea circa præcordia sentiant dolorem, danda quæ iecur obstructum liberent. Liquor in quo macerata sit absynthij coma, & medicam ex ea coma aniso & amaris amygdalis confectam, ex oxymelite bibendum eo tempore, quod inter surgendum à somno & lauandum intercedit. Purgentur etiā & cōpositione ex aloë, q̃ picram uocant, & uentri extrinsecus admotis unctionibus modicè astringentibus, ut melino æstate mastichino uere, & nardino hyemē. Opulente autem mulieres foliato unguento & spicato, quæ uentrem & roborare possunt & calfacere. Gal. 6. de san. tuen.

34 Corruptio ciborum in uentre si descendit per aluum ex se, maximū est sanitatis compendium, sed si hæret prouocanda est ijs, quæ deſciant leniter. Diospolitico medicamen ex ficis & cnico composito, alijsquæ ex cnico uel epithymo, corrupti cibi reliquias elicientibus, ita tamen ut sine erosione & pūctura fiat deiectio. Ibid.

35 Qui theriaca utuntur ad sanitatis conſeruationem, uidere debēt, ne ante exactam ciborum concoctionē ut uentriculum exoneratum accipiant. atque tantum aquæ, quantū pro modo exigitur, admisceant exempli gratia, si magnitudine Aegyptiæ tabæ ſumant duo cochlearia miſceant, ſi auellanae aut circiter tria, proportionē utiq; ſeruata. At nec eſtate, nec iuuenis, nec calido tēperamento prædit⁹ uteris, aut ſi neceſſitate coactus id facis, minimum erit. Neque uerò puerò dabis, ne forte præ imbecillitate uirium uacuatione incitatus omni ſucco exhauriatur, quemadmodū

Aa 2

nuper

nuper cuidam accidit à patre ad id
coacto. Sed & si senex capias, cum ui
no accipies nō cum aqua. Galen. de
Theriaca ad Pisonem.

DE EXERCITATIONE

SECTIO XVII.

I.



Vi potest exerceri ante
cibum, is haud sanè ad
modum exquisitos ci
bos desiderat. Cui ue
rò negocia & occupa
tiones impedimento sunt, non mo
do huic probato innoxioq; uictu,
sed salubribus quoq; medicamentis
(quæ tenuandi uim possident) est o
pus. Gal. de Eucly. & cacoch.

2 Parua sphaera exercitium cæte
ris omnibus, cum alijs bonis, tum
uerò his duobus antecellit, quod æ
qualiter omnia membra exercent, &
citra periculum (quod alijs omnibus
quodāmodo inest) corpus pariter &
animū uegetat. Gal. de parua sphaera.

3 Vti

3 Vtilissima omnium exercitatio-
num videntur, quæ non corpus solū
exercere, sed animum etiam oblecta
re possunt, quales sunt parvæ sphæ-
ræ, ludus, uenationes & aliorū ani-
malium capturæ. Adeo enim poten-
tes sunt huiusmodi exercitiorū mo-
tiones, ut multi sæpe morbis liberati
ex delectatione fuerint, ex conturbati-
one autem nimia in morbos incide-
rint. Ibid.

4 Humores tenues crassiq; simul
in eo gigni solent, qui omisso exerci-
tio nunc in ocio agit, crassi quidem
ex ocio presenti, tenues ex omisso ex-
ercitio. 3. in 3. Epid.

Exercitiū à mala concoctione non
est commodum. 3. de sanit.

5 Ab exercitio, quod repleto fit
corpore, gignuntur pro qualitate re-
dundantium humorum modo epi-
lepsiæ modò apoplexiæ & huiusmo-
di. Excalfacti enim ex eo humores li-
quescentes prorumpunt & maliciam
edunt in 3. Aphorism.

6 In ocioso corpore duo repletio-

Aa 3 nis

nis genera fiunt. Repletio quantita-
tis, quæ est in uasis & qualitatis seu
uirtutis, quæ est in humoribus ipsis.
Gal. in Hipp. de nat. humana.

7 Exercitationes acutæ & uehe-
mentes quia siccant & indurant, mē-
tem etiam ledunt, quod in athleticis &
baiulis ac rusticis cernitur, qui ut plu-
rimum mente sunt stupidi. Galen. de
somno & uigilia.

8 Senes neq; nimium exerceri, ne-
que omnino in ocio desidere oportet:
Illo enim modo eorum calor ut
pote tenuissimus cōsumitur, hoc ue-
rò refrigeratio augetur. 5. de sanit.

9 Calido & sicco temperamento
præditis uti ius est, non acutis exerci-
tationibus & prænegetis uti, sed po-
tius tardis & mollibus. Acutæ enim
extenuant, lentæ implent corpus. 6.
eiusdem.

10 Eorum qui repleti cibo se exer-
cent non nullis caput repletur uapo-
ribus & in iecinore, aut ponderis, aut
distensionis, aut utriusq; dolor perci-
pitur. Succurrendum est igitur in am-
bula

bulationibus potissimum ante cibū,
& celerioribus, aut post cibum, sed
quàm maximè lentis. Ibid.

11 Laboris appellatio idem uide-
tur, cum communi exercitationis ap-
pellatione significare, at non motus
quiuis exercitatio uidetur, sed tantū
qui uehemētior. Cuius terminus est
alteratio respirationis, id est accretio:
In quib. enim nulla fit respirationis
mutatio, hos nōdum exercitationes
dicimus. 2. de sanit.

12 Exercitationis tempus cōmo-
dissimus est, paulo antè prandiū, aut
cœnam, cū hesternus cibus dupli-
ci concoctione iam prorsus confe-
ctus fuerit, nempe ea, quæ in uentri-
culo, & ea quæ in uasis sanguinis agi-
tur, ac iam denuò cibādī tempus in-
stet, cuius nota est urina rufa. Quod
si prius aut posterius facias, aut cru-
dis humoribus hominem impleue-
ris, aut pallidæ bilis prouentum au-
xeris. Ibid.

13 Cū urina mediocriter rufa
est, adeundum exercitium, sed expul-

sis prius excrementis, quæ uel in uesica, uel inferioribus intestinis continetur, ac partibus solidis molli simul frictione concalfactis. quæ linteolo suauiter perfricando fiat. Donec floridus quidam robur per totam eius cutem fundatur, tum oleo nudis pedibus totum ipsum subigere medio inter molle & durum modo. *Ibid.*

14 In quartana, potest qui laborat nullo detrimento etiam diebus intermissionis mediocriter negocijs suis corpus exercere. 1. ad Glau.

15 Exercitia nonnulla sunt tantum exercitia ut pancratium lucta, pugilatus, quædam simul & ope a, ut cum aliquis fodit, aut remigat, aut aliud exercet in usum mortalium. 2. de san.

16 Exercitiorum triplex in uniuersum est usus, aut enim operis gratia fiunt, aut meditationis, aut exercitationis tantum. Quorum nullum ut exercitium perpetuum diem obitur, nec alio tempore, quam ante cibum. *Ibid.*

17 Exercitatio puero membra
exuta

exuta frictione primum molliantur. Posthęc exercitetur donec intumescat corpus, & color illi floridus appareat, & motus proprię equabiliter, & concinnę edit, & sudorem cum calido uapore mixtum uideas. Horū uerō aliquo mutato, inhibeatur exercitatio. Ibid.

18 Senibus quę præcipua ad sanitatem exercitia sunt, hæc per ualentiores corporis partes sunt obeunda. sed habenda cōsuetudinis imprimis ratio: nam quę cōsueta sunt ut minime lassantur, quos exercent etiam delectant, sicuti ediuerso, quę insuetatum displicent, tum uerō lassant. 5. de sanitate.

Aa 5

DE

1.



In Auacrū exercitatis omnino medio temperamento eligendū est, ad propositam ætatē atq; naturā quod non protinus, sed ubi summus exercitationis vigor remissus atque sedatus fuerit adhibeatur. 2. de sanīt.

2 Balneum exiccatos seu tabe cōfectos conspicuē humectare reficereq; cernitur, ut facile in nīs possimus uidere, qui æstate uel iter faciunt, uel alio quopiam modo exercentur sub sole. Hos enim omnes atq; etiā eos qui siticulosi sunt, humidos reddit & siti liberat, siue ex uigilia, siue ex curis, siue ex uenere, siue ex edulīs, siue ex ira, uel medicamentis fuerint exiccati, in putridis etiam febribus, si cocti sint humores & hec̄ticis, si sola sint quouis tempore balneum remedio

dio est. Galen. de tabe.

3 Balneum excrementa potissimū cuti proxima purgat, interiora enim altius hærent, quàm ut eò pertingere possit. 3. Aphorif.

4 A balneo abstinere debet, qui fluxum sanguinis patitur, & cui subuersus est uenter: item cui uirtus imbecillis est, ne deficiat, aut in syncope incidat. Gal. in 3. de morb. acut.

5 Balneum desinentem febrim si uires suppetant, soluit omnino & coquit, sed si ante concoctionem adhibeatur potissimum in quotidiana ex pituita salsa grauius malum efficit. Ibid.

6 Febres quæ ex inguium inflammatione fiunt curare omnes quidem balneis oportet, & quæ ex cutis densitate (densatur enim cutis aut ex frigore, aut ex aliqua qualitate astringente) si in aëre balnei immorari iusseris ægrotum. nam reliquos omnes quā citissimè oportet ab aëre remoueri, nisi uelint ipsi diutius immorari. i. ad Glauc.

7 Bal-

7 Balnea calida ex aqua potabili tertianis etiam profunt, tum quia bilis aliquod educūt, tum quia sua qualitate humectant & potentia refrigerant, qui scopus in omnibus balneis esse debet. Ibid.

8 Qui ex calida & sicca intemperie hectica febricitāt ac potissimum, qui iam marasmodes fiunt, nō tutus non est frigidi solij usus, nisi prius fuerint in balneo æqualiter excelsi. Atq; huius rei causa ad imbecilla corpora iuuentæ sunt balneæ, quæ ea præcalfaciant, atq; ad frigidum solij præparent. 10. Methodi.

9 Balneum quatuor partibus uaria facultate præditis constat. Prima in qua calfiunt, q̄ ingrediuntur aëre calida tantum. Altera in qua calida aqua lauantur. Tertia in qua frigida utūtur. Quarta in qua sudores detergentur, quibus tempestiuè omnibus est utendum, quòd qui intempestiuè lauantur, in horrorem cutisq; densitudinem incidunt. Ibid.

10 Si nō qui fuliginosum & fumi-
dum

dum ex corpore exhalat, ex frigore febricitet educendus in balneum etiam erit in remissione febris. Si autem cum grauedine & destillatione febricitet priusquam hæ concoquantur, lauandus non est. Atqui exustione, ñ uel cum hæc adsint lauari debebunt. Postlauacrum uerò amborum capita oleo rosaceo madefacienda erunt, eorum quidem qui ex uustione febricitant refrigeranti, qui uerò ex frigore calfacienti ut sunt irinum & nardi nū unguentū. s. Meth. *Additio.*

11 Fumidus uapor ex tarditate concoctionis aut cruditate in qua ructus sentiuntur acidi non excitatur, sed ex materijs semiustis & fuligo ex immodicè assis ustis, quod in ijs, q̄ sunt extra cernitur. Est enim fuligo uapor terrestris, fumus uerò mistio quædam ex terrestri & aquea substantia. ex Gal. in eodem lib.

12 Si quis febrem ex stipatione ortam toto prius corpore uacuato relaxantibus medicamen curet, ubi scilicet maxima febris non adest, utique pro-

prodesse aliquando potest, si tum etiam lauerit. 11. Methodi.

13 In balneo quod in quacunque febris adhibebis, tribus his intentus sis oportet. Vni quod citra horrorem sit administratum. Secundo quod nullum primæ notæ uiscus sit imbecillum. Tertio quod multitudo crudi humoris in primis uenis non contineatur. Horrore namque non solum accedere iam præsentem febrim potest, sed etiam quæ non fuit inducere. Partes uero imbecillæ liquatos iam humores recipiunt magis, quam ante liquationem. Crudorum uero copia in totum corpus digeritur. Ibid.

14 In progressu morbi nempe febris putridæ quo tempore & absumpta iam superuacua sunt, & tum cruda, tum putrescentia concocta, & cataplasmatibus relaxantibus, & balneis intrepidè toti licebit. Ibid.

15 Aptissimum balnei tempus in febribus, quæ intermittunt & repetunt, id est, cum exhalare iam coeperit febrilis calor. Statim enim corpus
ad

ad nutrimentum parat. Cauendum
tamē à frigido solio his est, quoniam
& crudi, & putrescentes succi minus
apti ad exhalandum, redduntur si q̄s
in eo moretur. Ibid.

16 Quibus ex calida intemperie
caput malè habet hos frequenti bal-
neo dulcis aquæ fouere expedit. Ca-
lidarum aut quæ sponte nascunt, ue-
luti sulfurearū, bituminosarū, alumi-
nosarum noxi⁹ his usus est. 6. de san.

16 Quod à sumpto cibo nauseam
aut hepatis dolorē, aut grauitatem,
aut tensionem pati contigit, à balneo
post cibum omninò arcendi sunt. So-
laq; constipatio prior curanda. tenu-
is succi alimentis, &c. Ibid.

18 A balneis igitur (ut una sum-
ma colligatur) uacuatur quicquid in
corpore, uel humidum, uel fuligino-
sum præfuit: Reducuntur ad natura-
lem symmetriam, tum caro ipsa, tum
cutis: corrigitur solidarum partiū ari-
ditas & calor non modo is, qui ex la-
uacro, sed qui etiam præfuit ex frigi-
dæ usu extinguitur: quod sentiunt n̄,
qui

qui feruenti sole exiccati, huiuscemodi balneo lauantur. Gal. 10. Meth.

DE ALIMENTIS.

SECTIO XIX.



Aetera quidem & curationis, & sanitatis methodus equo precio habetur. At quæ de alimentis est, hunc præter illa scopum habet primum, ut quam optimè concoquantur: deinde ut ex his concoctus ac digestus succus omnium partium naturæ conueniat. Gal. de Euch. & cacoeh.

2 Cognitio alimentorum, cognitione medicamentorum maximè hoc præstat, quod illis sanis, & ægris uti necesse est, his uero non nisi egrotos. 1. de alimentis. Item, Nutrimentum à medicamento uenenofo eo diffidet quod hoc uim corporis uincit, illud ab ea uincitur. 3. de facult. nat.

3 Vitiis

3 Vitiosum sumpti cibi succum purgat abstinencia, sicut & contrarium ipsi intemperantiæ alimentum, exercitatio consueta, & somnus longe à cibo captus. Ibid.

4 Posteriores sumendi sunt cibi, qui tardè permeāt quemadmodum omnium primi, qui celeriter, corrumpunt tamen si in uentriculo morantur diutius. 2. de alimentis.

5 Alimenta citi tardiūe transitus comperiuntur, aliās ob naturalem naturam ab initio cōstitutionē, aliās ob uētris dispositionem, aliās etiam ob esculentorum ac potionum peculiarē substantiam, ut quod sint lenta aut perhumida, &c. 1. de aliment.

6 In uniuersum quod suauius est cibariū facilius ijs, quæ ex æquo sunt salubria concoquitur. 2. eiusdem.

Et paulò post. Tametsi nos utilitatem, quæ ex cibis prouenit spectemus non uoluptatem, tamen quia cibi insuauitas plerunq; officit quominus ipsum conficiamus, satius fuerit interdum condire mediocriter, non

Bb uti

uti coqui faciunt, quorum condimentum
ta plus interdum cōcoctioni obsunt
quàm profunt.

7 Alimenta quantò sunt humidiora
eò sunt excrementosiora & minus
nutrientia. Nam humida ut distribu-
untur, ita etiam solidioribus discuti-
untur celerius. 3. eiusdem.

8 In uniuersum aut acris & amara si
edant corpus parcius nutriunt. Inspi-
da autem & ipsa adhuc magis dulcia,
multum: & multò etiam magis si cō-
pactam adhuc habeant substantiam.
2. eiusdem.

9 In ipsa uictus ratione temporū
ratio est habēda, sicuti & regionum,
& anni temporum. Etenim aut om-
nino melancholicis ac siccātibus ab-
stinere, Hyeme aut uti oportet, quē
admodum æstate humectantibus si-
mul & refrigerantibus: at uerè medię
qualitatis cibi sunt dandi. 1. de ali-
mentis.

10 Exhaustos & graciles paula-
tim reficere oportet, tantum cibi &
potus exhibentes, quantum coque-
re fa-

re facile possint. In ijs autē potionis is
modus erit, ut nec uentriculo innatet,
nec fluctuationis ullius sensum inuehat.
Ciborum uerò potissimum ut ne grauent
quidem ipsum, tāta uidelicet prima cibatione
exhibita quāta priusquam, secunda sumatur
tota prorsus sit concocta. Deinde ut quā
celerrimē concoquantur, quod non nisi à
leuioribus contingere potest. Tertium ut
excrementum eius discedat, & uacuis purisque
uentriculus secundū excipiat sine molestia.
Atque ubi meliores sunt effecti, mutāda
subinde ciborum qualitas & quantitas,
sic ut tum plures, tum ualētiores exhibeantur.
Volatiliaque opponatur & suillæ carnes
immunis porcelli, qui si hyems sit etiam
pridie iuguletur. Nā hesternum quā
rēcens facilius concoquitur, æstate uerò
sat fuerit, si mane immolatus circa solis
occasum comedatur. Sic enim ualentius
semp̄er alimentum uesperī exhibendum
cēsuimus. 7. Methodi.

Nutrimenta simplicia medicamēta

Bb 2

tos

tos admixta corrumpuntur. At si simplicia sumuntur semper integra profunt.

11 Cibariorum alia sunt quæ mor dicatione sua, uentris partes ad expulsiõnem exuscitât ut melicratum, &c. alia substantiam habent ex cibo pharmacoq; compositam, quæ uentrem subducunt, quod medicamentosas in se facultates habeât commistitas. Alia deniq; solum alimēta sunt, medij temperamenti nullaq; uincēti qualitate prædita, tale animalis corpus conseruantia, quale assumpserât, quorum maxima est nobis raritas. 1. de alimentis.

12 Inter panes plurimum nutrit siligineus, post hunc similaceus, tertio loco medius, qui & miscellaneus dicitur αὐτόπυρρον & σὺγκόμυς, ex farina & furfur, quarto furfuraceus, qui minimē omnium nutrit, sed omnium maximē per aluum descendit. 1. de alimentis.

13 Panes purissimi copiosiori fermento subactioneq; longiori egent, quàm

quàm furfuracei quia omniū tardissimè deſciuntur, & exigua mole plurimum ponderis habent. Neq; tam citò aſſari poſt ſubactionem, neq; tam cito ex clibano moueri requirunt. Ibid.

14 Panis homini neq; iuueni, neque exercitationi dedito ſaluberriſmus is eſt, qui tum ſalis, tum fermenti habet plurimū, quiq; maximè fuerit antequam aſſaretur ſubactus. Modus autem ſalis & fermenti ſit is, qui guſtui ſenſum triſtem non inferat. Ibid.

15 Amylum, hoc eſt farina citra molam ex tritico facta, lotis panibus ſimilem facultatem eſt ſortitum, minus enim alimenti præbet, ut illi quā panes non loti, nec calfacit cū cæteri panes calfaciant. Ibid.

16 Ex animantibus quorum natura ad gignendos bonos humores aptiſſima eſt, ſues mediocris iam ætatis habentur. Ex peſtibus enim animalibus ſuilla caro, cibis probatiſſimus eſt, deinde hœdina, mox uitu-

Bb 3 lina

lina. Porcelli uerò excrementis sca-
tent, & agni mucosiores sunt. A' cæ-
teris igitur pedestris generis, meo iu-
dicio, abstinent, qui sanitati ac boni
succi generationi consultum uolet.
Gal. de Euchy. & cacoch.

17 Volantilia quò sunt tenuioris
substantiæ, eò magis bilem mouent
præsertim si calori dominanti occur-
rerint. in 6. Epid.

18 Ex coctis carnibus assatæ po-
tissimùm corpus solidant, ac post has
frixæ reliquis omnibus magis elixæ.
4. de uict. in acut.

19 Cibaria quæ assentes homines
manent, aut in sartagine frigentes, ea
corpori siccus dant alimentum: quæ
uerò in aqua præcoquunt, humidi-
us, quæ in patius condiuntur inter
hæc media sunt, quanquam inter se
pro modo condituræ multum diffe-
runt. 3. de alim.

20 Animalium gressilium testes
concocti sunt longè difficillimi. So-
li uerò gallorum gallinaceū sunt, un-
dequaq; præstantissimi & potissimi
eorum

eorum qui saginati sunt. Ibid.

21 Caro eorum quæ in montibus degunt ob contrarias causas domesticis est durior, nulliusq; prorsus pinguedinis aut paucissimæ ob idq; pluribus diebus imputris seruatur. Alimentumq; exhibet minus excrementum, proinde & nutrit ualentius, & succum gignit meliorem. Ibid.

22 Vinum mediocriter temperatum non solum humoribus quoque temperandis est aptissimum, sed etiã calori naturali excitandæ & reliquis partibus confirmandis summèq; bonum. in ultimo Aphorism.

23. Dulcia & nigra crassos humores gignunt, tenuia uerò discutiunt urinamq; cient fulna & mediocria, moderatè succos temperant. 6. de sanitat.

24 Vino ut utantur omnes, quib. refici corpus est opus, cōsulo: modo non febricitent. Esto tamen id & aquosum, & astringens leniter. Aquosum natura appello, quod tenue est & purum minimamq; aquæ mistio-

Bb 4 nem

nem ferens. Cauendum autem à uir-
noso est quod feriat uires imbecillio-
res. Rursus nouellum, tum aquosius
tum imbecillius quodammodo est,
quàm ut uino conueniat, adde quod
agrius concoquetur, ac magis excre-
mentosum est. Antiquius uerò ut ui-
nosius est, ita uehementius, quàm ut
propositis gracilibus sit ex usu. 7.
Methodi.

25 Hepaticis dolorib. si phlegmo-
ne absit nec intemperie calida uexe-
tur, nil uino esse melius potest. si qui-
dem & morbum coquit, & partē affe-
ctam afficit, & siquid humidæ frigi-
dæ uel intemperiei fuerit, corrigit. 8.
de comp. med. secundum loca.

26 Frigida ante cibum pota hepa-
ti & musculo noxia est, in Hippo. de
natura.

27 Pessima omnium aqua est quæ
ex glacie aut niue liquefit: soluitur
enim quicquid in ea est attenuantis
uirtutis & crassitudine oppletur, ita
ut nunquam postea aquam pluuiam
æquare bonitate possit. in 2. Hip. de
aqs.

28 Aquæ

28 Aquæ uitia pendent ex eius frigidityate omnia, cuius culpa & moratur in præcordiis diutissimè, & fluctuationes excitat, & inflatum uertitur corrumpiturq̃, adeoq̃ uentriculi robur resoluit, ut deterius proinde concoquat. Sed nec digerendo per corpus alimento magnopere conducit.
7. Methodi.

29 Aqua fontana & recēs alijs est præferenda. Quæ autem omnium optima est ea penitus non gustui modo, uerum etiam olfactui omnis qualitatis expers. Videbitur eritq̃ iucunda gustui & celeriter pertransibit præcordia. Porro quæ ex petra ad septentrionem fluit, solemq̃ auersum habet ægrè concoquitur & tardè incallescit, tardèq̃ transit. Cuius ad orientem solē erumpit fons quæq̃ per terram colatur, ea calefit & refrigeratur ocysimè, omniq̃ ætati utilissima est.
1. de sanit.

30 Aquam quæ celeriter incallescere & refrigerare. meritò dixit Hippocrates, nam quantò tenuior, tantò

Bb 5 pati

pati promptior erit, quæ autem tenuior, minimum his imi terrestris. 1. de simpl. med.

31 Oxycrati potu æstate quidam refrigerantur & sitim extinguunt, cuius refrigerationis causa est aqua non acetum, à quo ipsa tanquam vehiculo in partes digerit. Sic etiam si cum uino bibatur aqua efficacius quæ sitis extinguitur, quam si sola, iudicandum est. Ibid.

32 Lac probatissimi succi habetur cum animal ex quo sumitur, boni habitus fuerit. Quare nonnulli pulmonis ulcere affectos, potionis tantum lactis curari putant, antea scilicet quam id ipsum ulcus uastius atque callosum fiat. Sed præ cæteris lac muliebri probatur, tanquam familiarius, quod Herodotus & Euriphon, ab ubere sugendum, ita affectis consuluerunt, quæ simul atque emulctum est, non nihil naturæ bonitatis amittit. Galen. de Euch. & caco ch.

33 Scire autem oportet lac ex his, animantibus quæ boni habitus fuerint,

rint, boni esse succi, ex ijs uerò quæ
deprauati non secus ac sanguis, qui
in illis habetur cacochymum esse. Ibi
dem.

34 Thoricis & pulmonis partib.
lac omne est utile, capiti uerò nisi, q̃s
ipsum habeat admodū, firmum, non
est commodum: ut neq̃ hypochondrijs,
quæ læui de causa inflammatur
plurimis, siquidem in uentriculo in
flatum uertitur. 3. de aliment.

35 Lac triplici dissimiliq̃ substantia
constat serosa, crassa & pingui ex
qua fit butyrum, ex quibus camelinū
asinumq̃ plus serosi humoris, ouillum,
plus caseosi & crassi, bubulū,
plus pinguis. Galen. de Euch. & cacoch.

36 Inter omnia quæ mandimus
lac optimum, optimi succi est, nam
quod uitiosum est, utentium corpora
uitioso succo replet. 3. de alim.

37 Lac serosum etiam si semper eo
utaris, nil unquam adfert periculi. raro
enim in uentriculo huiusmodi co-
gitur, si ut primum mammis excidit,
calidum

calidum fuerit epotum. Quod si sal
& mel adiſciantur fieri non poteſt, ut
unquam coagulatur. Ibid.

38 Nocet autem uſus lactis aſſidu-
us tum dentibus, tum longiuis, has
quidem humidus, illos putridos red-
dens. Sed occurritur huic malo ſi di-
luto, aut meraco uino, cui nonnihil
mellis ſit admiſtum: aut primò quidē
melicrato, deinde aſtringente uino,
os ipſum ſumpto lacte colluat. Ibid.

39 Caſeus omnis craſſi, uetus ma-
li ſucci eſt, recens uerò ſucci prauitate
caret, qui quidem ex melle ſumptus,
aluum ſubducit. Gal. de Euch. & ca-
coch.

40 Olerum cibus omniū tenuiſſi-
mus, ſicuti & fructuum quorundam
cortice duro cōſtantium. At uires of-
fendunt omnes & uitam miro uſu
breuiant. 5. in 6. Epid.

41 Ex cleraceis nihil eſt quod bo-
num ſuccum præſtet. Lactuca tamē
in ijs, quæ boni maliq; ſucci ſunt me-
diocriter ſe habet. Poſt illam malua,
poſt hanc portulaca attriſplex, blitū,
rumex,

rum ex, cætera agrestiaq; omnia uitiosum succum gignūt. Gal. de Euch. & cacoch.

42 Pepones, cucumeres, & melones nisi citissime egerantur, succus in uentriculo putrefaciunt, non admodum a ueneno alienum. Ac cucurbita sola ex talibus fructibus culpanda non est, si tamen corrumpatur, uitiosum etiam succum facit. Ibid.

43 Radices olerum in se acrimoniam habentium, ut allij, cepæ, pori, raphani, & pastinacæ syluestris malū succum producunt, sed ari, cari q; radix & rapi media in ijs, quæ boni prauicq; succi sunt. Ibid.

44 Olerum radices omnium excrementitiæ & concoctu difficiles, aduersissimæ uerò rapæ. his paulò minus bulbi omniū pessimi, fungi. De atten. uict. Et paulò post.

Solæ itaque radices acres & calidæ sunt gustandæ, ut allia, cepæ, & radiculæ ex q; pro pharmacis potius, q; per alimentis habendæ.

45 Allium, cepæ, porrum, nasturtium,

tium, synapi, postilla, smyrnium, pyrethrum, origanum calamynthæ, sisymbrium, Pulegium satureia, thymum attenuantia sunt, uiridiaque omnia mandantur, exiccata uero non amplius sunt cibi, sed medicamenta. Ibidem.

46 Semina sunt suæ plantæ facultate similia, nisi quid magis tenuant siccioraque sunt. Semen autem papaueris est herba ipsa præstantius, pauiusque tanquam innoxium permiscetur. Refrigerare autem ipsum signum est, quod caput grauat & soporiferum est.

47 Fructus qui horrhæi appellantur autumnales omnes malum succum gignunt. Ac ficus & uua passæ ceteris præstantiores, carica cum nucibus, & cum amygdalis præstantissimi etiam succi, reliqui arborum fructus mali succi sunt, neque potissimum quos syluestres plantæ & arbores ferunt. de Euch. & cacoeh.

48 Pomis bene coctis si quid uitæ superest, semper minus eo est, quod crudis

etudis inest. de atten. uict.

49 Palmæ fructus, id est, dactyli præcipuè caput ferunt, si largius sumatur: at reliquum etiã corpus crasso lentoq; succo replent ob pinguedinem, & hepar obstruunt ob dulcedinẽ, quæ huic succo admista est, unde horrores & rigores diuturni. 2. de alimentis.

50 Capparis surculos uirides & teneros non aliter, quàm terebinthi mandũt in aceto simul & muria, aut solo aceto condientes, ad excitandam autem appetendi uim & pituitam. Ventrem detergẽdam lienisq; & hepatis obstructions purgandas, ante alios omnes cibos ex oxymelita uel oxecleo uti oportet.

51 Palmæ uerticem edimus & tenellas spinas elixas, aut crudas uoluptatis magis gratia, quàm necessitate coacti. Caterũ omnia id genus & parcissimẽ nutriunt, & prauis succi sunt productiua, 2. de alim.

52 Oliuæ quod quidem ad propositam dietam, id est, tenuẽ uictus ratio.

rationem, attinet medium quodammodo sunt, medium quodammodo sunt edulium. Edunt autē homines has quidem (nempe caducas) cū pane maiori ex parte, sine pane uerò quas halmadas & colymbadas uocant, idē garo profusus & ante alios cibos uentris subducendi gratia. Galen. de atten. uict. ratione, & 2. de alimentis.

53 Oliuæ halmadæ & colymbadæ succum astringentem habēt plurimum, proinde stomachū roborant & appetentiam excitant. 2. de alimentis.

54 Vuæ passæ cum alijs uuis eandem habent rationem, quā caricæ cum in ficibus. Cæterū ut dulces temperamento sunt calidiores, ita austeræ frigidiores, quæ quidem stomachum roborant, & uentrem constipant, & his multo magis acerbæ inter quas mediam cōstitutionem dulces obtinent. Inter eas autem præstantiores sunt, quæ rū pingues, tum cuticulam habent tenuem, quæ inueteratæ

stata & preuacerata, multò meliores redduntur. Ibid.

55 Optimum in pirrocholis nutrimentum est prissana. Proximum alia cui paulum aceti admixtū sit. Tertium, eadem sint aceto liquida non crassa aut lenta qualē nonnulli præpareāt ad similitudinē pultis. Itē in furno coctus panis utilis est cibus, sicut ē piscibus saxatiles omnes, ex uolatibus optimi perdices, ac mōtani omnes passerēs, &c. s. Meth.

56 Excrementosa sunt omnia alimenta animalium, quæ exercitatione carēt sicut & lacustria, & palustria omnia. Ibid.

57 In omnibus animalium cibus fugiendi sunt, tum uētriculorum, tū recens editorum. Illi namq̃ duri & cōcoctu difficiles. Si uerò nimiū humidi & mucrosi. Ibid.

58 Cibi crassi glutinosi q̃ sunt Panis, qui nec fermenti, nec salis quod satis continet, neq̃ probē maceratus nec coctus: caseus omnis. Placētē ex caseo & melle cōfecta: cochlea oua

Ce dura

dura potissimum frixa. Pisces citacei
ut thynni, Pelamides &c. fungi om-
nes præter boletos, qui sunt mino-
res. Fructus arborum castaneis exce-
pris, quæ si in uentriculo concoquan-
tur etiam si crassi sunt succi, nunquam
tamen mali sunt. de euch. & cacuch.

59 Qui exercentur uehementius,
estate cauere debent, ne ante exercitiũ
comedant mora, aut pruna, aut ceri-
fia, aut cucumeres, pepones, melo-
nes, cucurbitas aut similia. Qui uerò
ratione uictus utuntur pro exercitio
balneum exhibebit, tum cibis boni
succi, aut cum condimento paratis
fruetur. Ibid.

60 Omnium saporum ualentissi-
mè nutrit dulcedo, cui proxima est
pinguedo. Cæterorum uerò, ut quis-
que ad hanc proximè accedet ita ma-
ximè nutrit. 4. de simpl med.

61 Vinũ puero optimæ, id est, me-
diæ constitutionis, quàm diutissimè
ea natura est. ne gustare quidem sua-
se im, quod humectet nimis, & calfa-
ciat corpus caputq; halitu repleat.

Qua-

Quare nec iam adultis, nisi modicè
sumptum est utile, quanquam ad bi-
lis excremento purgāda uel mitigan-
da est, sanè non inutile. 1. de sanitat.
tuenda.

DE MEDICAMENTIS

*ὕγιαινοῖς, id est, salubribus uel sa-
nitatem conseruantibus.*

SECTIO XX.



Vtrimenta medicamē-
tosīs facultatibus præ-
dita, curationi sunt a-
ptiora, quàm quæ alē-
di solum sunt habilia.
His autem neq̃ uten-
dum est simplicibus, sed cum alijs cō-
positis, quæ ad substantiam eorum
altricem magis accedant, quàm ad
medicamentosam. 2. de uict. ratione.

2 Inuenta medicamenta salubria
sunt, quæ tenuandi tim possident,
quæq̃ obstructionem liberent. Quā-
quam horum frequētior usus, uel se-

Ec 2 rosunt

rosam, uel biliosam, uel melancholicam, procedente tempore sanguinem reddit. Huiusmodi enim non solum incidunt & tenuant, sed etiam immodicè calfaciunt, ob idque & solida membrum exsiccant, & crassum humorem reddunt, quò in renibus asse, gignuntur calculi. Gal. de euch. & cacoch.

3 Deiectionibus alui grauioribus astringens uinum, calidis uerò mannis aquosum, neque uehementer odorum tribuendum. 2. de morb. acut.

4 Vini præcipuè dotes sunt, quod concoctionem horum imperfectam compleat, ut urinam ciat ac sudorem & somnum conciliet. 4. de sanit.

5 Reliquæ uinorum laudes, uitæ aquæ contrariæ sunt, inflata enim præcordia subsidere faciunt, nec inibi moram trahunt propter caloris medietatem. Digestionis uias aperiunt & nutrimentum celeriter deducunt. Præterea sunt boni succi & ad miscenda coquendaque ea quæ in uentriculo, & uenis consistunt idonea. Vires quoque organorum adaugent, & expellunt

pellendis excrementis uiam faciunt.
7. Methodi.

6 Aqua uitia præterquam quod fluctuationem in uentriculo mouet, & concoctionem impedit, sitim etiã in tussi excitat tantum abest, ut secretionem efficiat, in bilem uertitur uentre uacuo pota, caput offendit hepar obstruit, & lienem. in 3. de morb. acutis.

7 Ptisana ex optimo ordeo confecta, ipsum p se satis absterget, ut hyssopo non magnopere egeat. Sin aliquando intendere uim eius uelis nõ mel, neq; piper admiscetur. Nisi ubi pectori & pulmone curandis uti libuerit. de att. uict. ratione.

8 Hordeum ex quo conficienda est ptisana, aliquandiu in aqua præmacerandum, postea in mortarium coniectum usq; eo terendum re qua dam aspera, dum is, qui in superficie est cortex abijciatur. Quod si non quicquid est paleaceum, deciderit, ptisana elixa quidem magis deterget, nullam autem aliam noxam accipiet.

Cc 3

capit.

cipiet. 1. de alimentis.

9 Lac quod ignitos lapillos, aut orbiculos ferreos extinxerit, uentrē sistit & hīs auxiliatur, quibus uenter acrium excrementorum morfu infestatur. Facile tamen sic paratum lac in uentriculo cogitur ob idq̃ mel illi & salem adiicimus, & aquam etiam, quæ seri acrimoniam corrigit. 3. de alimen.

10 Prodest etiam abscessibus acrimordentemq̃ materiam excrementibus. 10. de simpl.

11 Lac celerrimē mutari est aptū, utiq̃ genitalis seminis ritu, q̃ nec ipsum aliquam diu extra uasa propria, ut uires seruet, morari patitur. Propterea utilissimum, si ex ipsis māmilibus quis hauserit. Gracilibus potissimum & siccatissimum muliebre, utpote cognatum, sed quoniam pleriq̃ recusant asinum ipsis admota asina, ut asinis dari conuenit. 7. Methodi.

12 Lac omnē facultatem deſcendi alui à sero habet, sistendi à casciosa substantia. Quare plurimo sero deſcien-

cien-

ciendam aluum ueteres usi sunt. Cul
tamen mellis optimi, & salis adijci-
dum, quantum citra stomachi euer-
sionem suaue sentiatur. 3. de alim.

13 Ad crassos lentosq; humores
attenuandos & expellendos, opti-
mum est melicratum secundum opy-
meli. Tertium ptisana. Quartum ui-
num suaue. 3. de morb. acut.

14 Idoneum uerò est in intempe-
rie humorum, & si mulsa in qua inco-
ctum sit absynthium bibatur. Nam
id quoq; tenues succos, quicunq; ui-
delicet in ipsius uentriculi ore conti-
nentur, commode deorsum impellit.
7. Methodi.

15 Butyrum ex melle deuoratū di-
stributumq; mire admodum pro-
dest pulmonī, & lateribus phlegmo-
ne affectis, ut sputum moueatur, id
est, pleuriticiis peripneumonicisq; af-
fectibus, cum hoc quod eos etiā con-
coquat. Digerit autem & concoquit,
proinde & cataplasmatibus indi-
cat, quæ extrinsecus imponuntur parotidibus
hypochondrijs bubonibusq; 10. de
simpl.

Cc 4 16 Sa-

16 Sanè acetum non modo tenui-
um est partium, sed etiam non medi-
ocrem reprimendi uim habet. Quo
rationabilius profectò in principijs
affectuum ipso utuntur rosaceo ad-
miscentes. Procedente uerò tempo-
re ad cerebri & membranarum phle-
gmonas etiam spondilij & serpilli,
(quibus non iam modo partium te-
nuitas, sed etiā calor inest) admiscent
aliquid, quò scilicet tempore transire
ad ea, quæ concoquant & digerant,
conuenit, atq; hæc utraq; ualentiora,
quàm postulet ipsa pars affecta deli-
gere: ceu uiribus eorum per ea, quæ
intersunt ossa remittentibus cerebri.
11. Methodi.

17 Sanè & castoreo ad phlegmo-
nas utimur, cū tamen in alijs phle-
gmonis ei minimè utamur, quamuis
etiam in summa sint inclinatione, est
enim id calidius, quàm ut his sit ido-
neum. Phlegmonis autem capitis cir-
ca cerebrum, si iam inclinant est uti-
lissimum, quoniā non continuò his,
sed ossibus primū interiectis occur-
rant. Ibid.

18 Ace-

18 Acetum matricibus & cæteris huiusmodi partibus neruosis, & inimicum propter refrigerationem, quod habet cum acutissima tenuitate coniunctam. in 3. de morb. acut.

19 Serapium ex aceto non nisi ualentibus uiribus præditis est propinandum, alioqui enim humores, qui per sputum uacuari debent exiccat, effunditque incidendo quicquid in pulmone & pectore est crassum uel lentum, ex quo hominem suffocat tandem 3. acut. morb.

Et paulò post.

20 Vbi uerò modicè temperatum aceto fuerit os, & palatū emollit, sputum promouet, siuim extinguit, obstructū hepar recludit & leniter purgat, bilem ex melle conflata incidit, flatum discutit, urinā ciet, materiamque deorsum pellit quā ocysimè. In summa nullo incommodo afficit, nisi quod siquid sæpius utatur, dysenteriam parit. ibid.

21 Epileptico, oxymelite audacter utendum est, ex quo etiam capparitis

Cc 5 sum-

sumi potest, pauxillo olei instillato. Quod si acetum ipsum stilliticum fuerit, coxymeli longè magis iuua-
bit. Cæterum si oxymel bibere puer
uelit temperetur copiosiori aqua: &
hyeme calidum, æstate frigidum offe-
ratur. Sic quidem præter cætera ma-
ximè sitim sedat. Consil. de puero e-
pil. Cæterum acidissimum quartam
ad mel aceti partē habet dulcissimā
octauam, Ibid.

22 Corpus exactè frigidum & si-
mul tenuium partium inuenisse for-
tasse non est. Nam acetum cum om-
nium (quæ nouimus) potestate refri-
gerantium planè tenuissimarum sit
partium, admixtam sibi aliquam ca-
liditatem habet. Præterea corpora
quæ contingit siccat, quāuis ad ima-
ginem sit humidum. Quò fit ut ad e-
os affectus quos humectari & refri-
gerari expedit, solo eo non utamur,
sed tanto aquæ frigidaæ admixto, ut
possit bibi. 10. Methodi.

23 Quemadmodum nonnunquā
serap,um pro cibo sic etiam ptisanā,
pro

pro medicamento usurpamus atque
utrunq; in quibusdam sæpe morbis
fecimus, in morb. acut.

24 Reperire etiam est medicamē-
ta, quæ cum una sint ipsa vires con-
trarias habeant, siquidem lapathi fo-
lia ventrem soluunt, semen uerò re-
stringit, sic gallinaceorum iuscula: itē
brassicæ soluunt, caro ipsa astringit.
Aloë squamæq; æris excrescentes ul-
cerum carnes astringunt, sumpta ue-
rò per os uniuersum corpus purgāt.
Lactis serum bibitū soluit, caseus co-
hibet. Trifolium decoctum imposi-
tumq; ferarum moribus auxiliatur,
si sanæ parti affricetur non secus, quā
uiperæ morsus affligit. Præterea ue-
ratorum coturnicibus, & cicuta stur-
nis, cibus, hominibus sunt pernities.
Gal. de Theriaca ad Pisonem.

25 Quæ uehementer sunt austera
& pontica, ut quæ uocantur præco-
cia & mespili, sorbi, &c. tenui uictus
rationi sunt aduersa. Soli autem uen-
tris fluxui, aut uentriculo stomacho/
ue imbecilli s conferunt. Galen. de
attin.

attin. uict. ratione.

26 Medicamenta in suo genere odoratissima & flagrantissima semper sunt eligenda. Cæteris qualitatibus, quæ sunt maximè temperata. 5. de com. med. secundùm loca.

Addit Moyses.

Asclepius (Hodie inquit) non proponamus helleborum album pituitosis corporibus, siquidem præter uacuationem habet nimiam quoque refrigerationem, sed pro illo, agarico utimur & similibus.

27 Non omnibus aquæ membris conferunt quælibet medicamenta, sed nonnulla certas partes iuuant, alia uitiant, ut lepus marinus pulmonem exulcerat. Cantharis peculiariter uesicam. Econtrariò iuuat affectum iecur herba eupatoria, myrobalanus lienem, Saxifragon & betonica renes, &c. Gal, de Theriaca ad Pison.

28 Caricæ cum amygdalis obstructions aperiunt, non tamen ita bonum succum præstant nutriuntque, ut cum nucibus commiscentur. Suntque
caricæ

caricas cū nucibusq; præsumptas uenenis aduersari fateantur. Galen. de eueh. & cacoch.

29 Vinum, lac, acetum, cum sale ebullita prosunt aduersus uenenum, uenenososq; succos corpori nascentes. 6. in 6. Epid.

Addit Moyfes.

Accipe illa non singula tātum per se, sed pro ratione ueneni composita sumi oportere.

30 Crudo succo refertis, quando præcordia turgent, & facile quicqd sumpserint in flatu uertunt, non inutile fuerit & lōgi piperis, aut albi, aut nigri aliquid dare, sed album supra reliqua alium roborat, nigrum quod pondere præcellit, eligendum. 4. de sanit.

31 Lassitudini phlegmonosæ, si carnem uelit gustare æger, saxatiles pisces, uel onuscois ī albo iure (quod anetho, sale, oleo & porri exiguo in aquam coniectis conficitur) bene elixos dabis.

Additio.

Latitudo illa est tensiua cū ex abundantia

dantia sanguinis in thorace uel dorso, uel lūbis, uel capite, uel collo, uel toto corpore tensio pulsansq; dolor sentitur. Ibid.

32 Allium itidem flatus citra sitim resoluit, sed maiori uehementia, quam ciborum alijs quisquam. 2. Method.

33 Obstructio lienis aut phlegmone scirrhusa uehementiora ea tum, quae eximant, tum quae phlegmonem dissoluant postulat. Nam quale medicamen est iecinori absynthium, tale est lienī capparis cortex. Quale rursus iecinori quod uocant eupatorium, tale est lienī scolopendrum. Itaque et si capparis ex oxymelite edatur, utilis sanē utriusque est uisceri. Sed lienī copiosior & ex minus diluto oxymelite erit utilior. 13. Methodi.

34 Infestissima est aloë uel lota, quae citra uitiosos intemperie laborat calida & sicca stomachi, etenim intemperantiae in humoribus consistentes pharmacis ipsas euacuantibus egerit, quae uerò sunt in humoribus, penitus in tabem commigrant, ob pharmac

maci hieræ picæ ex aloë constantis
exhibitionem. 8. de comp. med. secū-
dum loca.

35 Absynthium miscetur in pastil-
lo Asclepiadis ad stomachi uoluulo-
sas s. buersiones, quod habeat uim
extergendi, repurgandi, & subducen-
di, uitiosos humores stomachi, quod
que constringat & denset roburq; af-
fectæ particulæ addat. Ibid.

36 Bdellium sufficienter concoctum
emollitq; necnon moderatè discutit,
Sic Therebinthia, sed præterea an-
gustos meatus exterget expurgatq;
quibus rationibus utrunq; hepaticis
remedium est. Ibid.

37 In nardo est non modica uis
cōcoctoria omnium frigidarum ui-
scerum affectionum sita. In celtica au-
tem minor quàm in rudica. Crocus
uerò humorum crudorum est conco-
ctionis, atq; item uirulentarum affe-
ctionum. 9. eiusdem.

38 Hiera confert ijs, qui ob uitio-
sos humores & præcipue biliosos tar-
dè concoquunt. Siquidem quibus
bilis

bilis altius tunicas uētriculi infestat,
 n̄ pręstantius pharmacum non inue-
 niant. 8. eiuldem.

39 Facultatum alexipharmacarū
 natura est duplex. Quędam enim al-
 terant & conficiunt uenam in corpo-
 re, idq; aut una qualitate ratione con-
 trarietatis, aut duarū coniungatione,
 aut deniq; tota sua substantia. Alia e-
 uacuant deleterum medicamen. idq;
 substantię similitudine aut calidita-
 te subtilium partium. 5. de simp.

40 Omnia quę deleterijs aduer-
 santur medicamentis si largiūs sum-
 pta fuerint, grauit̄ animantis cor-
 pus offendunt. Quapropter ea mo-
 deratione exhibeantur, ut nec nimia
 copia corpus lædant, nec exiguitate
 sua à deleterijs uincantur. Ibid.

41 Theriace utendum est post ab-
 solutam concoctionem, interdū qui-
 dem instar Aegyptię fabę, cum binis
 aquę cyathis, interdum uerò auella-
 nę nucis magnitudine ex tribus a-
 quę cyathis, cum plus temporis ad
 pharmaci distributionem es habitu-

rus

rus. Galen. de theriace ad Pisonem.

42 Theriace prodest & sanis si crebro ipsam assumant ut conseruetur, nam hoc auxilio sepe succurrimus elephantiacis, nec minus ualet ad animi, quam corporis morbos, quippe melancholicis si saepe exhibeatur, medetur bilem ipsam exhauriens. Item aquæ pauorem, qui morsos à cane rabido infestat omnium morborū pessimum tollit, non modo epota, sed etiam admota cum rosaceo, & indita uulneri, ut cucurbitulæ instar unius exugat, & extrahat. Ibid.

43 Retulit mihi medicus quidam peritus, circa Antiochiam, morbum pestilentialem inuasisse magnū mortalium numerum absumentem. Cui cum cetera omnia minus efficacia experirentur medici, theriacam ipse apponi iussit, qua sumpta & morbo iam infecti curabantur, & qui integri erant adhuc seruabantur. Ibid.

44 In cōfectione theriaces, bestiarum ex quibus fit capita & caudæ auferuntur, quod in his partibus omne

Dd earum

earum uenenum resideat. Reliquū corpus euisceratur excoriaturq̃, omni adipe amoto, tum in fictili uase, cū aqua quantum satis esse uidetur, & germine anethi addito recentisq̃ salis pauxillo coquitur carbone potius quā ligno, donec facilē à carne sputæ amoueri possint. Tunc carnes ipsæ & uase exemptæ, cum panis purissimi medulla contunduntur ac lenigantur, & affuso insculi quantum uidetur, manibusq̃ opobalsamo intinctis conficiuntur orbiculi, qui in umbra repositi, ad totius antidoti cōpositionem seruantur. Ibid.

45 Crocodyli piscis puncturā appposito ex eiusdem substantia medicamento sanari, item mustelæ & ferarum multarum, applicata ex ipsis decepta portione. Ibid.

46 Saporum calidorum quatuor sunt genera, dulcis, salus, amarus, & acer, frigidorumq̃ totidē astringens, austerus, acerbus, & acidus. Vnctuosus uerò mediæ inter utrosq̃ qualitatibus. 2. de simpl.

47 Acri-

47 Acrium quædam idonea sunt
esui, quibus pro obsonio utimur, &
dulcem quandam etsi obscuram qua-
litate habent. Alia non eduntur,
quæ aut mortifera sunt, ut ne gustare
quidem audeas, ueluti cantharides
& thapsia, aut simpliciter medicamē-
ta, quæ uel ex odore pugnantiam cū
homine indicant. Cicuta papauer
mandragora, lycopersium & hyoscy-
ani succus. Huius generis exeden-
tes, urentes crustam molientes, & col-
liquantes sapes, si uel ipsi cuti im-
ponuntur. 4. eiusdem.

48 Amara minimè putrescunt, sed
sunt animantibus propè uniuersis e-
sui inepta, cū animal omne sit hu-
midum. Absynthium autem usui est,
quæ non solum amarum, sed etiam
astringens. Ibid.

Quod amarum est nunquam fit
odorum. Siquidem generatio ama-
ri saporis ex dulcibus proficiscitur &
calore extenuatis ac proinde amara
calidiora simul & tenuiora sunt dul-
cibus. Ibid.

49 Exploranda est acidi saporis natura in exalide & oxylapatho, ut in quibus reperiatur maximè syncerus & simplex. Etenim quod propriè saporibus appellatur acidum, à sola lingua percipi potest sicuti & acra. Sed quod utriq; cōmune est, nempe mordacitas etiam à tactu sentitur. Sunt autem acida essentia tenuis & frigida, ut constitutio borealis, nec nasci sine calore possunt, quemadmodum nec ipse aër. 4. de simpl.

50 Sola dulcia omnia pro dulcedinis modo, calorem etiam protinus continent. quæ circa eorum, quæ admodum dulcia sunt, nullum est frigidum. Porro dulcia omnia proximè accedunt, ad eorum quæ talia videntur, idq; aut proprio calore, ut mel, aut acquisitio ut sūt ea, quæ ab igne preparantur omnia. At mustum non solum suo, sed etiam acquisitio dulce esse videtur. Et quæ inueterantur uina calidiora fiunt. Nam cū primū quidem dulcedinem quandam acrimoniamq; habeant, acrimonia cum tem-

tempore deposita dulcescunt, rursus
uerò incremente acrimonia dulcedi-
nem abijciant, & in dies amarescunt
unde constat, dulce esse calidius au-
stero, sicuti & dulci amarum. Ibid.

51 Acerbus sapor (qui est au-
stus) omnis est frigidus, nempe à
frigore, sicut & acidus proueniens,
sed magis terrenus quàm acidus. Sen-
titur autem ab acerbo sapore lingua
manifestè contrahi siccare asperariq̃,
quæ omnia unius frigoris sūt opera:
exempla sunt in fructu ilicis, qui acer-
bus ad extremum perseuerat, item ar-
buti fagi & corni. Myrti uerò, puri a-
grestis & roboris acerbus est, simul
& dulcis. Ibid.

52 Ego astringens, perpetuò frigi-
dum comperi, nonnullaq̃ modicè
dulcia aut amara, aut acria simul cū
astrictione sum expertus etiam aptè
refrigerare. Porro astringens idem ui-
detur significare, quod austum, aut
utriusq̃ commune genus esse. Sed
falluntur, qui astringentia omnia re-
frigerare dictitant, siquidem chalcit-

Dd 3 tis,

tis, chalcanthos & misij, ualenter astringunt, sed tanta caliditate, ut nos etiam exurant. 2. de simpl.

53 Salsa cognominamus, quæ linguam non contrahunt, neque constipant, sed detergunt potius & abluunt, etiam si astringentium quippiam admistum habeant. Ibid.

54 Aromaticum odorem inferentia omnia sunt calida & acris inciduntque & extenuant: humores uero quanquam non æquæ ac mordicantia & rodentia, & insigniter ealfaciētia. Gal. de att. uict. ratione.

55 Abstergunt siue acrimonia ualida hæc, facca farina, alicæ aqua, lini semen frixum, lac ex ficibus siccis, id est, rarietie coagulatum: sapa etiam rarefacit. At ualentius abstergunt hæc therebintina, thus, manna orobi farina, radices iridis & opopanacis. 7. de comp. med. secundum loca.

56 Medicamenta emollientia uocantur medici, quæ indurata frigore corpora leniendo laxant. Faciuntque potissimum ad apostemata & huiusmodi affe-

affectus materia superfluam in se cō-
tinentes, quòd plurimum calfacere
ac coquere, & modicè siccare ualeāt.
In quibus affectibus maiore medica-
mento, quàm parti calorē esse oportet,
ut resolvere innatam duritiē possit.
Huius uerò generis sunt. Ammoniacum,
bdellium, ceratum, corussa,
colophonia, &c. 5. de simpl.

57 Inueteratum dolorem siue ex
humoribus sit, siue ex flatib. calidis,
uel frigidis, medicamenta calida pri-
mo gradu siue astrictione iuuant ma-
ximè, cū enim sint tenuissima ma-
iorem digerendi, & attenuandi uim
habent. 7. de comp. secundū loca.

58 Putrefaciunt maximè, quæ ca-
lida sunt & humida, ut quæ hominis
in hoc temperamento sint similia. ac
lotioni commodissima cum aqua te-
pida uel oleo mixta, & instillationi,
oleum mediocriter calfactum In far-
tui uerò triticea farina cum oleo &
aqua.

59 Ad proritandam abundè urina
medicamenta uehementer calida

D d 4 po

potissimum conueniunt. Huiusmodi sunt. Semen apij, fœniculi, iridos, dauci, siseleos. Ad calculum uerò dissecandum, mediocriter calida, siquidem is ex uehementi calore & siccitate concreuit. Melius ea incidunt temperata radices asparagi, uua passa & oxymel scilliticum. 5. de comp. secundum loca.

60 Eodem genere qualitatibus continentur, quæ lac gignunt, & quæ mēstrua mouent, & quæ urinam prouocant. Omnia enim sicca sunt pariter & calida, sed non æquæ, nam quæ lacti gignendo sunt apta natura, ea mediocriter calfaciunt, nec ualde siccant. Quæ uerò mensibus ciendis, magis calfaciunt, sed non magis siccant, quæ ex his composita, urinas prouocant. 5. de simpl.

Huc pertinebunt simplicium in usum uenientium gradus, qui ex Fuchsio, aut alio docto poterunt describi. Moyses 265. numerat, quæ corpus intrēt, & 20. quæ tantum

tum extra adhibeantur, ex sentē-
tia nescio cuius filij Euferei. Tutius
uidetur hac in parte recentiorum
& cūm præsertim ille ex Gal. non
sumpserit nostrorum sequi ordi-
nem.

61 Flauam bilem interdum medi-
ci pallidam uocant. Sciendum tamē
est, flauam tantō esse pallida calidio-
rem, quantō & crassiorē. Nam sero
so recremēto flauæ bili permisto, pal-
lidam constitui contigit, sicuti & fla-
uam ipsam plusculum excafactam
consistentia reddi crassam, colore au-
tem flauam. Quin & in animalibus
apparet flaua quidem ijs, quæ magis
sunt calida, quæ uerō minus, pallida.
Et ubi calida illa aut fame, aut siti tor-
quentur, ad atrum colorem uergit, in-
terdum habent illum æruginosum,
interdum cæruleum, interdum fu-
scum. 10. de simpl.

62 Vbi ulcus diuturnum fuerit ac
multam saniem, & pus cōtinebit, sic-
ciorem bilem adhibemus puta ouis,
Dd 5 quæ

quæ paulò est acrior suilla, hac etiam magis caprarum, cui adsimilis quodammodo est urforum & boum: at taurorum his ualentior est, inferior uerò bile hyænarum, uolatilium omnes sunt acriores & sicciores quam quadrupedum. Inter ipsas quoque uolucres gallinarum & perd. cum biles ad medicinæ usum probatiores. Ibi dem.

63 Humectantium refrigerantiumque omnium simplicissimum optimumque ad erysipelata, & pudendorum phlegmonas, inter initia priusquam aliqua subindicaretur, putredo hoc ceratum est. R. olei rosacei ex omphacino, oleo citra salem confecti uncias 3. uel 4. Cerae albæ, & elotæ unciam unam. Liqueantur simul in uase duplici ac fiat ceratum humidum, cui abundè refrigerato misceatur paulatim tantum aquæ frigida, quantum in se accipere possit, dum cum ea molliatur. Non debet autem superægrum corpus manere, dum manifestè incaleat, sed assidue subinde mutari,

tari. 10. Methodi.

64 Agrestis quidem allio comesto uinoq; ad uesperam meraciori bibito, à dolore colico liberatus est, neque iniuria. Allium siquidem flatus discutit, ac minimū sitim infert. Quare ipsum Theriacen agrestum appellare soleo. Est ijs omnibus commo-
dissimum, qui regionem frigidam incolunt. 12. Methodi.

65 Quod intestinorum dolor ex crassis succis citra febrem exercet, ijs & allium esse, & theriacem bibere licet. Sin cum febre sit, principio fauentum siccum ex milio, si ferant, adhibendum. Si ab hoc non quiescūt, semen aliquod flatus dissipans in oleo renuium partium coquere, mox per lintheum colare. Dein anseris aut galinaceū semē, nec falsum, nec admodum uetus in ipso oleo liquare, & p sedem infundere. Ibid.

66 Cataplasma ex caricis pingui-
bus dulcibusq; & decoctis confe-
ctum, cui aliquando hordeacea fari-
na, aliquando panis syncomistus, id
est,

est, miscellaneus ex generoso tritico
 confectus adijcitur, conuenit tumor/
 ribus in quibus suspicio crassiores te/
 nacioresq; humores impactos esse
 & difficulter ad suppurationem pro/
 uenit. 2. ad Glauco.

67 Farina hordeacea resoluit plu/
 rimum, sed triticea maximè ad suppu/
 rationem promouet. Si igitur resol/
 uatur tumor, minus tamen quàm o/
 ptes, cum caricis hyssopum & origa/
 rum simul coquere oportet. Deinde
 farinam ordeaceam detracto priùs
 furfure, insperge, & postquam
 plurimum ebullierit ap/
 pone cataplasma.

DE

DE MEDICAMENTIS

per se & ui sua operantibus.

SECTIO XXI.

1.



lrum esse non debet si
uiperarum capitib. &
caudis ꝑcis reliquæ
partes efficacius me-
dicamen reddunt: Nā
ceterorum quoque a-
nimalium pleręq; partes multis mor-
bis per se opitulantur. Veluti muriū
capita, quæ uisita, ex melleq; illita alo-
peciam sanant. Quod idem & eorū
simus ex aceto, & uiperina pellit reda-
cta in pollinem, & cum melle im-
posita efficit Gal. de theriaca ad Cæsa-
rem, siue in Pison.

2 Cameli cerebrum arefactū seu
exiccatum, potumq; ex aceto comi-
tialibus morbis medetur, & mustelæ
similiter: hirundinis uerō ad suffu-
siones oculorum, & ouillum ad den-
titiones infantium cōducit, ut ad ua-
cillantes etiam aliorum ceruinis cor-
nura-

nuramentum adustum cum uino tritum & circumlitum. Ibid.

3 Taurini cornu rasura, cum aqua pota sanguinis ē naribus eruptionē cohibet. Item & fœmora combusta, ut sæpenumero aluum solutam. Ibidem.

4 Bouis talus ex lacte potus educit rotundos lumbricos ascarides dictos, ex oxymelite lienem incrassatū consumit, & attenuat, leucasq; tollit, illitus mediocriterq; uenereus existit Ibid.

5 Item terræ intestinum, id est, uermes terreni triti, & ex melicrato bibiti arcuato morbo, id est, ictericis subito auxiliant. Sic Scarabeus oleo ebullitus, uel frictus & aurium doloribus instillatus. Adeps anatis uel anserinus liquatus, oleoq; rosaceo mixtus, phlegmonis, Hippopotami cutis, usta & lenigata ex aqua phymatibus digerendis: Cancer fluuiatilis tritus.

Illitusq; spiculis & surculis extrahendis:

Alanda usta & comesta colicis,

Vaccini lactis potus dysentericis:

Testis

Testiculi castoris poti conuulsionibus,
Crocodili adeps partibus ab ipso lēsis.

Milui caput absq; plumis combu-
stum & quantum tribus digitis com-
prehendi potest bibitum, podagre.
Ibid. Vino imbecillo & aquoso ser-
uando ne ace scat. Stœbæ copiosa in
calidissimam donum coniectæ. qua
industria usus est, & pater meus. In-
funde bat autem, ut a scopo non erra-
ret, uinum nouum non nouis uasis,
sed ex quibus aliquod iam uetus ua-
cuasset. i. de antidotis.

6 Lapis phrygius crudus acerri-
mus ignitus & cum alijs quibusdam
trititis fit oculorum præsentaneum re-
medium. de theriaca ad Pisonem.

7 Radix pæoniæ astringit estq; o-
mninò resiccatoria, quare ex collo
pueris suspensa comitiat, morbum sa-
nat. idq; aut aliquem ex se fluorem p
infantuli inspirationem immittens,
aut aërem assidue mutans, atq; alteri
reddēs. Nam hoc succus cyrenaicus
columellam phlegmone affectā iu-
uat, & melanthium frictum, palā ca-
tharos

tharrhos & coryzas desiccat, si quid id in calidum linteum rarum liget assidueq; ex eo caporum p̄ inspirationem trahat in nares. 6. de simpl.

8 Si compluribus linis & maximè marinæ purpure, quibus collo uiperæ iniectis præfocaueris, postea cuiuspiam collū obuincias mirifice profueris, tum paristhmīis, tū omnibus iis, quæ in collo pullulant. Ibid.

9 Stercus canis, qui solis ossibus fuerit integrum biduū nutritus, durum cādidum & minimè fœtens, exiccaturq; & redactum in pollinem ad anginam, dysenteriam, & summæ inueterata ulcera accōmodatum est. Ad anginam quidē, iis mistum, quæ alioqui huic affectui conueniunt, si soluentibus ad dysenteriam iniectū lacti decoctum, & quod silices candentes, aut cylindros extinxerit. 10. de simpl.

10 Sic pueri stercus, triduam optimo pane nutriti & lupinis, ac uino modice diluto, quarto die exiccatur, & cum melle attico ad leuorem tritum

tum illitumq̃, gutturis inflammatio-
nibus auxiliatur. Lupinum quod (si
potest) non deciderit in terram uino
albo, aut aqua temperatum, & potū
colicis qualibus hora si uacent phle-
gmone. Et illis appensum uinculo
ex lana ouis à lupo laniata aut cerui-
na pelle confecto.

Caprillum farina fabacea adiecta,
& oxycrato induratis lienis aliarum-
que partium tumoribus, ustum uerò
alopecijs & omnibus uitijs, quæ ex-
tergentia postulāt pfore, lepræ, liche-
ni, &c. Eo etiam quidam medicus in
agris utebatur ex aceto ad uiperarū
morsus aliarumq̃ bestiarum ac pro-
fecto ex ijs complures seruauit. Idē
etiam spyrathos ipsas ad auriginem
ex uino propinauit, & ad profluuiū
muliebre, cum thure apposuit.

Acrius tamen est medicamē quod
mulieres urbanas aut pueros, aut o-
mnino qui tenera sunt carne sanare
possit.

Bubulum uesperū moribus, exic-
cat enim & attrahit. Et hydropicis
Ee obli

oblitum postea in sole expositum : item phlegmonis, sed humidum ab herbis comestis accommodatius, & à puleis.

Ille idem medicus ouillo utebatur acrochordonas mymecias, thymos, furculos aceto uidelicet diluens. ad ulcerum ambustam cerato rosaceo.

Columbino, sicco, trito, & cribrato una cum nasturtij, semine uice napyos utar ad omnes inueteratos affectus, qui rubrificari postulant, coxendicem, hemicraniam, scotomata, uertigines, cephaleam, & laterum scapulatum ceruicis ac lumborum dolores antiquos, ad affectus coeliacos, podagras, arthritidas, quando in articulis nondum concreti sunt.

Gallinaceum tritum propinatūque cum tribus quatuorue oxycrati, aut oxymelitis cyathis, eos iuuat, qui à comestis fungis auguntur. Infirmus autem concludarum, quam in agris pastarum pallinarum.

Anserinum præ nimia acrimonia inutile, ita etiam accipitrum, aquila-
rum

rum & ciconiarum. hæc omnia Gal.
10. de simpl.

11 Salina ieiuni uētriculi post probam concoctionem, nutrices pueris lichenas curant, paruum, uidelicet digitum rigantes, ac deinde cutem affectam confricantes. Ibid.

12 Triticum mādentes rustici non pauci furunculis imponunt. Nam celeriter eo digerit concoquitq; cum si macerarent aqua, non æque prodesset. Ibid.

13 Maximè digerentem exiccantemq; uim (ut ferunt quidam) ossa humana obtinent. Noui siquidem numerantiū quosdam combusta illa potui exhibuisse, ac multarum sic epilepsiam & arthritim curasse. 11. de simpl.

14 Exuium serpentis quidā cū in aceto bullitur scripsere dentium doloribus mederi. Ibid.

15 Albumen oui opthalmiis, & ulceribus sedis ac pudendorum omnibus contumacibus. Vitellus maximè naturalis proinde ceratis minimè

Ee 2 mor-

mordicantibus misceſ, exiccat enim
& mitigat. Crudum uerò totum ro-
ſaceo admixtum palpebris, mammis
auribus alijsq; partibus inflammatis
adhibetur. Ventrīs quoq; fluxionib.
in aceto coctū & eſum, Ambuſtis u-
tiliſſimum protinus impoſitū, ſiue al-
bunem ſolum molli lana exceptum,
ſiue totum cum uitello confuſum &
commixtum. 11. de ſimpl.

16 Intestina terræ contrita ner-
uisq; diuiſis impoſita mirum in mo-
dum ea prodeſſe eſt proditum. Præ-
terea cum uino pota, urinæ mouen-
dæ idonea. Ibid.

17 Acetum quæ ex incidentium
ordine eſt diſcutitq; & repellit, ob exi-
guam quam habet ſubſtantiæ cali-
ditatem, & ſummam frigiditatē, quæ
tenuium tamen eſt partium idoneū
ad achores fauoresq; incidendos, &
facultate ſua diſcutiendos ac re-
pellendos. 2. de com. med.
ſecundū loca.

DE

DE DEFINITIONIBVS

*morborum et quorundam quibus
ambiguorum distinctionibus.*

SECTIO XXII.

I.



Epletio in uasis dicitur
copia maior sanguinis
quam fuit, qualitate nō
mutata. Repletio in ui-
ribus sanguis in affectū
contra naturam mutatas, ueluti acré
mordentem crudum, &c. etiamsi nō
sit eius magna copia. Gal. de uenæ se-
ctione, & lib. de Repletionem.

Addit Moyses.

Succus quem crudum & indigestū
dicit Gal. lib. de plenitudine, ex quo
hydropem hypofacrum ait fieri, is est
quē sæpe alibi uocat, Phlegma cras-
sum simile fabaceæ farinæ decocto.

2 Sanguis purus omnino in cor-
pore nullus est, nam ei bilis utriusq;
& pituitæ semp̄ aliquid admixtum.
Propterea cum sanguinis plenitudi-
nem dico humorum quatuor reple-

Ee 3 tio-

tionem intelligo. de plenitudine.

3 Sanguis ærugineus appellatur, cui inest acredo quædam uenenosa, & substantiæ tenuis aquasitas. 2. in 2. Epid.

4 Chymos, id est, humor uel succus humidus propriè in animalibus. Chylus uerò in fructibus dicitur. in 1. de humoribus.

5 Humores plantarum duplices sunt. aut enim comprimuntur, ut in uuis, malis granatis, cydonijs & huiusmodi, & frondibus è quibus exprimitur succus, dicunturq; hi propriè chyli: aut ex ijs profluunt, quorum q subtilissimi sunt Lathrymæ dicuntur, ut in ramulis uere succisis cernitur, q crassiores fæcus, uim liquatis, q deniq; iam spissi, Erumni liquor quidē non dissimilis lacti. Gal. in Timæū.

6 Sudor & uapor in hoc differunt quod sudor humida est ex humorib. exiccata substantia: uapor uerò fumus ex humore ipso resoluto. Gal. in lib. de resolutione humorum.

7 Cibus concoctus dicitur, ubi is
secun-

secundum qualitatem mutatus & particulis, quæ nutriunt assimilatus est. quæ actio etiam nutritio appellatur. Gal. de Euchym & cacoch. & de consuetudine.

8 Bilem flauam medici solent simpliciter communi nomine bilem appellare, nulla coloris adiecta distinctione, cum interim melancholiam semper atræ nomine dicant. ultimo de uict. ratione, in morbo acutis.

9 Membra & humores corruptos non continuo putres appellamus, sed ubi cum odore foetido corruptio irrepsit, tunc putredinem inesse dicimus. 5. de simpl.

10 Si instrumentorum quibus respiratio fit, resoluti sint nerui, apnoea, hoc est, abolita spiratio, si uero uocales nerui, aphonia, id est, uocis priuatio uocatur, at linguæ paralyxis et si sermonem uoluntatis opus omnino tollat, nullum tamen proprium nomen obtinuit. 2. de symptomatum causis.

11 Ex genere arthritidis est, tum
Ee 4 ischias,

ischias, tum podagra. Quod enim in omnibus articulis est arthritis, id in uno iuxta coxēdicem quidem ischia da, iuxta pedem uerò podagram appellant Incipit igitur plerunq; podagræ generatio, ex uno articulo temporeq; in omnes progreditur. Communem habent hi tres affectus redūdantiam humoris, aliquando quidē sanguinem, ut plurimum uerò pituitosi, qui propriē crudus appellatur. Differentia autem ex colore cognoscitur. 10. de comp. med. secundum loca.

12 Morbi epidemiæ populares dicuntur uulgò, qui quibusdam gentibus, ut plurimum accidunt ex aëre, uel aquis, uel alijs nutrimentis quibus utuntur ipsi. Pestilentialia qui certis annis, ex iisdem corruptis. in 1. de uentis & aquis.

13 Phtisis seu tabes appellatur, quælibet humoris naturalis exiccatio, siue ea ex inflammatione partiū solidarum, siue ex intemperie sit, sed propriē, quæ ex pulmonis ulcere nascitur

scitur ea tabes est. 2. in 1. Epid.

14 Matrix aliquando nervus dicitur, & uicissim nervus, aliquando uirile, uel muliebre pudendum. Conueniunt enim hæ partes inter se, in tensione, dilatatione, contractione, albedine, & sanguinis carētia. Sunt, quæ pudenda composita ex nervo, ligamento, & tendone. 1. in 6. Epid.

15 Tabes simplex dicitur cum uniuersi corporis partes siccantur, altera uero contrarietas, quæ inter calidū & frigidum existit, intra suos terminos manet. Qualis solet inedijs accidere tam eorum, qui sponte inediā tollerant, quam qui fame conficiuntur. Compositus uero cum præter siccitatem, caloris uel frigoris accedit immoderatio: frigoris, ut in senibus uel ijs, qui affectum senectuti simili detinentur. Caloris, in febribus hecticis. Quocirca si tabes affectio est uniuersi corporis necesse est, ut in tabidis, ipsius cordis corpus quod est principium animantis, arescat. Galen. de tabe.

Ee 5 Moy

Moyses.

Fortasse (credo) attendēti, quę Galenus de rigore, tremore, horrore, & conuulsione præcepit, uidebuntur. Rigor & tremor uniuoca. At medici tamen uocant tremorem eū, qui ex uirtutis defectu fit, motum, qualis cernitur in ijs, qui onera grauiora ferunt, & sub pondere gemunt, aut ijs qui sublimius gradientes metuunt, & ijs qui ex longo morbo uacillant. Rigorem uerò dicunt, eum qui ex graui affectu neruo inhærente, & alijs quibusdam repugnantibus qualitatibus conficitur.

16 Functionis à uoluntatis imperio prodeuntis noxa est, neruorum, resolutio, conuulsio, tremor, stupor. Si paralytis totū corpus inuadat symptoma ipsum apoplexia uocatur.

Conuulsio pro uarietate particularū uarias appellationes habet. Mandibularum musculi, dicunt stridor dentium, oculorum peruersio, & strabismus eius, penis rigidi, gonorrhæa. Vniuersi corporis resolutio, epilepsia.

At

At stupor, imperfecta neruorum resolutio, mistaꝑ ex coëuntibus in unum, pugnantibus morbo simul & facultate.

Tremor, pugnancia facultatis cum grauitate, actio enim est uoluntaria, sed cū facultatis imbecillitate facta.

Palpitatio est dilatatio præter naturam omni parti, quæ naturaliter dilatari nata est molli scilicet, ueluti musculo, uisceribus, corde & arterijs.

Rigor autem non uniuersi corporis, ut palpitatio & conuulsio, sed expultricis facultatis tantum. Motus igitur est compositus ex causa præter naturam & facultatē animantis, sed in quo uirtus, quā in tremore est uergetior. Gal. 2. de sympt. causis.

16 Hæmodia & torpor symptomata sunt factus. Hæmodia quidem dentium stupor, qui ob acidos acerbosq; cibos plurimum oritur.

Torpor autem in toto corpore contingere solet ex sentiēdi mouendiq; difficultate affectus cōpositus. Torpescunt uerò nerui obstructi, uel immodica

modica crassitudine nutriti, uel uio-
lento frigore per frigerati, uel laqueo
uel manibus constricti, aut extrinse-
cus à uicinae partis phlegmone, uel
scirrho compressi, aut laxatis fractis-
quē ossibus arctiores facti. 1. de sym-
ptom. causis.

18 Asperæ arteriæ pharmaca mos
est appellare arteriaca. Vocant enim
asperam arteriam uiam illā, quæ du-
cit à larynge ad pulmones ex cartila-
ginosis corpusculis bronchis dictis
conflatam, unde etiā tota arteria in-
terdum dicitur bronchos. Organa i-
gitur uocis cum dico, intellige, arte-
riam & laryngē, & pharyngem, seu
epiglottida. 7. de comp. med. secun-
dum loca.

19 Inæquales pulsus sicuti & cæ-
tera ferē omnia pristinam naturā mu-
tantia, quatenus æquam semper mu-
tationem recipiunt æqualiter dicun-
tur mutari. Quæ uerò minimē parē,
ea inæqualiter inæqualia uocantur.
Ut Myuri pulsus, qui semper magis
ac magis imminuuntur. Primò enim
pul-

pulsus secundus est minor. Tertius secundo, quartus tertio & sic deinceps. *μύουγοι* quasi imminuti sumpto nomine à turbinatis figuris appellantur. 1. de differ. pulsum.

20 Ex myuris pulsibus, qui perpetuò minuuntur nec minui desistunt, donec ad quietem omnino recidunt motuq; deficiuntur, eos deficientes *μυούρους* uocant, atq; ex ijs rursus, qui in quam semel paruitatem destiterūt hanc constantissimè seruant *μύουγος* stabiles dicuntur, qui uerò rursus augetur *μύουγοι* reciproci. Ibid.

21 Febris continens & continua homonyma sunt, utraq; enim synoches dicitur, quo nomine & ardens continetur. 2. de Crisib.

Moyse.

Galenus ibidem compositarum febriū duas facit species, inter quas, quæ ex tertiana & quotidiana complicantur, diuersis horis inuadunt, q̄ uerò in totū confunduntur certo eodemq; tempore, de quibus etiam. 2. de febribus.

22 In

22 Incoctas uocant pleuritides, quę cum febris acuta dolore laterum, ueluti intensorum, uel punctorū spiratione frequenti, pulsu paruo, tussi magna, aliquādo cum coloratis sputis, aliquando etiam sine his celerissime hominem rapiunt, uel lōgo temporis spatio finiuntur. Sed sunt alij etiam laterum dolores cum febris, & cum spiratione exigua, sed sine sputo, ut in eare nihil à pleuritide sine sputo differant. Verūm discerni possunt, quod in his nulla omnino tussis molestet illis pleuriticis sicca adsit tussis: Item hi neq; duritiem pulsus, neque tensionem, neq; perinde acutam febrim, nec adeo difficilem spirationem habent ut illi. Sunt etiam nonnulli, qui extrinsecus presso inflammato loco, dolere sese fatentur, atq; n̄ per sputum purgātur minimē, quę principio nil succi uitiosi ad thoracis spatium peruenit. At inflammatio ne concocta, nisi prius prius discussa fuerit ad cutim usq; attollitur inciditurq; . 5. de locis affect.

23 Ciuitates orientales dicuntur, quæ uersûs orientem uergunt, quas Sol oriens illustrat & uenius orientalis perflat. Occidentales contra ad quas Sol non fertur usq; ad uesperum. in 2. Hipp. de uentis.

24 Tenuēs exiguæq; pustulæ per summam cutim excitatæ, & serpentes $\kappa\epsilon\gamma\chi\iota\alpha\varsigma \epsilon\pi\pi\iota\tau\epsilon\iota$ dicuntur, id miliares tumores exedentes. Si uerò crassiores sint & totâ cutim subiectamq; carnem, usq; ulcerantes serpunt $\epsilon\pi\pi\iota\tau\epsilon\iota \epsilon\delta\iota\omicron\mu\epsilon\iota\sigma\iota$, propriè exedentes herpetes appellantur. in 6. Aphorism. & lib. de tumoribus, cū fluxio biliosa. Hæc quidem magis acris, hæc uerò minus sit sciendum est ab acriori herpetem exedentem ab altera milia rem fieri.

25 Fistula sinus est angustus & longus fistulæ in modum ad quē humores effluunt, ob eamq; causam astringitur, & rursus diducitur. Gal. de tumorib.

26 Carbunculus est tumor ex sanguine tanquam feruenti, inflammationi

tionipropinquo, & cutim exurente excitatus quem bullæ præcedunt, & cum crusta fit, quemadmodū in ambustis, acutamq; febrim infert, & uitam trahit in discrimen. Ibid. & 1. de febris. Ex sanguine calidissimo, atram bilem referente nasci dicit.

27 Cutis quæ secundum naturam se habet laxa est, quapropter eius sicut & carnis media quædam spatia inania conspiciuntur: quæ cum implentur sanguine ex uasis quidē paruum tunicas resudante, & in quacumq; carnis particula admodum roris permisto, fit tumor qui phlegmone appellatur. cum uero ob incubentem cutim densam duramq;, pus ibi detinetur, aut humor alius principio oritur, qui tēporis processu excoriet, atq; à contentis continētia dispescat, abscessus dicitur. Porro dum pus corpora excoriat, continentiaq; à subiectis diducit, ac deinceps eo utcumq; uacuato, quæ dissident inter se pristinam constitutionem nequeant recuperare, is affectus uocat sinus, Gal. de tumorib.

Ad-

Addit Moyses.

28 Abscessus nomen secundum Hippocratem, ac de omnibus tumoribus dicitur, & in medicina sic ubique usurpatur, ut Galen. etiam i. in 6. Epid. ait.

29 Scirrhus exquisitus tumor est, præter naturam insensatus durusque ita, ut curationem non recipiat, non exquisitus, qui ex humore viscido crassoque & tenacissime partibus induratis infixus ortus est, non omnino insensibilis, sed uix curationem admittens. 2. ad Glau.

30 Abscessus iam in medio carnis consistens ita, ut membrum efficiat mortuum, nec punctiōem, nec sectionē, nec unctionem sentiens, Gangræna appellatur. denigratus, quod ex sanguine supra modum crasso atque ipsi parti affecte impacto oriat. Curatur autē copiosa sanguinis impacti euacuatione, ut reliquo exhibeatur transpiratio: & cute uniuersa multis sectionib. profundis, unā cū subiecta substantia multisque scari-

Ff

fica

ficationibus incisa. Ibidem.

31 Interdum miscetur erysipelas œdemati, diciturq; erysipelas œdematosam, quemadmodum ubi ex nimia refrigeratione durum ægreq; solubile est redditum erysipelas scirrhum uocabitur. 4. Methodi.

32 Vocatur impresentiarum scirrhus omnis tumor durus & indolēs, non tamen omnino absq; sensu: talis enim non est sanabilis. Ibid.

33 Ulcera præter modum maligna appello in quibus aut pars affecta, tantum uitioso affectum est prædita, ut uel optimum sanguinem, qui nutritionis gratia confluit corrumpat, aut id quod influit adeo peruersum existit, ut etiam amissi pars recte se habeat ab ipso, tamen solo erodatur. 4. de comp. secundum genera.

34 Distinguenda sunt cacoëthica ulcera ab ijs, quæ difficulter ad cicatricem perueniunt, cum non omnia cacoëthica ulcera ægre cicatricem admittant, id est, non sint dysepulotica. Porro quæ ulcera ex humorum confluxu

fluxu, uel multorum, uel acrium oriuntur, ita tamen ut locus affectus influente humorem, quamuis bonum non sit corrumpere aptus, ea dysepulotica, hoc est, ægrè ad cicatricem peruenientia appello. Ibid.

35 Scirrhorum duæ species, una quidem ex lenta crassaq; pituita, altera ex facie sanguinis, quæ nigra dicitur. Vtriq; autem cõmunia sunt, maior quam pro ratione naturæ tumor, tum dolore uacans, tñ durus & quādoq; ex se gigni, quandoq; ex mutatione alius tumoris immoderatus refrigerati. Gal. de tumorib.

36 Cancrī ex atra bile facti, si citra feruorem fuerint, cancrī sine ulcere, sin acriorem eam esse contingit cancrī exulcerati dicuntur. Ibid.

37 Omnes huiusmodi affectus & præsertim cancer ab humore melancholico oriuntur. Cæterum ut à calidiori carbunculus, ita ab eo qui minus est, calidus oriri cancer consueuit. Cū autem natura uasorū, quæ ad sedem sunt reſerans uenam, huius-

Ff 2 modi

modi humorem excernit commistū sanguini: Hæmorrhoids dicitur. Si uero ad crurium uenas transmittit, uarices: Si denique ad cutē ipsam, lepra. Gal. de atra bile.

38 Si fluxio biliosa in aliquē partem decumbat, eaq̃ ab exquisita bile procedat, quæ sit acus & cum erosionē fiat, affectu semper proximam cutem inuadente, herpes exedens dicitur. de tumoribus.

39 Scabies & lepra melancholici affectus ad solā cutem spectant, quæ admodum si in solis uenis & carne fixant nomen obtinent cancri. Ibid.

40 In hydropicis copia quidē materiæ eadem in regione aggregatur, aquosæ sanē in ascite flatuosa in tympanite, pituitosa in affectu, anasarca, & eo quem leucophlegmatia appellant. Ibid. & in 4. Aphor.

Hydrops tympanites est, quē Hippocrates hydropisim siccam nuncupat.

41 Oedema, tumor est ex tenui pituita, qui lator quidem, & longo maior est

ior est aneurismate, nisi quādo grun-
nus adnatus coalitus ex aneurisma-
te sphacelum, id est, syderationem ef-
ficiat. Sic enim uniuersam solidorū,
corporum corruptionem, ita ut ossi-
bus quoq; insit, appello. Gangrēna
autem & ipsa solidorum corporum
mortificatio est: uerū ossa non cor-
ripit, maximasq; sequitur inflamma-
tiones. Ibid.

42 Differt inflatio ab œdemate, q̃
ille tumor sit latus digitisq; cedens,
utpote à pituita ortus. Inflatio autem
maximè renitatur tangenti, sonitūq;
uelut tympanum reddat, utpote à fla-
tuofo spiritu in concauitatibus colle-
cta orta. ultimo Methodi.

43 Propter humorum inopiam à
quibus nutriri solent capilli, caluities
accidit, propter uitium autem alope-
cia & ophiasis. Etenim læsa capitis
pars serpenti similis in ophiasis appa-
ret. Alopecias autem sic appellari fe-
runt quod frequenter uulpibus acci-
dant. i. de comp. secundū loca.

44 Achores, tumores sunt præter
Ff 3. natu-

naturam, cum affecta particula foraminibus. quibusdam tenuibus erodit, tenuique humore & modice uiscido redundantibus. His proximè accedit cutis alia affectio, quæ *λεριόμ* Græcis, latinis fauus dicitur, foraminibus in eo maioribus, in quibus humor hyemittio melli similis continetur. Ibid.

45 Achor ulcus est in capitis cute quod facile conijcias pituitæ salsæ, & nitrosæ esse sobolem, ut à quo sanies quædam, nec aquosa simpliciter, nec ita ut mel crassa defluit cuiusmodi est in ceria seu fauo. de tumoribus.

46 Glandulosarum partium inflammatio ubi ad scirrhum peruenit, is affectus strumæ & choirades appellatur. Ibid.

47 Vbi indurantur testes, *σαρκόκηλοι* & Ramex carnosus dicitur, cum autem in horum tunicis humor aquosus colligitur: hydrocele. Epiplocele autem & euterocele omenti, & intestini descensus est in easdem tunicas. *Κυρσοκήλη*, varicosus ramex recens nomen in eadem parte dicitur quam
quam

quam ueteres omnes turgentes uenas dixerunt uarices. Ibid.

48 Imaginatricis facultatis corruptio & uniuersa exolutio cataleptis dicitur: functionis eius mediocris offensio & imbecillitas, delirium ac lethargia. Sic ratiocinationis exolutio amentia est, defectus seu imbecillitas, fatuitas, deprauatio, delirium. Plerumque siquidem in utrisque simul consistit delirium, tum parum probe imaginando, tum parum apte ratiocinando. de sympt. differentijs.

49 Ut crassus pituitæ succus, ita melancholicus sanguis comitialem morbum solet efficere, ubi in meatibus uentriculorum cerebri retinere, siue is medius sit, siue postremum. Vbi uero in ipso cerebri corpore abundat, eam insaniam speciem, quam Græci uocant melancholiam, inducit. Quæ admodum alter atræ bilis succus, qui præassata flaua bile nascitur, ferina gignit deliramenta modo cum febre, modo absque febre, in cerebri corpore abundat. Atque hæc ob causam Phre-

Ff 4

nitis

nitis interdum est mitior, ubi à pallida bile ortum traxit, interdum uehementior ubi flaua bilis eam peperit. Deliria autem quæ per febrium uigores fiunt, non propria cerebri affectione, sed per cōsensum fiunt. Quā obrem sic delirātes non appellamus phreniticos: quæ phreniticorum insania non quiescit mitigato febris dolore, sed ardentis febris symptoma, quod fit elatis ad cerebrū multis uaporibus calidis. 3. de locis aff.

50 Veteres apoplexiam, lunam appellarunt, quia interlunio soleat accidere. Plato uerò dæmoniam tanquam diuinæ sedis, id est, cerebri affectum. 4. in Tymæum.

51 Tertium melancholiæ genus, ut epilepsiæ reperitur quod, ortum à uentriculo suscipit, solentq; medicorum nonnulli hanc dispositionem hypochondriacum flatulentumq; morbum uocare. Cuius morbi causam calorem immoderatum uenarum mesaraicarum, obstructionemq; earundem à crasso sanguine ortā Diocles
affi-

assignat. Comituntur eum ructus acidi & flatus, & æstus, uentriculi uehementes dolores, mœstitia & metus, &c. ibid.

52 Cephalea est capitis dolor diuturnus, difficulterque solubilis, qui à parua occasione uehementes possidet accessiones, ita ut qui eo torquetur, neque strepitum, neque uocem, neque luminis splendorem, neque motum perferre possit, sed tranquillitatē obscurumque cubiculum quærit ob doloris uehementiam. ibid.

53 Si quando tota anterior cerebri pars afficiatur supremū eius uentrem, & cogitandi quoque actiones uitari necesse est. Proinde nec sentit, nec mouetur homo, spirandi tamen facultas in eo non leditur. Vocaturque hic affectus Caros siue sopor. Qui si uehementer spirationem opprimat, Apoplexia nominatur. Fit aut sapor (authore Hipp.) affectis musculis temporum atque in acutis morbis. In medio est Epilepsia conuulsionem uniuerso corpori inducens, sed in paralytim

Ff 5

lysim

lysim non desinit. Horum trium morborum frigidus crassusq̃, aut omnino uiscidus humor causa est. At in sopore anterior pars magis, in apoplexia & morbi comitiali utraq̃. In Catalepsi & uigilanti sopore posteriora cerebri magis leduntur. 4. de locis affect.

54 Cum omnes pariter nerui, tum sentiendi, tum mouendi uim amiserint, affectus apoplexia dicitur. Vbi uero alteri lateri, aut dextro, aut sinistro id accidit, resolutio nominatur eius, scilicet partis in qua consistit affectus. 3. eiusdem. Potissimum autē dicitur resolutio neruorum ubi motus deperditus est.

55 Conuulsio pro uarietate particularum uarias appellationes fortitur. Nam si mandibularum musculi conuellantur, stridor dentium, si oculorum, peruersio & strabilisimos. Si rigido penē semen effluat Gonorrhea. Si inspirationis organorum, singultus. Si uniuersi corporis epilepsia 2. de causis symptom.

56 Id

56 Id quo tangente afficimur, & quo separato quiescit affectus, causam esse ipsius affectus omnibus in confesso est. 1. de locis affect.

57 Post summi uigoris tēpus sepe quidem nulla fit crisis, sed paulatim soluitur morbus, longo tempore cōcoctionem recipiens: huiusmodi solutionem absolutē crīsim non nominō. Si qua uerō confertim fiat permutatio, & multō magis adhuc agitatio nem, quæ illam præcedit ita appellare consueui. 1. de Crītib.

58 Quoniam quo die morbi naturam quis possit cognoscere ostendimus sciendum est, diem per totū sermonem nostrum in ea significatione accipi, ut non solum lucem, sed etiam noctem complectatur. Sicuti & mensem ex triginta diebus constare dicimus, & annum trecentis sexaginta quinq. 2. de Crītib.

59 Ut igitur recta propriaq. nōminum appellatione utar, afficitur quidem caput, quando condolescit uentriculo. Aegrotat uerō, quando proprio

prio morbo laborat. Similiter uentri-
culū affici dicimus, ubi à uitiolis mo-
lestatur humoribus, ægrotare uerò
aut per intemperiem propriam, aut
ulcus, aut inflammationem, aut ab-
scessum. 1. de locis. aff.

60 Parenthyma est trāsfusio, quæ
impresentiārum molem carnis pin-
guitudinisq; significat. Gal. de ple-
nitud.

61 Quæ ulcera omnibus ritè de-
centerq; factis non sanantur, ea me-
dici cacoëthe, hoc est, maligna contu-
macia rebellisq; nuncupant. 5. Me-
thodi.

62 Diariæ febres, nisi rectè tractē-
tur in putridas & hecticas transeunt.
Putridas enim appello, quæ ex hu-
morū putredine: hecticas uerò quæ
ex immodica solidarum partium na-
scuntur calfactione. 9. Meth.

63 Obstructio ex crassorum glu-
tinosorumq; redundantia orta est, q̃
morbus instrumētalis existit, eorum
quæ obstructa sunt corporum. 11. Me-
thodi.

64 Con-

64 Contemnere quidem nomina oportet, sed non scientiam rerum cuius rei non ignarus Hipp. ait: Medicina appositio est & detractio deficientium appositio, redundantium detractio. Ibid.

65 Exercitationis epileptici scopi sunt, ut priusquam fatigetur quiescat & corpus calefiat. Quod si ultra hos terminos producat nonnihil iam attingit solida corpora, atque habitudinem ipsam colliquat. In articulis autem potissimum atque in musculis colliquationes fiunt, unde uirium infirmitas sequitur: deinde ulcerosus sensus quando aeger conatur mouere aliquam particulam. atque id est, quod lassitudo appellatur. Galen. in consil. pueri Epileptici.

66 Si exquisita utamur nominum appellatione, quod mediū in singulis est, id *ὑπερμετρώ* siue temperatum dicemus. Quod autem ab huius recedit modo si ad calidius, tum plus, tum minus calidum, sin ad frigidius, plus uel minus frigidum, & sic de cæte.

cæteris. 3. de simplic.

67 Emplastica medici appellantur, quæ citra morsum deſciant, & caloris ac frigoris mediam constitutionem habent, qualem præbet sensum aqua omnis qualitatis uacua terreſtre, aut terræ ad frigidius paulum inclinantem, cuiusmodi est cera elota, ex melle aquasiori, & minimè mordaci. 4. de simpl.

68 Quibus arctiora sunt crura, quæ ordo naturæ postulet magna ex parte fiunt uatij, Vari autem quibus magis curuata. Voco enim uatium, cui in exteriorē partē crus uertitur: uarum cui ē conuerſo. Gal. de cauſ. morb.

Sicciores particulæ dicuntur, quæ minus carnosæ sunt, cuius generis circa digitos, articulosque habentur: præterea quæ circa aures, naſum, oculos, dentes, atque ut ſemel dicam ubi crebræ cartilagineſ, & membranulæ, & ligamenta, & oſſa, & nerui adſunt. Adeps uerò & caro uel omninò nulla eſt, uel perexigua. 4. Meth.

69 In

69 Inherens corneæ membrana si phlegmone sit obsessa, etiam ex accidenti potest impedire uisionem, quæ affectio dicitur ophthalmia. At chymosis & unguis non ex accidenti, sed primaria ratione pupillam ipsam obscurant, quemadmodum genarum ingentes tumores præter naturam. 4. morb. & sympt.

70 Proptosis est uncix membranae procidentia ab erosionem rptione uel corneæ contingens. Hypopius est quando pus sit cornea nunc altius, nunc in fumo colligitur. Et, Trachoma interna palpebrarum scabrities, & asperitas. Et, Psorophthalmia, pruriginosa, palpebrarum scabies cum robore, & pilorum defluuium. Rhas caruncula circa maiorem oculi angulum imminutio. 4. de comp. per partes.

71 Aegilops est inter nasi os, & maiorem oculi angulum, paruū quoddam exiguo abscessui per simile tuberculum cui nisi naturæ occurratur, infistulam abit ad os usque. 5. eiusd.

72 Surc

72 Surdaſtri ſunt, qui exiguas qui-
dem uoces omnino nō audiunt. Ma-
gnas autē uix percipiunt, quod ſym-
ptoma paulatim progreſſu tempo-
ris augeſcens perfectam ſurditatem
inducit. 3. eiusdem.

73 Ex genere tumorū præter na-
turam eſt Polypus in naribus, Oze-
næ uerō ex genere ulcerum. Ibid.

74 Vicerationes oris ſuperficie
obortas aphtas appellant. Habentes
quippiam igneę caliditatis. Fiunt au-
tem plurimum pueris lactentibus,
quum aut uicioſum fuerit lac nutri-
cis, aut non probē ipſum concoxerit
infans idq; ſine putredine, cum uerō
putredo accedit depaſcentes uocant.
6. eiusdem.

75 Pars illa, quæ cum faucibus a-
ſperam arteriam cōnectit, & quæ ſur-
ſum nobis tranſglutientibus fertur,
cuiq; uocem aſpera arteria parat La-
ryn timer uocatur. Primum & principalif-
ſimum uocis inſtrumentum, uas au-
tem quod à faucibus in pulmonem
deſcēdit aſpera arteria, & Bronchis
dici-

dicitur. 5. de usu partium.

67 Cum gutturis musculi inflammantur is affectus angina dicitur, cuius genera sunt quinque. Primum ubi inflammantur fauces, hoc est, internus oris locus, ubi & gulæ, & gutturis partes extremæ coeunt. Secundum ubi nec fauces, nec reliquæ oris partes, nec etiam externarum partium ulla inflammata uidetur. Laborans tamen suffocationis periculum, in gutture sentit. Tertium ubi extrinsecus circa fauces inflammatio apparet. Quartum ubi gutturis partes tam externæ quam internæ inflammatae uidentur. Quintum cum ad anteriores partes colli luxantur uertere. 3. de locis affectis.

77 Qui citra febrem dense respirant ob id symptoma dicuntur asthmatici, id est, anhelosi, & orthopnoici, quod thoracem recto spirare cogatur metu suffocationis. Cuius causa est coarctata interna capacitas ipsis præter naturam, purulentis ob collectum inter thoracem & pulmones, hu-

Gg morem.

morē Peripneumonicum ob pulmō
nis inflammationē. Angustia autem
spiritus fit, quum humorum crasso-
rum & uiscidorū multitudo pulmo-
nis bronchijs fuerit impacta, aut tu-
mor abscessui similis in ipsis constite-
rit. 7. de com. per partes.

78 Concoctio tota corrupta, & in
alienam qualitatem conuersa dicitur
cruditas. Cum uerō remittitur appe-
titrix functio, abolita appetentia. Et
ubi excremēta ipsa expellere partes
similares nequent, aut languidē, aut
perperam, hoc est, citius uel tardius,
quā animali expediat. Intestinatorū
uitium dicitur. 3. morb. & accido.

79 Deprauata fit appetentia si ue-
hementiā modū excedat, uocaturq̃
à nonnullis canina, ubi uel ob acidū
humoris uitium uentriculus mordi-
cus infestatur, uel dum totū corpus
exhaustum assidua nutritione indi-
get. 4. eiusdem.

80 Os uentriculi nonnulli hodie
communiter stomachum nominant,
quam partem olim frequentius car-
dian,

lian, hoc est, cor appellabant. Vnde uox caldialgia est deducta, quæ minime quidem cordis, sed oris uentriculi dolorem & mordicationem significat. Fiunt quippe in ipso tū morsus, tum inexplēbiles fames, tū nauſeosæ dispositiones, in quibus omnibus communiū attingentium pharmacorum usus iuuentus est, ad mista autem plerisque ipsorum sunt exalſcientia simul, & resiccantia. 8. de cōp. per partes.

81 Affectio hepatica peculiariter appellata, ueluti cœliaca, stomachicæq; citra tumoris præter naturā circa ipsas partes ortum contingit. Si quidem quum citra manifestum aliud quod in uiscere malum, in actionibus proprijs languescit hepar, tunc ægrū uocant hepaticum. Ibid.

82 Lienosi sunt seu splenetici quibus induratus est lien, sanguine nimirum in uenis ipsius obturato, & ob crassitudinem, nec excerni, nec discuti ualente. 9. eiusdem.

80 Verè dysenterici sunt, quod nul

Gg 2 la alia

la alia infestat affectio præter ulcus
intestinorum, aut nudum, aut cū pu-
tredine, quod *νομήν* erosionē uocant.
Ibid.

84 Lienteria est frequens cibi non
dum concocti lapsus. Diarrhoia ue-
rò copiosius liquidorum excremen-
torum siue exulceratione, & inflam-
matione fluor. 4. in 1. Epid.

85 Dysenteria intestinorum ul-
cus est, cuius initio bilis mordax ex-
cernitur, quam deinde interaneorū
abrasiones sequuntur. Postea uerò
paulum cruoris deijci simul uidetur,
quando uidelicet ipse affectus iam
esse dysenteria cēsetur. 6. de locis af-
fectis.

86 Dolor ille acerbissimus quem
ileon, uoluulum & chordapson uo-
cant, sublimiores intestinorum par-
tes infestat, adeoque ob mordendi
uim impellit ad uomitū, ut nonnulli
stercus per os reddentes, miserrima
tandem morte moriantur. atq; uix a-
liquis unquam euadere potuit. Vbi
autem in huiusmodi affectib. mate-
ria

riæ minimè mordaces existunt. Liē-
terias cœliacas nominant. Intestino-
rum imbecillitate idem quod illi pa-
trentes, quæ retinere contenta ne exi-
guo quidem tempore possunt. Ibid.

87 Vlcera quæ in recto intestino
oriuntur Tinesmos uocant, quæ ue-
hementi quidem tensione, & prom-
pta deijciendi cupiditate infestant,
paucis admodum sequentibus ex-
crementis, quæ quidem ab initio pi-
tuitosa & pingua, progressu uerò tē-
pus etiam ramenti specie deijciunt.
Ibidem.

88 Profluuium urinæ quidā dia-
betem, alij matellæ hydropen, alij di-
psacon uocant, quod ex morbo affe-
cti inexplebili siti uexentur. Quare
& exuberanter bibunt, & totum red-
dunt minimè à qualitate mutatū. Est
autem hic renum uesicęq; affectus, si-
milis uentriculi & intestinorum læ-
nitati, id est, Lienterie. Ibid.

89 Os matricis & collum matri-
cis, idem significat: Dicitur enim ca-
put colli illius os, quemadmodum id

Gg 3 quod

quod propriè os est, dicitur collum,
in 5. Aphorism.

90 Mola est caro quædam infor-
mis, in utero ex tumoribus toto ge-
nere præter naturam existens.

91 Medicamenta Polychrsta di-
cuntur, quæ ad multos usus sunt uti-
lia, ex cōtrarijsq; pharmacis constāt,
non tantū iuxta primas qualitates,
calid. frigid. humid. & siccit. sed etiā
iuxta secundas ex his compositas. 5.
de comp. med. per genera.

92 Medicamenta quæ cutis mea-
tus referūt, ea rarefacientia dicimus,
natura quidem modicè calida mini-
meq; siccantia, & tenuium partium
ut chamemelum, althea. Quæ uerò
uasorum oscula, aperientia, natura,
crassa, acria & mordacia, ut sunt al-
lia, cepæ, fel, &c. libr. 5. de simpl. me-
dic.

93 Quod emplastico contrarium
est, dici queat repurgans & infarctu
liberans: estq; nec uiscidum, nec mor-
dacitatis expers, sed subtile & nitro-
sum, nam in ratione tantum maioris
& mi-

& minoris differunt, tum emplastica ab ijs, quæ sordes nutriunt, tū repurgantia ab extergentibus. Quæ enim poros obstructos referant, subtiliora sunt extergentibus, & emplasticis contraria. 5. de simpl.

94 Emplastica sunt, quæ terrena uiscidaq; substantia minimeq; mordaci prædita, meatibus corporis illi-
ta tenaciter herent. Ibid.

95 Quæ uerè putrefacientia dicuntur, calida simul & humida sunt, colliquareq; possunt, potissimum carnē tenellam absq; dolore auripigmentum (quod arsenicum uocant) chrysocol-
la, dryopteris, pityocampe aconitum & Sandaracha. Ibid.

96 Nuces regię dictæ, sunt quæ uulgò habentur. Minores uerò & tenuiores sunt, quæ alio nomine Ponticæ, uel auellanæ dicuntur. 2. de alimentis.

97 Panicum uocarunt ueteres melinen, cuius generis est milium. part. 6. de Euchym.

98 Pinguedo humida quædā res
Gg 4 est,

est, oleo longa uetustate incrassato
assimilis. Adeps uerò pinguedine
multò est siccior, ideoq; fusus ac li-
quefactus concrescit facile, 3. de ali-
mentis.

99 Lac cui butyrum est sublatum,
ubi acescit dicitur oxygala. Ibid.

100 Oua diu cocta, dura appellā-
tur, quæ uerò mediocriter tremula
seu mollia, quæ minimum sorbilia,
Ibid. & part. de euchym.

101 Melicratum est mel cum aqua
coctum, alio nomine malsa dictum.
Ibidem.

102 Veteres corruptum dicunt,
quod in aliam substantiam & speciē
mutatum est, ut unum in acetum,
& trabes in cineres, &c,
2. in Timæum.

DE

DE QVIBVSDAM NATVRA
miraculosis rebus apud
medicos lectis,

SECTIO XXIII.

1.



Oannitius quidam (inquit Moyses) Hippocratis librum de doloribus mulierum transtulit, exposuit Galenus. Ibi miranda quædam leguntur ex quibus hoc unū est quod credo ab alio quodam postea adiectum fuisse. Quod eclipsi Solis magna in Sicilia facta, mulieres eodem anno monstra duorum capitum pepererint, & mēstrua per os uomuerint.

2 Semen in utero augetur non minus quā in sinu terræ, & quicquid augetur nutritur. part. ultima de significationibus. med.

3 Galenus ægroti cuiusdā cui nō acciderat uti dixerat crisis, cum causam indagasset, & domum frigidiorē deprehendisset, statim ea excalfacta

Gg 5 crisis

crisis per sudorem accidit, part. 6. de
examinatione med.

4 Galenus puerū Marylli cuiusdē
mimographi pectore ad sternon in
palestra percussū, & negligenter a
primo medico usq; ad quartum men-
sem curantū, cum iam ille aperuisset
thoracem, ut pus natum in parte le-
sa tolleretur, nec successisset, aduocatis
omnibus medicis in quib. erat Gal.
ut huic affectui prospicerent, cumq;
ceteri non auderent aggredi ad exci-
dendū ne (ut aiebant) fieret στήθος
sis perforatio Thoracis. Galenus nu-
dato loco, uidens nil aliud ex sterno
affectum esse, quā quod primum
apparebat os cordis, eo loco in quo
nascitur Pericardij, uelut apex: nudo
corde aperte uiso, quæ iam putrefa-
cta erat pericardij membrana qua te-
gitur, audacter coram omnibus exci-
dit, & puerum paulō pōst sanauit. 7.
Anatom.

5 In Ionia uidimus quendam ado-
lescentem uulnere, in alterum ante-
riorum cerebri uentriculum accepto
fuisse

fuisse superstitem, qui ne minimum quidem temporis potuisset uiuere, si uulnus utrunq; uentriculum simul uiolasset. 8. de ul. part.

6 Ego aliquando monitus p quēdam insomnia, secui dextræ manus arteriam, inter indicem & pollicem sectam, permisiq; ut inde flueret sanguis, donec sponte sisteretur subito- quē mihi extinctus est diuturnū dolor, qui in illa parte erat, qua iecur septo transuerso committitur. Et minister Dei Pergami à cruciatu lateris similiter liberatus est, arteria in summa manu monitu diuisa. part. 6. de uenę sectione.

7 Quæ unā cum lotio excernūtur pilis similia, probabilius uisum est mihi, ea in uenis, quam in renum capacitate gigni, idq; ex crassa lentaq; materia, quam calor calfecit, exicca- uitq; quemadmodum in quibusdā locis Arabiæ, an ferunt in tibijs nasci *σπινθήρες* (sic enim uocant) neruosas partes lumbricis, & colore & crassitudine similia. 6. de locis aff.

s Prae

8 Præter has, (urinarum scilicet) fi-
unt etiam aliæ purgationes, sed raro
ut cum thorax, & pulmo per alium
purgatur, quæ sub septo transuerso
sunt partes per urinas. Vidimus etiã
nos pulmonis uomicam expurgari
per urinam reiecto uidelicet pure de
pulmone per leuem arteriam. In sini-
strum cordis uentriculum, & à corde
per magnum arteriam ad renes, un-
de postea per urteras ad uesicam de-
latum est. Ibid.

9 Hepar suillum cum quidam for-
te ab urbe rediens super herba qua-
dam collocasset, ac dum uentrem ex-
onerabat, dissolutum uidisset esse, ex
ea capiens, & ad solutionem uentris
utens multos interfecit, qui cū à ma-
gistratū captus, & quæ esset, aut ubi
cresceret interrogat, nil respondit a-
liud quàm esse illius magnam copiã
ubique. part. 6, de medicamen. pur-
gantib.

10 Abscessus incisi omnimodam
speciem humidorum ac solidorū cor-
porum intus habere apparent, uelu-
tilu-

tiluti, lapillorum unguium. Pultis in atheromatis, mellis in meliceritidibus, senj in steatomatibus, & non raro etiam animantium omnibus ferre, quæ ex putredine ortum habent simillimarum. part. 6. de tumorib.

11 Accidit nonnunquam ut ex cerebro ad pulmonem humores quidam superflui delabantur, & à pulmone ad testiculos ob uinculum naturæ, quod utrasq; partes spiritus & generationis complectitur. in 1. Epid.

12 Sanguis ex uenis ad cutem pfluens, colorem facit melongianum. 4. in 2. Epid.

Addit Moyses.

Hæc uerba (inquit Rodoan) ostendunt, Gal. hunc colorem cognouisse cuius tamē nusquam alibi meminit. Ego uerò credo Gal. non uidisse, sed nigrum & rubeū scripsisse, quod noster barbarus interpretes uertit melongianum.

13 Venæ sectio tremore correptis, hydropicis & huiusmodi nonnunq; præcipue confert, ubi scilicet ex obstructione

structione uenarum ani, aut matricis sanguis suppressus, ultra consuetudinem autem calorem naturalem plenitudine sua suffocare potest. Ibid.

14 Galenus mulierem ab octo iam mensibus menstrui suppressione patientem & extenuatam, sanguinis missione (uidebat enim uenas eius nigras & planas) primo die ad libram unam, & iterum secundo tantundem & tertio ad uncias octo repetita sanitati restituit. 3. in 6. Epid.

15 Pubescētes & iam sperma mittentes si testiculum dextrum sinistro maiorem habeant, masculos gignūt, sin dextro sinistrum, foeminas. Idēq; in mammillas adolescentium puellarum iudicare licet. 4. in 6. Epid.

16 Pruritas, tussis, sternutatio, singultus, & huiusmodi leues affectiones quiescunt, si spiritus cohibeatur. in 1. de humorib.

17 Qui primū ophtalmiam cōspicit, cum ante nūquam uiderit, humidi ei fiunt oculi, & si intuendo persistat, eandem patitur. Sic qui oscitan

tem

tem aut mingentem, aut cacantem,
aut membra extendentem uidēt, eo-
dem desiderio plerunq; afficiuntur.
part. 6. de motu necessario.

18 Sedentes quidam dormiuerūt
& deambulantes nonnulli, ob mus-
culos membra sua, figura quadam
inter extremā & mediam conseruā-
tes. Id quod mihi olim contigit, qui
fermē stadium integrum dormiendo
peregī. 2. de morb. muscul.

19 Tredecim diebus mente quen-
dam carētem uidi Romæ, qui Athe-
nis iacere se existimabat: puerumq;
sæpe uocans, iubebat adferre, quæ ad
exercitationem erant opus. Paulūq;
intermittens, statim heus (inquebat)
ad Ptolemæi balneum, uolo enim in
eo aut lauari, surgens deinde & in-
duens se exire uolebat, sed retinen-
tibus, qui ei aderant & febris adhuc
laborare dicentibus, humanissime
respondebat, spire se quidem quod
reliquum adhuc febris sit aliquid,
sed minimum illud esse, & ex balneo
non posse nocere, (tum ad puerum
aliquan-

aliquando conuersus, an nescis inqt) nos heri contendisse Megaris Athenas? Hoc autem agens & dicens. 13. die hemorrhagia ex naribus copiose, & deinde sudore facto conualuit, neq; eorū, quę ante egerat ullius meminit. Ibid.

20 Quod totum opus respirationis uoluntarię, & sponte ab ipsa anima non a nobis fiat, declarauit barbarus ille seruus, qui ex ira & indignatione mortem oppetijt in terram se coniiciens & respirationem cohibens. Ibid.

21 Mulier quędam uterū gerens, menstruis fluentibus, primò sanguineis, tum saniosis, abortū passa est. Postridie & cæteris diebus secunda, iam putrefacta purgabatur, & cū totam eiectam crederent obstetrices & reliq; medici, pulsum tetigi, quo etiam superesse aliquid superflui cognoui: id uerò indicaui ut cauerent, quod cum ad decimum sextum diem obseruassent, alterum abortum foetus putrefacti fecit mulier. part. 6. de

6. de examinatione meden.

22 Amicissimā mihi propter philosophiā, & inflammationis lectionis studium Arrhiam, stomachi conuulsione grauitē agrotantē, & ita supinam iacentē, ut ne cibum quidē capere posset, & iam ad atrophiam accederet, peritissimi medici premostrante me, eam absynthide uino propinante curarūt, statimq; stomacho ualuit, & appetitionem recepit. part.

6. de theriaca ad Pisonem.

23 Puerum tuum apostasi affectū, cū lentius tanquā bonus pater excidendum curares, & tamen urgeret inuatus humor ulceris, scis quā magna cura liberauit nos applicatum emplastrum, resecurit enim quicquid supra ulcus erat, & pus omne purgauit ad imum. Ibid.

24 Vno aspidum genere prohibent Aegypti Reginam Cleopatram, cū uellet latere custodes, citra suspicionem sibi mortem subito cōsciuisse (nā Augustus Deniceo, Antonio eam capere incolumem studebat, ut

Hh

Ror

Romanis tam insignem mulierem, in triumpho ostenderet: hæc uerò, re intellecta, duas mulieres fidissimas sibi Nairam & Carmionem, quas ad pulchritudinem corporis sui, ut orarent se habebat, hanc quidem ad ligandos & texandos capillos: illā uerò ad ungues & excrescētias resecandas. Has (inquam) uocatas iussit absconditam uuis & sicubus calatho, aut alio uase sibi uiperam afferri. quā cum in ipsis prius experta esset, brachio ad carnem commorso, ut aiunt, uenenum apposuit & statim concidit. Ibid.

25 Promptissimæ ad occidendum sunt aspides, uidi enim in Magna Alexandria eius ueneni acumen.

Cum enim ibi damnatum capite hominem subito & immanius occidere uolunt, apposito pectori serpente, & uersari aliquantulū sinentes hominem citissime conficiunt. Ibid.

26 Indicauit mihi antiqui cuiusdā liber quòd cum deformis quidam, elegātem puerum gignere uellet, for-

mo-

mosum prius puellum, in abaco effinxit, uxoriq; in complexu dixit, ut hunc aspiceret, quæ cū attentissimè intuita imaginem, similem edidit infantem. Ibid.

27 Quem hominem non persuadeat fateri, naturam quiddam supra humanum esse, ursæ generatio. Sigdem parit & ipsa similiter cæteris animantibus. Cæterum caro est ipsa, quæ editur informis, & sine articulis, sed post statim ab ipsa, quæ peperit naturali arte efformat. Lingua enim tanquam manu artifice mater ipsa, quod natum est perficit. Ibid.

28 Quidam uiperas intempestiue uenantes, postquam exuerunt pelles, & cum nondum satis sunt ualidæ cicurant plerumq; , & carnibus nutriunt, coguntq; semper mordere aliquid, quo uenenum ex ore amoueant, tum etiam mazam præbent, quò dentium asperitates obturent, & sic minimè mordaces reddunt, unde apud ignaros suæ uertutis plerumque admiratione consequunt. Ibid.

Hh 2

29 Quem

29 Quemadmodum cōstat diuū illum Hippoc. per solam alterationē aëris, discussisse olim ab Athenis pestilentem eius constitutionem, nimirum per totam urbem ex aromaticis lignis & suauissimis floribus, uarijs pyris extractis, ut aërem purum hoc modo redditum inspirarēt homines in mali subsidium: simili ratione Theriace ceu ignis existat præsumentes ipsam, pestilenti aëris statu, neutiquā a malis corripī sinit. Ibid.

30 Si animali fœminæ excindas testiculos, neq; libidine comitabitur, neq; marem admittat, sed amittet fœmineam naturam. Quo nomine scrofæ castrantur, fiuntq; sic castratis masculis similes, atq; uberius alimentū accipiunt: pinguioremq; & suauiorē carnem quā reliquæ scrofæ habent, quemadmodum & mares maribus est, inde testium ablatio in fœminis periculosior. r. de semine.

31 Semen concipit mulier sicut & uir in complexu, & in somnis. Ibidem.

32 Ges

32 Genitalis seminis tum excretionem, tum comprehensionem ingens comitatur, & cupiditas, & uoluptas. 4. de morb. & sympt.

33 Glandes quæ dicuntur castaneæ, hominibus iucundæ sunt, aliquandoq; crudę eduntur, aliàs tostæ aut elixæ: At longiores & quærcinæ suis magis quàm hominibus conueniunt, nisi si quando cogunt, ueluti in famæ part. 6. de euchym. & in 2. de alimentis.

Glandes æquè nutriunt atq; frumenta eorum eduliorum pleraq;.

34 Ego noui hominem, qui ex esu paulo liberaliori boletorum (etsi omnium frigorum sunt maximè noxi) in oris uentriculi conuulsionem & grauitatem incidit in stenochoriam, & dyspnœam, & deliquium animi ac frigidum sudorem, ut uix attenuantibus & incidentibus medicamentis, quale est oxymel per se & cum hyssopo & oryano ebullitum, potuerit seruari. 2. de aliment.

34 Notum est, quemadmodum in-

Hh 3

fans

fans priore nutrice mortua, cum altera quæ plena malo succo erat diuturno ex uictu agrestium olerum, famis tempore & uerè ineunte, repletus est ulceribus toto corpore sicuti & nutrix ipsa, & omnes qui huiusmodi uictu uisi erant, atq; id in multis alijs nutricibus, uidimus eodem tempore. 3. de alimentis.

36 Maximam adesse utilitatem intestinis, ad securitatem & iniuriæ propulsionem ex duabus suis tunicis, dysenterici affectus monstrant. Siquidē sæpè & in multis uidimus ob grauem & diuturnum morbum totam interiorem tunicam, ex putredine perisse, & tamen homines illos uiuere, alioqui non uicturos, nisi & altera superfuisset exterior, quæ intestina contineret. 4. de us. part.

37 Quibus Ceratoidis tunicæ pars illa, quæ pupillæ est obiecta, insigniter exulcerata est, aut uulnerata usque adeò, ut uulnus ad interiora pertingat, & magna ex parte obcæcatur. Vidi tamen equidem puerum, cum
iuxta

iuxta pupillam punctus fuisset stylo,
sicut aquosus humor efflueret, ac to-
ta omnino cornea corrugaretur, ui-
sum (incredibile quiddā) recuperasse
instaurato, scilicet paulatim humo-
re, q per uulnus effluxerat. 4. de caus.
& sympt.

38 Cū nuper fuisset quidem i-
ctus à scorpione, uideor mihi (inqt)
percutus esse grandine, eratq; omni-
nò frigidus, frigidoq; sudore perfu-
sus, quippe exicta parte in subiectas,
mox ex illis in alias eis continuas uis
ueneni spargitur, donec ad principē
aliquam peruenerit, quò tēpore mor-
tis periculum instat. Ad hāc rē con-
ferunt, in primis uincula partibus su-
pernis iniecta, abscissioq; partium ue-
nenatarum. Noui equidem rusticū,
qui epoto ē uiperis medicamēto: re-
scissoq; prius digito euasit: & alium,
qui sola sectione citra medicamē est
liberatus. 3. de locis aff.

39 Aegritudinem quidē hanc ra-
rò uidimus. Rusticus quidam primū
pus tenue expuere coepit, itaq; diu

Hb 4 pesti-

perstitit, aliquanto post putredinem
expuit. Post aliquot uerò menses e-
tiam sanguinem, postremò totum ei
corpus liquatum est, & ita præ thora-
cis & pulmonis infirmitate periit. 4.
de locis affect.

40 Cum semel arteriam cuiusdam
medici tetigissem, & inequalem sine
febre motum omnem eius sensissem
ex angustia & coarctatione uenarū
pulmonis, seu ex humorib. crassis glu-
tinosisq;, seu ex eiusdem ulcere ad-
huc cruda uenas illas obstruēte esse
dicebam, at (inquit) si sic sit, dyspnœa
laborem. Cui minime (inquam) ne-
cesse, siquidem tunc aspera arteria est
obstructio, non in uenis. Ibid.

41 Carnes suum similes humanis
existunt. unde quidam, cum à prauis
hospitib. essent appositæ, auidissime
eas comederunt.

42 Exemplum hoc unum (credo)
satis esse debet, ne cuilibet primū
occurrenti fidem habeamus. Ipse in
quadam urbe uidi cum uasculū mel-
lis plenum uenale proponeret qui-
dam

dam medicis duobus. Ipsiq; statim gustassent, non probato eo quid sit prius, ubi diu de precio egissent, nec conuenissent, abiit ille, hi uero deinde paulò post interierunt. Ibid.

43 Si nudaueris cor, contuderisq; ipsum atq; depresseris, nec uoce, nec spiratione, nec ulla prorsus uoluntaria actione impediri animal cernes, & si minimè perforaueris concauitatem thoracis, licebit uniuersum ac semel cor ipsum eximere. Id quod in sacrificijs quandoq; cōtingit, ubi animalia cernuntur corde iam aris imposito, non respirare tantum, aut clamare uehementer, sed etiā fugere, quo ad profusione sanguinis moriantur. 2. de pl. Hipp & Plat.

44 Cerebrum ossibus si detexeris aut quemcunq; ipsius sinum compresseris, non mutum duntaxat, ac protinus spirationis expers effeceris: sed omnino & sensu, & arbitrarijs actionibus animal priuabis. Ibid.

45 Apud Gallos Scythas & Barbaros ira dominatur rationi, & apud

Hh 5 nos

nos in pueris, & ineruditis hominibus. Si uerò adsit alicui robur & scientia, omnino ratio iræ dominabitur eiusdem.

46 Appetitoriam uim in hepate delitescere Homerus docet, cum Tityo fingit à uulturibus hepar exedi, quòd Latonam compellasset stupri. Quemadmodum nunc quoque faciunt, qui peccantes famulos puniunt: eorum sanè qui fugitiui sunt crura exurentes, scarificantes atque ferientes: eorum qui in furto deprehensi, manus: gulosorum, uentrem: garrientium & mugantium, linguam in summa denique eas particulas plectentes quibus prauas obierunt actiones. 6. eiusdem in finem.

47 Multos ego uidi, & uiros, & mulieres, quibus ualens natura corpus erat, animus autem infirmus & fractus, morbis stupidis, ueluti Apoplexia, paralyti, epilepsia, catalepsi, plerumque laborasse, mulieribus autem matricis suffocatio prius fiebat, tum paralytim patiebantur. At quibus

bus corpus imbecillum, animus uero natura cōstans, fortisq; fuerit, paucos admodū uidere licuit: unius meminī Aristonis Mysii eloquentissimi uiri, cui ex ui eloquēdi corpus tenue colliquatum est. 4. in Timēum.

48 Cicuta celeritate distributionis hominem interficit, sturnos autē tarditate ipsa nutrit. Si autem exiguum quippiam sumatur mortem nunquam inferet, id quod anus illa Atheniensis experimento docuit, quæ ab exigua cicutæ portione auspicata nullo detrimento permagnam edere potuit copiam. Adeo consuetudo uidet̃ esse ascititia natura. 3. de sim.

49 Concoctioni uentris nil æquē conferre nouimus, atq; humanum ei corpus admotum. unde nonnulli tū infantulos, tum catullos, noctu uentri & stomacho apponentes, miram inde utilitatem quietis & concoctionis sentiunt. Familiariora enim sunt & cognatiora huiusmodi naturæ humanæ, quàm quæ per excalfactorios lapides, & similia fiūt. lib. 5. de simpl.

DE

DE QVIBVSDAM LOCIS

sibi contrarijs apud Galenwm.

SECTIO XXIII.

I.



Go in his recēsendis (inquit Moyses) dabo operam, ne quid à medicina alienum adferam, sicut olim Rhasis fecit sophisticē magis quā medicē disputans. Verū ipsa maximē quæ medicinæ usū, & Galeni intelligentiā pertineant, conabor persequi: idē breuiter, apposita contraria cōtrariē sentētia, ut inde quod uerū est, uerē in dicantibus liceat colligere.

De hepatis nervo.

Primum igitur ait lib. 4. de us. part.

I Minimum quidē nervum hepatis dedit natura, utpote, neq; ad motū, neq; ad sensum futuro ex usu animalis: quare cū aut non omnino in viscum, aut non in totum inseruit.

Tum in 6. eiusdem. Nullus autem uidetur in cor distribui, quemadmodum

dum in hepar, renes, lienemque. Solum namque pericardiam propagines tenuium nervorum recipit à quibus diuisis sensibiles alias ac manifestas, in tunicam ipsius inseri, in maioribus saltem animalibus constat, hæc Galenus. In quibus si hepatis, lienis, ac renum membranis sparsum nervum, ut in corde voluit, non minus in ijs debuit distinguere.

2 In 2. de facultat. natur. Perfecta Cruditas pituitæ acidæ, uel acris intelligenda est, in secunda concoctione, hoc est, in hepate & uenis eius, non in prima, quæ in uentriculo perficitur. Et in 5. de locis affect. Frigida iecinoris intemperantia quod ad ipsum pituitæ suggeritur crudum, semiconcoctum reddit. Spectanda hæc relinquo. Hoc uno adiecto, quod hic perspicuum est crassos succos potius digerî, quàm acidos, ut qui in hepate concoquantur, acidi non omnino.

3 In 3. de caus. puls. quem librum uocat Moyses mag. partem de pulsibus. Quæ pulsui accidunt secundum

dum tēpora, mutationes ad has tres causas referunt, ad usum, facultatē, & instrumētum. ut medio ferē facultas est robustissima, calor moderatissimus & instrumenta ab omni excessu libera.

Tum in 2. de sanit. Vna mutandi pulsus causa est, naturalis caloris augmentio & diminutio pro anni tempore nutrimento balneo, somno, &c. Altera secundum quantitatem animalis spiritus alteratio pro uolūtario motu. Tertia quæ ex robore uel imbecillitate uirtutis accidit, id est, ex cordis & arteriarum temperamento. Quarta quæ ex instrumenti ipsius malo affectu æstimatur. Hic sunt plures, quā ibi, nisi fortē hæc, quæ superest animalis spiritus affectio, ad superioris diuini. usum referatur.

4 In 2. de temperamentis. Quemadmodum aer aut lapis aliquādo pari colore cum aqua esse potest, nullū eo facientē discrimen, quod lapis siccus sit, aqua humida: Sic nimirum caloris æqualitas in pueris, florētibus, quæ

que. Inuenietur etiam si in humida il-
le, hic in sicca substantia representet.
Idē, Duplici ratione cōsumit corpus,
etatis cursu assiduoq; fluore & excre-
mētōrū copia: hęc iudicio re linquo.

5 In 7. Methodi. Facillimē quidē
curatu uentriculi alterationes sunt,
quæ ex calido & frigido oriuntur.
Aegriores quę in humido siccoq; ha-
bentur. Et paulò pōst. At uentri-
culi intemperies humida, utcunque
accidat facillimē omnium curatur.
hoc item relinquo lectorum iudicio.

6 In lib. de Euchym. Lac camelo-
rum præfert asinino. In 5. de sanit. A-
sininum non solum camelino, sed re-
liquis omnibus. Item in illo, ex pede-
stribus (inquit) suilla caro, cibus pro-
batissimus est, deinde hedina, mox
uitulina. Et paulò antē ibidem dixe-
rat. Alica sicut & suilla aliquid glu-
tinosi in se habent, ob idq; in hīs iecur
obstruunt, & renes quibus hæc a na-
tura astrictos meatus sortiuntur, ac
proinde distributionem impediunt,
hæc uident quodāmodo contraria.

7 Incipientes phlegmonas reuul-
 su euacuandas, inueteratas uerò iam
 & induratas, ex ipsis si fieri potest
 particulis affectis, sin minus, ex uici-
 nis Hippocrates & Gal. multis locis
 docuerunt, atq; unum quidem illud
 est medicinæ præceptis maximum &
 usui ualde necessarium. Quo quidē
 præcepto Galen. oculorum & guttu-
 ris dolores, & inflammationes maxi-
 mus uenæ humeralis ē directā sectio-
 ne, aut certē medianæ curari iubet.
 Induratus uerò in gutture quidem,
 uenis quæ sub lingua sunt ambabus
 incisis, in oculis incisa, quæ ad mag-
 num oculi angulum decurtit uena:
 In capite si grauitate aut inueteratis
 iam ex plenitudine doloribus labo-
 rat, ea quæ est in fronte quoque a-
 deò nil non rectē dictum ab illo in
 hac parte est. lib. de uenæ sec. & in 6.
 Aphorism.

At in eadem particula. Quemad-
 modum (inquit) superiores omnes
 hepatis partes, secta in cubito uena
 auuantur, sic eo inferiores ut coxen-
 dix,

dix, uterus, uesica & incislis, quæ per poplites, & malleoles decurrunt uenis, curantur. Tum ibidem sequit̃.

Podagricos euacuabis ex cubito, comitialibus uerò morbus uertigini busq; obnoxios potius ex cruribus. hic nisi aliquid in traductione operis defecerit, contrarium sibi dicit̃.

8 In prima parte cōmementariorū, in 1. Epid. Febrē ardentem, ex accensione bilis esse ait, non in quolibet mēbro, sed uētriculo aut stomacho, aut hepatis concauo. In secunda uerò eiusdem ex ipsius humoris putredine, in uenis ijs maximē, quæ hepatis, pulmōni & uentriculo sunt proxima: hoc spectato.

9 In 3. de locis affect. Ex oleribus sola brassica melācholicum succum gignere consueuit, & in 2. de alimentis. Lens & brassica æquali inter se mensura siccant, ob idq; uisum hebeant. At in 7. de simpl. Desiccandi uim (inquit) habet non tātū admodum acrem. Præterea uulnera glutinat & phlegmōnes induratas, erysi-

li

pelata

pelata herpetas epinyctidas curat,
ex quibus & habere caliditatē quan-
dam uelle eū uidere est propterea quod
in hac re sibi contradicere. Potest ta-
men conuenire, si succos inesse hanc
caliditatem dicatur, quo sublato, re-
manet ipsa frigida substantia sola.

10 In 6. parte commentariorum in
2. Epid. Ulcera capitis ex humore ad
summum ipsum sublato nata ex uici-
nis partibus per uomitum sunt pur-
ganda.

Addit Moyses.

Hic me locus corripit plurimum, &
in eo adhuc hereo, quæ secundum de-
monstrationem est.

11 In 4. morb. & sympt. Omnis
sensus offensio, a neruo læso prius cō-
tingit. Ergo uisui suffusio & Arge-
mon ex neruo prius læso accidit: ue-
rum in primo eiusdem, non simplici-
ter affici sensum dixerat, sed aliquan-
do ratione instrumenti, aliquādo ue-
rò ratione uirtutis & functionis ipsi-
us, quod hunc locum soluendo sa-
tis est.

12 In

12 In commentario in 2. de uen-
tris & aquis. Ignitis cauterijs non
est auibus, aut pedibus, aut lumbis
utendum. Et in 6. Epid. Exulcera-
to pulmoni maturè cauterium in pe-
ctore adhibendum erit, & in 5. Me-
thodi. Ignitis ferramentis necessario
utendum animaduerti, ubi ab erosio-
ne putrescentis alicuius profluuium
sanguis excitatur, ut in pudendis &
sede. Non igitur solum in manibus,
pedibus & lumbus.

13 In 2. de locis affect. Pulsatilis
dolor arterias ipsas primario afficit,
tum per consensum etiā cæteras par-
tes sensibiles, eo quod à uicinorum
contactu primantur. Et ibidē. Quin-
etiam sine arteria pulsatilis dolor ue-
hementer inflammationes sequitur,
ut inflammatis intercostalibus mus-
culis, qui morb. lateralis est, pro ma-
gnitudine inflammationis dolorem
æger sentiet. Vbi cum 4. condiciones
posuerit dolorem pulsatilem phleg-
monem (magnitudinem eius) partē
sensibilem, & arteriam, fieriq; tamen

hi 2 dicat

dicat ubi hæc concurrant. in pleuriti-
de tamen fieri dicit in hepate & reni-
bus, qui sine arteria sunt: sed credo
mendosum esse interpretē nostrum
qui addiderit, sine arteria. Nam sic in-
telligo Galenum uoluisse: non ex se
sentire hepar, sed causa membranæ
quæ ipsum ambit.

14 In 1. morb. & sympt. Est unus
morbus cōmunis similaribus iuxta
& dissimilaribus. Nempe unitatis di-
uortium seu continui solutio. Item,
alijs plerisq; locis omnem morborū
causam ad continui solutionem re-
fert, aliās ad intemperiem, ut libr. de
inæq. intemp. Tum 2. de locis affect.
In uniuersum (inquit) primæ doloris
species sunt duæ, una quidem dum
temperies subitò mutatur, altera dū
continuitas soluitur. Atq; hæc eius
optima est diuīsiō, cui etiā nos assen-
tire æquum est.

15 In Consilio Epileptici pueri.
Fructus & herbas recenset, quas per-
mittit atq; inter eas numerat porrū,
apium, & smyrnium. Paulò pōst uerò

ab

ab his uero abstineat hortor quæcun-
que ob caliditatem caput replent, ui-
ciososque succos producant, sicut ui-
num, synapi, petroselinum, pastina-
ca, cepa, & smyrnium. Duo hic me
torquent, quod idem prohibeat, &
permittat, tum quod porrum potius
concedit, quam cepas.

16 Galenus in distinguendis fe-
bribus continuis & intermittētibz,
sicut & continuis ueris, & continen-
tibus rursus uariē affici mihi uisus est
mutareque subinde sentētiā ita ut in
eius uerbis uariē perplexus adhuc
steterim. Eas igitur adferam intrica-
tiones, ut nos aliquando dubitatio-
ne aliquis liberet.

Primum dicitur in primo de febris
humores in uasis, ac potissimū
maximis putridi continuē fluunt, &
quicquid obuiam his est, corrumpūt.

Deinde in 2. eiusdem. Febres inter-
mittentes, quæ nimirum ad integri-
tatem desinunt ortum habent ab hu-
more, qui per omnes corporis partes
suo motu defertur. At in continuis

li 3 hu-

humor delitescit atque continetur in uenis.

Tertio ibidem ad priorem sententiam reuersus ait. Reperies etiam aliam accessionis genitæ causam, præter eam, quam iam diximus.

Rursus in eadē. Excrementa putrefacta per interualla & circuitus eijciuntur, uel expultrice, aut quantitate eorum grauata, aut qualitate puncta. Postea & in accessionum breuiū, & longarum discrimine. Cū primæ accessionis (inquit) tempus adeo breue fuerit, ut antequam superueniat, secunda iam prima quieuerit, omne id tempus spatiū quod secundæ principium, & primæ finem interiacet sine febre est. Si uerò secunda inuadere anticipauerit, priusquam omnino prima soluatur nil interuenit mediū, quò purgari possit febris.

Ex quibus omnibus intelligit̃ primum humorem omne principio corruptum in uenis, & quietem tamdiu dari quoad calor præter naturam eius humoris ab inflammato mēbro
ad

ad uicinum transmittitur. Tum ex secundo loco, febrem ad integritatem manifestam desinere, ubi humor extra uenas est corruptus. Ex tertio autem in quo ipsum constat, superfluitatem ab uia in alteram partem transferri, & ibi manere donec, qui sanguis in ea est simul corruptus, accensus, & humiditatem consumpta, ueluti in cinerem redactus est, & inde ab alia accedente superfluitate expellitur. Ex quarto denique continuam febrem esse cum accessio accessioni aggeritur.

17 Quod sequitur, non est locus ambiguus, sed notatio Galeni in Aristotel. agentis. Arguit enim Galenus Aristotelem tanquam ignarum usus testiculorū, quod eos cordi postposuerit, atq; in priori de semine sic agit, cor uiuendi tantum, testes uero bene uiuendi principium existunt. Quanto autem melius est bene uiuere quā simpliciter & solum uiuere, tanto in animalibus testes sunt corde præstantiores. Sed quæso animad-

li 4 uertite

uertite iudices, nū corde sublato, bene uiuere aliquod animal possit, at testiculis sublatis nil minus animal uiuit, quod in tastratis cernit. Taceo igitur ne iam satis notatum ex se hominem, nigriorem liquendo reddā.

18 In 5. morb. & sympt. Apoplexia, epilepsiaq; ex subitanea colluui-
one pituitæ replentis uentriculos cerebri nasci uidentur, proinde horum symptomatū subita est generatio, & discussio, qualis esse per corporū intemperies non posset. Et in 3. de locis affect. Morbus comitialis similiter ut melancholia tribus claudit dominis. Verum omnibus cōmune est, quod afficitur cerebrum siue ex se, siue alio. Prima igitur ante affectus in ipso est cerebro. Secundū per consensum ab ore uentriculi ad cerebrū, sicut per suffusiones contingit.

Tertia rara quidē cum ab alia quadam parte incipiens affectus, sentiente agro ad cerebrum usq; perreptat, quod uidi in adoles. 13. annum agente, qui à crure per femur & lumbos dice-

dicebat ad caput sibi accessisse, aliud autem ueluti frigidam quandam aurem passum esse dicebat, cum interrogaretur quale id esset. Pelopi autem præceptor placebat aut qualitatem aliquam per membra contiuatè diffusum, aut spiritale & uenenosam quādam substantiam. In prima igitur harum est dubitandi locus cum hic dicat, ex ipso cerebro per se, ante uerò ex intemperie ipsius pituita repleti esse dixisset.

19 In 2. de semine. Masculos non solum calidior foemina, sed etiam siccior à principio existit.

Et in Commentar. in lib. Hipp. de morbo mulierum. Velox augmentum mulierum, eorum caliditatis, superatis est iudicium, quod etiam ex menstruorum singulis mensibus accidentium fluxione intelligitur. Vbi enim sanguinis est copia, maiorem esse calorem oportet. Hæc sunt uerba Galeni, hæc uerò me conturbant, cum uideam solidas mulieris partes esse uiri partibus longè frigidiores ac hu-

li 5 midio;

midiores & uenas uirorem ampliores quam mulierum. Quanquam puto alium ante Galenū hæc uerba introduxisse, qui Hippocratis librum quoque exposuerit. Is uerò quisquis fuerit, Aristoteli contradicit, cuius de hac re sententia est, 18. de animalib. Calore nimio esse præditas fœminas, nec obstare sanguinem menstruū dictum, siquidem is non sanguis uerè est, sed sanguis impurus.

20 Galenus ferè ubicunq; meminit lactis hoc sentit. Ex triplici dissimiliq; substãtia constare, serosa, crassa, & pingui. atque ex his camelinum asininumq; serosi humoris plus habere crassi & caseosi ouillum, pinguitudinis seu butyri uaccinum. libr. 3. de aliment. & de euchym. at in lib. de attenuante uict. crassum caseosumq; eidem uaccino tribuit, in quo apparet contradictio.

21 In 3. de aliment. Plurimo sero lactis ad deñciendum aluum utebantur ueteres, cui tamen mellis optimi & salis adijciebant quantum suaue,
& ci-

& citra stomachi subuersionem red-
deretur. In 10. uerò de simpl. Seru-
extergendi uim habet, adhibeturq;
ad aluum subducendam siue clysmo-
extergens & abluens, siue mordaci-
tate intestinorū acrimoniam. Ex pri-
ore loco patuit acre fuisse, hīc sunt
mordacitate esse ait.

22 In 1. de natural. facult. Quęcū-
que partes duabus tunicis constant,
ut uentriculus, stomachus, arteriæ in-
testina, eorum ipse sunt elementa.
Et paulò pōst. Omnes facultates na-
turæ particulares & alterandi uim ha-
bentes, ipsam tunicarum uentriculi
intestinorum matricis substantia sic
perfecerunt qualis cernitur. In 3.
uerò eiusdem. Si quod uelox unica
tunica instrumentum constat ueluti
ambę uesicę uterus & uena, utrun-
que fibrarum genus obtinet, rectar-
um & transuersarum. Credo culpa
traductoris hoc esse factum. Si uerò
dicas, interiorem esse quidem uesicę
uel uteri, superiorem uerò continen-
tis membri, ergo continens illud tri-
bus

bus erit tunicis præditum. Non igitur rectè docetur duas tantū habere.

23 In 1. morb. & sympt. Qui affectus primò cedunt operationem, n̄ sunt, & uerè dicuntur morbi. At operationis oblesio, passio aut symptoma non morbi appellanda. Et 3. eiusdem. Morbi sunt qui primo ledunt actiones. Symptoma uerò morbum ueluti umbra sequitur, ut phlegmonem febris. In 1. uerò ad Glauconē. Quæ (inquit) ex humorum putredine accenduntur febres, & dicuntur putridæ, & sunt non morborū symptomata, sed ipsi morbi. Ergo contraria habet nomina febris.

24 In 2. de aliment. Cydoniorum corticem calidum & acrem esse dicit, ob idq; cōuenire n̄s, qui cruditate laborent. In 7. de simpl. temperatum, aut paulò à temperamento remotū, in quo priorem uirtutem diminuit.

25 In ultimo de simpl. ubi de melle agit. Cūm flauæ bilis genera introduxit Prasīnam, seu porraceam, non nisi grauissimis affectibus eñci ait.

ait. Tum paulò post, omnes species
eijci dicit. plerunq; uerò etiā uomitu
sine prauo quodam affectu.

26 In 16. de us. part. Nullum pro-
priè cuti esse inditum neruum, sed q;
sentiat à particule subiectæ neruo es-
se, quò tanquam instrumento ad sen-
sum utitur. In ultimo uerò de locis
affect. Medicos ignorare in cute ma-
ius produci neruum quo sentitur, in
eaq; radicem habere. Crediderim pri-
ori sententiæ, siquidem sensum cutis
eius lèdi motu integro cōtingere po-
test. cuius causa est non neruus mus-
culi subiecti, sed eius quædam parti-
culæ & rami in cutem distributi.

27 In 1. de morb. & sympt. Humo-
res inter se ferè commisceri, & simpli-
cem reperiri, cū alijs non mixtam
nequaquam posse. In 2. eiusdem.
Singulos interdum puros & synce-
ros, interdum inuicem mixtos solere
in partem imbecilliozem confluere,
ob idq; tumores partium uariari.

28 In lib de atra bile. Excrementa
nigra sæpius euomi & educi salubri-
ter se

ter se reperisse. Atræ bilis autem exa-
ctæ humorem semper ad perniciem
excerni. Eandem uerò in 4. Aphor.
Plerumq; salutem portendere maxi-
mè ubi natura conuicerit. Ego prio-
rem ut ueram accipio. Posteriores
non possum, nisi de excrementis ni-
gris dicatur.

29 In 2. de temper. Succorum op-
timum ac maximum familiarem esse
sanguinem. Huius ueluti fecem & se-
dimentum, atram bilem: quæ idcirco
frigidior & crassior sanguinis est sicuti
flaua bilis longè calidior, frigidissi-
mum ac humidissimum omnium, quæ
in animali sunt, Pituitam, instrumen-
tum quo id cognoscatur, ipsum esse
factum. In 2. sympt. & morb. Cor-
pora interdum à solis qualitatibus al-
terari, quandoq; etiam illis acceden-
te aliquo affluxu. Humido quidē spe-
cie facultate uerò non item. Flauam
siquidem bilem potestate calidam et
siccam, atram siccam & frigidam, san-
guinem calidum & humidum. Pitui-
tamq; frigidam & humidam esse, ibi
tactu

tactu ipso & actu, hic potestate repugnant.

30 In lib. Hipp. de humana natura, Ver esse temperatum se dixisse, in lib. de temper. Hippocratem tamē recte dicere esse calidum & humidum, quod confirmavit in comment. Hippoc. de aquis & uentis.

31 In 7. Methodi. Vbi ægrum qui ab alijs medicis iam adeo siccatus erat, ut simillimum Marasmodibus. i. senili ariditate macescentibus habitum referret. (Rhoris enim succū bibere cogeabant, & absynthium asparagos, bulbos arnacos, extrinsecus imponebant.) hunc mos (inquit) sanauimus omni ratione humectātes. Tum paulò post. In eo meatus contractos, dilatari ac quod in uicinas particulas est cōpulsum, reuelli: præterea singulas similarium partiū propria humiditate humectantis nutrimenti opus, repleti curauimus. Is enim in ea contrarietate, quæ in frigido & calido consistit, nullā euidenter uincentem habebat intemperie

nec

nec in uniuerso corpore, nec in uentriculo Priori loco omnis madoris expertem fecerat, iam temperatum reddit. Ergo contraria dicit imparē.

32 In primo de pulsib. Inæqualē fieri pulsum ob grauem aliquam noxam: & in 13. eiusdem. Pulsum inæqualem imparē, inæqualitatis causam esse incertam morbi mutationē. Transmitti enim uel in partem ignobiliorem, & tunc salutem esse, uel in principem & mortem sequi, ex quo incertum tunc esse pulsum constat: Ibi magnam noxam, hic neq̃ a commodum, neq̃ incommodum significari ait.

33 In lib. de temporib. morb. Vbi quatuor ea recensuit, initiū, augmentum, statum & inclinationem. Accidunt & graues quædam affectiones, ut apoplexia & epilepsia, quorū principium & augmentum uix sunt sensu perceptibilia. In primo uerò de Crisib. Ex statu cuiusq̃ morbi, iudicare oportet ipsius tempora, quæ febris ardēs pleuritis, peripneumonia breue

breue principium habent. Epilepsia
uerò arthritidis mulierum dolores &
nephritis longum. Non potest intel-
ligi de causa generationis epilepsiae,
cum in statu causa non incipiat. qua-
re aut error est in exemplari, aut con-
trarium sibi dicit.

34 In 4. de simpl. Ferro lapidique
ignito ea purgantia medicamenta,
quæ per erosionem interimunt, simi-
lia omnes, quæ à corporis nimirum ca-
lore huc perducuntur, ueluti chalcitides,
misij, fori arsenicum, lithargiron,
hydrargyron & similia. Crassarum e-
nim partium id genus omnia, & po-
testate calida esse, uentremque exulce-
rare & exurere non aliter, quam fer-
rum aut lapidem ignitum. In nono
uerò, interimatque adeuoratum, aut
extrinsecus admotum nondum fe-
cisse se periculum. Cur igitur in quar-
to gradu exurere dicat peto.

35 In 11. Methodi. Venam statim
in principio sectam non in acutis tan-
tum, sed putridis etiam febribus sum-
mum esse remedium, nisi cruditas sub-

Kk sic

fit & ætas, aut aliquid aliud obfit, in particula tamen de uenę sectione, in quartana pura phibet, nisi sit ex sanguine superante. quod ita interpretor, si humor nō simplex, sed cūm alia sit corruptus, ueluti phlegma, uel melācholiā cum sanguine, uenam tuto secari, si uerō pituita aut atrabilis sola sit putrefacta, non tutō posse.

36 In 6. de simpl. Vrticas flatuofum quiddam exhibere, dū coquuntur, quo extimulant uenerē, & maxime cum semen ex musto bibitur, tum statim & partes quas flatu suo affici, inflari contingere, ubi concocta est. Non enim actu, sed potestate inflare, iuxta id, quod alibi dictū est. Nullum medicamē frigidum aut calidum actu dicitur, sed potestate.

37 In 3. de locis affect. In affectu hemycranij, si ex spirituum repletionē est, ægrum tensionem partium patī, cum ex humorum repletitudine, præter tensionem sentire etiam grauedinem. At in parte de uenę sectione dixerat. Signum repletionis spirituum

tiuum, & uirtutum esse corygam seu grauedinem. uasorum uerò intensiōnem, in quo sic suspiror, quod signū dixit in lib. de uenæ sectione, sine dolore membrorum debere intelligi utranq; repletionem. In locis affectis uerò cum dolore cuiusdam membri, cuiusmodi est hemycrania in capite, non enim sola repleto est humorum, sed humorum uitiosorum.

38 In 5. Methodi. Vbi uas aliquod in pulmone rumpitur citraq; dolorē confertum sanguis feruens, florendus multusq; cum tussi expuitur. In uiscere uulnus esse significari, propterea iniungendum laborāti, ut nec respiret uehementer, ac semper silentium agat, & tum uenam cubiti internam incidendam. At in primo de humoribus affectum hominem, pulmonis uel pectoris, uel œsophagi, uel asperæ arteriæ ulcere, quanq; non clamare, nec inspirare permittit, tamen motum manuum & pedum mediocrem præcipit.

39 In 8. de simpl. Psyllium semen
Kk 2 habet

habere admodum utile ex secundo ordine refrigerantium. In desiccando uero & humectando quoddammodo symmetrum. In 2. uero ad Glauconem. Herpetes quidem qui exedentes sunt, refrigerari desiderare, ut alijs herpetes & erysipelata, non tam ferrē medicamenta, quæ simul refrigerēt, qualia sunt lactuca, polygonum lenticulæ, eleia lotum uel nymphæ aqua, Psyllium, Portulaca & eius Aëthion, &c. Hic igitur Psylli est frigidum & humidum prorsus. Ibi uero temperatum humidum & siccum.

40 In 13. Methodi, de liene & hepate. Similia genere medicamentorum & nutrimenta ambo uiscera postulant. Cæterum tantò ualentiora & acriora lien, quanto crassiore utitur alimento. In 4. de usu partium. Nutritus (inquit) Pulmo ex purissimo sanguine, flauo subtili & spirituosissimo, tantumquam delato à corde, Splenis autem corpus, quum tãto rarius hepate sit, quantò est crassius pulmone, merito ex tenuiori sanguine nutritur.

E

Et paulo post. In summa hepar ex
 rubicundo & crasso splen ex subtili,
 & nigro, Pulmo ex elaborato ad un-
 guem ac puro, alimentum capit ex
 his contrarijs de splenis cibo senten-
 tijs posteriorem eligimus ut ueriorē.
 cæterum in priori, potest dici nutri-
 menti uocem largè sumptam esse, ut
 uulgò usurpatur, quo non & sicla, &
 panis sunt etiam eorum nutrimentū.
 sicquē crassiori lien quam hepar nu-
 trietur.

De Lingua Græca.

41 Sophistę hodie nos multas di-
 scere linguas uolunt, cæterum barba-
 rissimas, cū tamen præstaret ipsos
 doceri unicam græcam adeo ornatā
 & cultam, præterea omnibus com-
 munem, & humiditatis plenā. Qua
 quidem imbuti si fuissent, nunquā
 omnia prima genera pulsuum, quali-
 tates existere credidissent. Hæc & a-
 lia Gal. de præstantia linguæ Græcæ
 retulit in 2. li. de differētijs pulsuum,
 ubi præ cæteris colendam hominib.
 esse cupit.

Kk 3

Pchi

Pthilis & alij quidam contra uoluerunt omnes æquo honore, & precio linguas esse, nec referre, si ab ignaris earum quædam uituperentur. Ego certè Galeni sententiã non reñcio credo ueriores pro climatum & incolarum modo ac proportionem instrumentorum uocis linguarum & laryngum, Deum cuius suauem aut asperam linguam dedisse. Cùm uerò Græci in oïum climate temperatissimo & humano generi familiarissimo medio ferè mûdi habitaret, mollissimam quoque & temperatissimam eis linguam fuisse datam, sicque de cæteris pro climatis & instrumentorum mediocritate. Quod si in hos & durissimam aliquando quædam audiantur, non ex uitio naturæ loci, sed ex cõmigratione alienarum & remotissimarum à medio climate gentium, id euenire existimetur.

Moyse.

De Pthilano sui amore Græcè φιλαυτίας. Notum est ex libris Philosophicis & ex alijs, quemadmodum animæ mor=

morbi sunt, & affectionem nō aliter
quā corporis, tanto q̄ ipse grauior
res quanto potior est anima corpo-
re. Inter ceteros autē, una præcipuē
grauibus uiris, & qui in quadam arte
excellere uidentur, qui tales existima-
ri cupiunt ipsi Philautia, hoc est, ni-
mia superba & insolens ac sese opi-
nio plurimum accidi. Qua, qui labo-
rant, si qua in arte præponi, & existi-
mari præ alijs si senserint, non solum
in hac uinci ab alijs nulla de re uolūt,
sed etiam in alijs quas ignorant, si
quid absurdum dicunt, uerū non
esse fateri uerentur, unde aut in earū
statim condemnationē feruntur, aut
in sua hæresi manere potius habent,
quam errorem fateri. Hoc morbo la-
borasse grauitè inter ceteros Gale-
nus uidetur, qui ut in medicinæ arte
excelluit, eiusq̄ partem præcipuē a-
natomicam & sphynicam plurimū
exornauit, in ceteris scientiæ parti-
bus tantundem putauit se ualere, at-
que hac opinione elatus plurimū au-
sus, & multis locis Aristotelē & cate

ros philosophos notare tanq̃ igna-
 ros in ijsq̃ maximè, quibus ipsi excel-
 luerint Physica, Logica, & Metaphy-
 sica, & librum suū de Probatione o-
 mnibus Aristotelis præponere, nec
 modo Philosophos, sed summos om-
 nium hominum doctores Moysem
 & Christum attingere conatus est, q̃
 quæ nimia fuit imbecillitatis & sui
 amoris, non inutile puto, referre in
 quibus repræhendit Moysem, ut po-
 stea mea tanquam sequestri propo-
 sita sententia, uideatur potissimum
 credere nos conueniat, Prophetæ &
 legislatori maximo: an uerò homini
 medico, & digno quo alios afficit,
 conuicio. Sic igitur in 11. & us. par-
 tium arrepta ex pilorum palpebræ &
 supercilij perpetuò eadem magnitu-
 dine, rixandi occasionē quærit. Vtrū
 igitur præcepit his pilis opifex no-
 ster ut æquale semper magnitudinē
 seruarent? Si uerò mandatum obser-
 uantes, & præceptorem reuerentes
 Deum, aut certè ipsi per se melius sic
 esse credentes, hanc seruent magnitu-
 dinem

dinē, quam iussi sunt. An uerò Moy-
ses quidem sic de natura disputabat
& melius quàm Epicurus. Voluit e-
nim principium generationis esse o-
pificem mundi Deum, & hanc illum
ex materia primū fecisse. Propterea-
que uoluisse hos pilos eandem semp
seruare magnitudinem, quæ sicerat
melius. Postea uerò quam eiusmodi
facere pilos constituit Deus, his qui-
dem durum corpus subiecit, illis au-
tem cutem duram cartilagini per su-
periora connexam. Non enim sat e-
rat uoluisse tantum tales esse, siquidē
ne si lapidem repentē uelit facere ho-
minem, id possit atq; illud est, in quo
opinio nostra & Platonis, & omniū
Græcorum à Moyse dissidet. Huic e-
nim satis est, quod uelit Deus orna-
re materiam, statim enim perficitur.
Omnia uerò ipse facere Deum posse
arbitratur, etiam si ex cineribus equū
aut bouem facere uelit. Nos autem
affirmamus quædā esse, quæ neque-
at facere natura, eaq; Deū ne aggre-
di quidem omninò, sed ex his, quæ fa-

Kk 5 cere

cere potest, quod melius est, eligere. Etenim quum pilos in palpebris satius esset æquales semper esse magnitudine & numero, non ipsum. Id quidem uoluisse affirmamus, illos autem mox factos fuisse (neq; enim id potuisset) sed contendimus potius eos etiam si millies uoluisset, nunquam tamen tales futuros, si ex cute molli producti fuissent quum nec recti quidem stare possent, nisi in duro fixi essent. Hęc igitur duo tribuimus Deo, eligendi eius quod melius est uoluntatem in ijs, quæ facienda sunt, & materiæ electionem. Quod si substantiæ cuiuspiam molli & carnosæ pilos eos infixisset, non Moyse modo, uerum etiam aliquo malo duce uideretur, ineptior, qui murum in palude, aut uallum iaceret. Sed quoniam oportuit eos rectos stare in chondrum, & cartilagineam cutem infixit.

Hactenus Galenus. Præclare uerò philosophatus est, qui totam potentiam Deo non tribuit, sed illi metiri nititur potentiæ suæ metas. quasi me dico

dico homini. Medicamini cuiusdam regulam præscribat, non credit igitur Moyſi Deum omnia poſſe, nondum enim ſatis uiderat ſupra ea, quæ fieri non poſſunt Deum eſſe, nec ſi uelit equum ex cinere creare, unquã poſſe quod eodem pertinet. Eligere autem fatetur quod in quacq; re ſit optimum, & ex eo opus facere eſt id quidem aliquid, ſed in eo non ſunt omnia. Moyſes quidã Deum uidiſſe ait quęcunq; fecerat, & omnia uiſa eſſe illi optimẽ cõſtituta, nec inutile quicquam inter illa reſeciſſe: Sed à principio quoq; creaſſe cœlum & terrã, & omnia quæ in eis ſunt ex nihilo, idq; iam antẽ propoſuiſſet, quod non credit Galenus nec Plato, & hinc omnis eorum naſcitur error, ſed putãt Deũ cum mundo ſurrexiſſe quemadmodum dies cum ſole, umbra cum corpore, & febris cum calore oritur. Motũ uerò credunt eſſe æternũ ſecundũ corruptionẽ. Et in his rebus nil eorũ, quæ impoſſibilia appellant fieri, ueluti uirgam, in ſerpentem aquam, in ſanguĩ-

sanguinem mutari & similia. Pluviā
& serenitatem Deum pro suo uelle
non mutare posse, sed hoc ex aëris &
aque dispositione fieri secundum na-
turam, ex quo dat nullam relinquūt
uoluntatem propriam.

Cui Moyses omnia tribuit, & ex ea
inventionem primæ materiæ, dispo-
sitionem planetarum & elementorū
formam, cuiq; datam esse credit. *
Erroris igitur illorū causam esse cre-
do huius principij ignorantiam mū-
dum esse recēs ita creatum à Deo &
Deum quando mundum fuisse. quō
ignorato multa ab eo extra medici-
næ materiam ineptè & falso dispu-
tata sunt contra Moysen cui nos as-
sentire, & credere perpetuò uolum⁹.
* in summa illorum omnis philoso-
phia his duobus consistit. Deum nil
uelle fieri, quod sit impossibile in na-
tura, hoc est, Deum stupendas res mi-
raculosas ultra quam natura soleant
fieri, nunquam facere uelle nec pos-
se si uelit, ut ex ligno, uel ex lapide,
uel ex osse, uel ex nihilo nasci, aut plā-
tam,

tam, aut hominem, seu contra ex homine, & carne facere lapidem & statuam subito, quale quid accidit in uxore Loth. Credimus id non ut Galenus. non posse fieri, quæ non sit ex his, quæ fieri possint, sed ut Moyses omnino ita esse, quæ Deus uoluit & quæ potest quicquid uult. Alterum eorum est dogma Deum, quæ nouit omnia quæ sunt bona, inter ea quæ fieri possunt semper, quod melius est eligere, & hac ratione pilos in palpebris non ex carne omnino, quæ non erat bonum ut promissius creuissent, & impedissent uisum, neque ex ossibus, quæ fieri non poterat, etiamsi uoluisset non magis, quam ex lapide triticum non fit, sed ex chartilaginea pelle oriri, quæ id poterat fieri, & erat melius. Rursus de fide hominibus habenda, hoc monere libet nemini quolibet perito, uero aut bono quicquam tale esse continuo credendum, quale dicit se uidisse aut expertum esse, siue is sit solus, siue multi idem affirment, antequam diligenter id

ter id ex quisiſſeris. Idēq; præſertim ubi
 rixari aduerſus aliū uides: tum enim
 multa etiam falſo multi dicunt, quæ
 aliter habere ſciunt. Galenus igitur
 aduerſus Ariſtotelem ubiq; conten-
 dit, tres eſſe principes animalis par-
 tes: primas, quarum nulla ab alia aut
 uim, aut robur ſuum accipiat. Cere-
 brum, cor & hepar. Ariſtoteles uerò
 eo eſſe fontem à quo cætera membra
 motum & uirtutem hauriant, non ſo-
 lum uenter, caput, tibia, ſed etiam ce-
 rebrum, hepar, pulmo, &c. Iam ue-
 rò alij quidam ante me pro Ariſtote-
 le ſententiam tulerunt aduerſus Ga-
 lenum, imaginationis, memoriæ, mo-
 tus ſenſusq; principium unicum eſſe
 cerebrum, & non cor aſſerentem.
 In 2. de placit. Hipp. & Plat. adeoq;
 id exemplo ſacrarum uictimarū eti-
 am corde exenterato fugientium ac
 uocem edentium confirmant.

Cui planè in 5. de locis aff. Ipſe con-
 tradixerat, Vbi rectè aſſeruerat non
 poſſe fieri, quin pateretur cor ipſum,
 ubi mors accederet, & intemperiem
 cate-

Ceterarum partiū non continuo mortem sequi, sed organicarum, ex quibus præcipuum est cor, quæ si uera sunt omnia, cui credemus: ad primū igitur quod attinet, animalia uictimarum etiam sublato corde, currere & boare, nec cadere, nisi effuso toto sanguine, si simpliciter intelligendū est, ergo & uenis cōstrictis, & sup̄presso sanguine poterūt etiam uiuere sine corde. Ac non est ita, imò ex corde affecto moriuntur. Quod uerò eo remoto, etiam moueantur & sentiāt inde est, quia perpetuo motu uirtus à corde ad caput & cæteras partes transmittitur, ibiq; aliquandiu uiget, dum alia subijcitur quod si non subiiciatur, tum deficiente illa etiam pars moritur, & cadit animal: quemadmodū in fontibus riuulis uidetur. Quādiu scaturigo fluit, etiam riuulus noua aqua alluitur & uiuit: at ea obturata aliquandiu post remanet in riuulo quidem aqua, sed paulatim nō affluente, alia exiccatur & perit.

F I N I S.

IO. D. A.

IO. DAMASCENI APHORISMI

ad filium.

Eus arceat te (fili amantissime) à uia erroris, & in uia salutis ac uirtutis conseruet, meumq; in te desiderium, & tuum in me obsequium dignetur perficere. Aphorismos tibi scribere quos petieras à me non alia de causa distuli, q̃ ut animi tui in me & eorum studium tentarem uoluntatem, eos uerò quoniam hanc ego iam satis cognitā habeo, tibi mitto. Cæterum hanc nostram moram, si forte iam cœpisti, desine fastidire. Siquidem maiores nostros sæpe impatientes arguisse nosti, & nostram in te beneuolentiā & studium præ omnibus iam præsentire potuisti. Vale. Deus te item conseruet & animum tuum ad seruorū suorum utilitatem pro diuina uoluntate sua instituat.

Accipe fili, primū amplissimos
esse

esse, medicinæ campos, & in ijs tantum ex libris non etiam ex indagaci, & diligēti industria ac sedulitate uersari, plus molestiæ quam utilitatis adferre. Indagax autem ingenium & sedulitatem plurimum iuuare artem. Et ueterum doctorum lectionem ac secretorum cognitionem augere scientiam.

2 Vita breuis, eorum autem quæ e terra gignuntur omnium cognitio longissima. Tu quæ in his palam sunt, quæque in dubitationem non ueniunt, & quæ probatis maximè teneto. cætera seu controuersa, seu incerta relinquito, neque te etiam sapientum huiusmodi dicta conturbent.

3 Qui luxuriæ & uoluptatibus dediti sunt medicinæque & philosophiæ, & cæterorum artium fundamenta negligunt, ijs non est habenda fides, in his maximè quibus Aristot. & Gal. consentiunt. Nam in quibus dissentiant difficilis est ueri ratio.

4 Humana natura non potest non deperdere aliquid medicaminis, præ-

LI

sertim

fertim attenuantibus.

5 Animal ex frigido & humido nutrit: at ex calido & humido uiuit.

6 Virtutes naturales & spirituales una eademque uirtus est: sed pro uarijs subiectarum partium officijs, uaria sortitur nomina.

7 Temperamentum naturæ re ipsa separari non potest à subiecto, at deriuari potest. Sicuti ab auis & parētibus quædam uicia & animi, & corporis in filios deriuantur, & maxime morbus diuturnus si in principie quadam parte constiterit.

8 Medicamen temperamento corpori uicinum & amicum si simul odore est, nutrimentum quoque optimum & familiarissimum erit.

9 Corpus & anima ita à natura cōparata sunt, ut nō nisi iuncta hic subsistant. quo cauendum est ne medicamen ualentius detur, quod possit se iungere.

10 Temperies corporis figuram & tēperiem nerui sequitur, quare in propinādo medicamento fugere oportet

portet quod eam dissoluat.

11 Id tibi primū curandum, ut naturam iuues & reficias, hac enim neglecta, nil profeceris si deficere sinas. Quare medicamen stringens & odorum, temperamento corpori proximum reficiendis partibus principibus prodest.

12 Hepar & uentriculus in numero sunt eorum, quæ naturæ fouendæ ac nutriendæ sunt præcipuè idonea, quocirca his læsis, naturæ etiam cursus minuitur.

13 Calidi morbi sunt frigidis læthaliores propter ignei motus uehementiam.

14 Si quid corpori acciderit non est dandum quod principibus partibus noceat, hoc modo enim parum proderis.

15 Vitia animi sequuntur corporis temperamentum, cum igitur corpus offendetur, præcipuè si partibus illis principibus, medicamenta animæ propria dare memineris: utpote quibus recreetur, uisu, auditu, gustu,

LI 2 &c. hęc

&c. hæc enim bona medicamento-
rum pars censetur.

16 Medicamenta, eaquæ maximè, quæ
summo capiti sunt profutura sub som-
num sunt propinanda, ut natura in-
terioribus tantum intenta, facilius in-
ipsa purget. Item quæ morbo iam ue-
hementer aucto præcipuarum parti-
um, adhibentur. partis temperamen-
to quàm fieri potest maximè similia
esse oportet, aut certè, quæ eam nutri-
re possint.

17 Medicamenta contraria cōtra-
rijs depellendis adhibenda idonea,
non temperamento semper. eadem.

18 Gracilibus exhaustis, & sicca-
tis, nequæ medicamenta, nequæ nutrimē-
ta danda sunt, nisi quantum & qualia
ferre natura possit.

19 Medicamenta tibi sunt certa
& pauca usurpanda, eaquæ quibus ma-
ximè usu fidere possis. Nam si uolue-
ris multa assequi, multiplici sensuum
uarietate eò uenies, ut nulli confide-
re tutò possis.

20 Varia est rerum natura & quali-
tas,

tas, quidam enim earum uī affici crediderunt, quod natura per se efficebat: quare uidendum est semper, ut hanc maximē sequaris.

21 Natura hyeme & uere plus humorum intra corpus colligit, quā aestate nec autumno. Quare his temporibus medendum pro ratione naturę semper erit.

22 Morbi frequentia in principibus partibus, corporis dissolutionē prænunciat. Quare sic affectos calfacere & naturam sustinere, quā maximē oportet potius quā solutione uentris aut uomitu uti. Neutrum enim sine detrimento adhiberi potest. Quod si solui humores patiuntur, soluantur quidem, sed fluxio ad principes partes uitetur.

23 Tumorem innatum ex morbo conualescentibus expellere semper curato, ne si intrò compellas partes principes afficiat.

24 Sanguinem pro climatum detrahare oportet, quinto quidem & sexto plus, primo uero 2. 3. quarto,

L1 3

aut

aut septimo minus.

25 Cibaria conualescentibus etiā contraria permittendū, sed prius qualitatē noxiā minuire oportebit.

26 Spem promittere ægroto, etiā si desperes de curatione. Affectio. n. animi sperantis naturam ut plurimū iuuat.

27 Medici indocti, & adolescentes luxui dediti, ut plurimum homicidæ.

28 Aegrotum sciscitari nō solum, quæ extra accidunt, sed quæ intra puerdere non oportet. Urina enim ubi morbus intra uenas existit, ut plurimum fallit.

29 Aegroto in memoriam reuocare, quæ antè morbis cupere noueris, aut in quibus delectari sit solitus adducere, multum aliquando profuit, quare hæc diligenter tibi sunt inquirenda.

30 Paralyticos multum iuuat, adolescens puella lateribus apposita, caloris naturalis causa.

31 Ex duobus medicamentis æquali

qualibus, semper quod leuius est eligendum.

32 Medicamenta temperamento naturali ægrotantis proxima esse cōueniūt, ne si fortē sint uehemētiora, ea deſiciant naturam potius, q̃ iuuent.

33 Antequam purges, mouendi sunt humores & resoluendi, aut medicamento cum bario, aut cibo medicamentoso. Tum ieiunis medicamē purgans propinandum.

34 Theriaca resoluendis humoribus est aptissima, sed pueris, siccatis, & senibus minus præbendam, quàm cæteris.

35 Morbi acuti minus in iuuenibus, quàm senibus metuendi. Illi enim nutrimentā citiūs in similitudinē uertunt. Si uerò ob defectum caloris acumen morbi ferre non possunt.

36 Labori & exercitio assuetos minus offendunt dolores morborum: siquidem labor, & exercitium ipsum quidā dolores sunt, quos nisi superet morbus qui accidit, non grauius afficiuntur.

536 RABI MOYSIS

37 Conuulsio epileptica, ijs adole-
scentibus, qui in 1. 2. 3. & quarto cli-
matibus habitāt, ferē fit ex caloris na-
turalis & temperamenti inopia. Vn-
de eorum curatio est per calida & tē-
perata.

38 Purgationi capitis cerebri aut
sensuum, pilulæ maiores sub somnū
post cœnam adhibentur.

39 Principibus corporis partibus
siccatis aut ex natura imbecilib. nō
sunt medicamenta in summo gradu
purgantia, sed moderatē calida & hu-
mida adhibenda.

40 Humidiōri uentriculo, tenuē
puluerem damus ut confirmetur.

41 Clystere purgamus eos, qui ex
siccatis aut defectis principibus par-
tibus laborant.

42 Omne purgans medicamentū
necessariō choleram flauam mouet.
Propterea quadragenaria atq; senio-
rum purgationi nil tale ad miscendū
erit.

43 Simplicia inter se mixta, faciūt
in corpore singula pro uirib. suis of-
ficium,

ficiū, & musculos atq; carnem pro se singula gignunt.

44 Infirmum nitendum est primū in priorem statum reducere, non continuo in exactum & perfectum temperamentum.

45 Singulis morbis si cum sibi medicamen commodum ex ingenio, & industria excogitare, id uerò ad artis medicæ perfectionem accedit.

46 Nihil eorū quæ sub lunari globo sunt posita ad eundem, quo principio fuerit natum, statum reuerti potest. Corpus enim humanum in perpetuò fluore est.

47 Omnis febris ex calore præter naturam est, sed pro materia differunt ægritudines. Quapropter ei, qui ex flaua bile febricitat, uehementia, qui uero ex atra, remissiora & lentiora adhibenda sunt medicamenta.

48 Membrum semel uel morbo, uel casu quodam læsum, nunquā ad priorem naturam, seu constitutionē reducetur.

49 Filij, parentum morbum, maxi

LI 5 me

me diuturnum & imbecillitatē mem-
brorum præcipiorum hæreditantē
quanquam minus uehementem, præ-
cipuē ubi alter parētum fuerit sanus.

50 Nulli medicorum citò habenda est fides, nisi sit & ætate, & experientia multa probatus.

51 Urina morbi diuturni, urinæ hominis sani similis, si eadem qualitate permanferit, restitutionem sanitatis non prænunciat.

52 Medicum mediocriter habere se oportet, ita ut nec mundum spernat prorsus, nec omninò sequantur.

53 Mulier in dextra matrice concipiens rarò foeminas pariet.

54 Si medicamen catharticum seu purgans uterum gerenti præbebitur, principes infantis partes perpetuò debiles erunt.

55 Verna aëris mutatio si ex humido in siccum fiat, gignuntur æstate proxima pustulæ, febres, Phrenitides & abscessus, nullo medicamento purganti curabiles.

56 Quemadmodum ex humorū plenitudo

plenitudine fiunt morbi, ita & ex inanitione, atq; inopia, id uerò sepe medicos fallit.

57 Mutatio stellarum in longitudinem aut latitudinem, nec uitia, nec consuetudines mutat:

58 Naturæ hominum, temperamenturæ, cibi, medicamenta & uitia, pro interstitio regionū differunt: adeo ut quæ in una, secūdo gradu sint calida, in alia, ad quartam gradum ascendant.

59 Emplastra atq; unguenta qualitati & temperaturæ, membrorum quibus applicantur, uicina quàm maximè potest fieri debent.

60 Atram bilem in pueris ualido medicamento purgari non cōuenit. Vasa enim in ijs adhuc sunt parua & uires imbecillæ.

61 Sola diætā medicari si potest, à potione abstinendū est. Hic enim tutius & melius erit.

62 Vomitus aut uentris solutionem, post diuturnam intermissione erumpentem, ne subito restringito.

63 Hæ

63 Habitus & uapores duo sunt, cum ferè unum esse tātū credant.

64 Cuius urinam non prænoueris sani, uix ægroto commodum parabis medicamentum.

65 Delirantibus ex frigiditate & siccitate cerebro inuectis, tumum, oderem calidum & humidum, subministramus, intus forasq̃. Nonnunq̃ uerò etiam ad iram excitamus, ut inde calefiat corpus.

66 Qui uenam secare quadragenarij quater in anno consueuerunt, quinquagenarij ter, & sexagenarij semel. Postea uerò, ne semel quidem debent.

67 Senes à quadagesimo anno Cephalicam, à quinquagesimo medianam, à sexagesimo basilicam incidere desinant.

68 Iuuenes sectioni uenæ assuefacti, si frigido sint temperamēto, post sexagesimum in frigidam & siccam naturam abeunt.

69 Vires uegetant membra, & uicissim mēbra uires, his enim constantibus

tibus illa quoque constabunt.

70 Qui à iuuenibus parentibus
nati sunt semper bene constituta mē
bra habent, contra uerò à senibus &
imbellibus iudicandum.

71 Qui aromata & odores abhor
rent, corruptioni sunt proximi.

72 Quibus regionibus ex uento
nubes fiunt, in his ferè coryzæ & gra
uedines gignuntur sæpius.

73 Muscæ numero abundātes, pu
tridos morbos prænunciant.

74 Ieiunium æstate corpus exic
cat, colorem flauum inducit, melan
choliā gignit, & uisum offendit.

75 Quibus inualidæ sunt uires,
principes quoque partes morbosæ, &
iniurijs quibuslibet obnoxia.

76 Regionū uarietas, solis reces
sus, tēporū mutatio uaria quoque cor
porum temperamenta faciunt: ut
Aegyptijs, quæ bis hyemen & æsta
tem habent fructuum copia est, me
morix & ingenij subtilitas &c.

Conclusio.

Accipe igitur (fili charissime) quos
petie


542 RABI MOYSIS

petieras Aphorismos. atq; ex his fideliter & cum iudicio non temere discito mederi. In his enim paulò sudavi amplius, ut tutò ijs credi posset, quòd ad alios quoq; pertinere existimabam. Veritatem uerò te præ omnibus diligere credo, quod te facere semper cupio, atq; etiam si dignū est oro. Congratulor profectò tibi de translatione tua in Galeni artem Medicam qui liber, omne medici opus continet: gratiasq; Deo Opt. Maximo ago, quod te tanti authoris æquum traductorem esse uoluerit. Vale.

*Finis Aphorismorum Ioan.
Damasceni.*

B A S I L E A E,
EX OFFICINA HENRICI
PETRINI, Anno Salutis,
M. D. LXXIX.
Mense Martio.

ex his
on erret
n paucis
redi posset,
nere existi
e pra om-
te facere
dignū est
ibi de
nem Me
dictopus
st. Maxi-
thorio
ste



Alceson p. 288

m

3